●〈症例〉

有茎性壁外発育を呈した 巨大胃平滑筋肉腫の1例

伊東祐一 高木和俊 富田利夫 佐久間 敦
伊藤生二 小暮洋暉

獨協医科大学第2外科

〔Key Words〕胃平滑筋肉腫, 超音波内視鏡

はじめに

われわれは有茎性壁外性発育を呈した巨大胃平滑筋肉腫の1例を経験したので、若干の文献的考察を加え報告する。

症例：60歳，男性。

主訴：特になし。

既往歴：昭和46年虫垂切除術。

家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：定期的検査の際、近医にて腹部US、CTで腹部腫瘤を指摘され、当科に紹介入院となった。

入院時現症：身長162cm，体重66kg。貧血，黄疸なく，胸部異常所見なし。腹部所見では、左臍上部に手拳大の腫瘤を触れたが、圧痛，疼痛は認められなかった。入院時血液検査所見は異常なし。

上部消化管造影検査：胃体部小彎側後壁から壁外性に内腔を圧排する腫瘤を認めた (Fig. 1)。

胃内視鏡検査：胃体中部後壁を中心として胃角部まで、腫瘤によると考えられる壁外性の圧排像を認め、粘膜面は円滑であった。食道胃接合部直下の粘膜下静脈の拡張を認めた (Color 1)。

Fig. 1 Upper GI examination demonstrated the pressure from outside to the posterior wall of the stomach (arrows).

超音波内視鏡検査：胃体中部小彎後壁からの走査で、径10cm大の内容は不均一で、無エコー領域を有する腫瘤があり、平滑筋肉腫を最も疑わせた (Fig. 2)。

腹部CT検査：辺縁境界明瞭で、内部不均一な径10cm大の腫瘤が認められ、脾体部とは明瞭に判別された (Fig. 3A)。

腹部MRI検査：前頭断像のT₂強調画像では、内部不均一な高信号の腫瘤が認められ、腫瘤は胃から生じている可能性が考えられた (Fig. 3B)。

腹部血管造影検査：腫瘤中心はhypovascularな径12cm大の腫瘤像として描出され、左胃動脈が栄養血管であった (Fig. 4)。

以上の所見より、胃から発生した壁外発育型の非上皮性腫瘍、平滑筋肉腫の疑いで、平成7年12月15日手術を施行した。

開腹すると、胃体中部小彎側後壁より生じた有茎性壁外性発育を示す径13cm大の腫瘤が認められた。胃壁より生じた茎部は太さ2cmであった。腫瘤を含めた胃の小彎側楔状切除を行い、合併していた胆石症に対して胆嚢摘出術を施行した。

摘出標本：大きさ14.5×12.0×10.0cm，重量950gの表面平滑な結節状の腫瘍で、胃から連続する2cmの茎部を伴っており、胃の粘膜は正常であった。腫瘍断面の外側部は白色を呈した実質部が輪状に認められ、内部に変性、壊死を伴う凝血塊が認められた。

病理組織学的所見：直径2cmの茎を有する固有筋層深部より発生した胃原発性腫瘍であることが認められた (Color 2A)。また紡錘形の腫瘍細胞が束状配列や錯走して増殖している像が認められ、全体的に細胞の充実性が高く、mitosisが4～5個/10HPF認められ、胃平滑筋肉腫と診断された (Color 2B)。茎部の胃粘膜に著変なく、術中に摘出したリンパ節に転移像は認めなかった。

Fig. 2 EUS showed a huge heterogeneous tumor.

Fig. 3 A: Abdominal CT demonstrated a large heterogeneous mass. B: Abdominal MRI (T₂) demonstrated a beak sign and a heterogeneous intense tumor in the stomach.

術後経過：術後は合併症なく経過し、退院後も再発の兆候なく良好に経過している。

考 察

胃平滑筋肉腫は全胃悪性腫瘍の1～3%を占め、日常診療でもしばしば遭遇する腫瘍である。発育形式は、胃外型、胃内型、壁内型、混合型に分けられるが、胃外型が多い¹⁾。しかし、有茎性の胃外型発育の報告は乏しく、集計しえた限りでは本邦報告は自験例も含め27例であった^{2,3)}。本症例の発育形式および質的診断には、MRI、CT、超音波内視鏡が有用であったが、茎の有無についての術前診断は不可能であった。治療に関しては、胃癌に準じた胃切除およびリンパ節郭清術、局所切除術などの報告が認められるが、肉腫周囲の切離縁を2 cm以上とれば局所再発がないとされており、局所切除術を選択した⁴⁾。

以上まれな有茎性壁外性発育をした胃平滑筋肉腫を経験したので報告した。

Fig. 4 Angiogram demonstrated a hypovascular tumor, which was fed by the left gastric artery.

文 献

- 1) 奥井勝二, 鈴木 秀: 胃肉腫. 出月康夫, 他編, 新外科学大系, 胃・十二指腸の外科III, 中山書店, p289～292, 1989
- 2) 井上敬太, 堀見忠司, 森田莊二郎, 他: 壁外性有茎性発育を呈した巨大平滑筋肉腫の1例. 日消誌, 92: 1942～1946, 1995
- 3) 湯浅洋司, 伴 慎一: 胃外型の発育を示した巨大胃平滑筋肉腫の1例. 日臨外誌, 56, 2625～2627, 1995
- 4) 笹子三津留, 片井 均, 佐野 武, 他: 胃平滑筋腫瘍の治療法の選択—外科的治療. 胃と腸, 30: 1169～1174, 1995

A Case Report of Gastric Leiomyosarcoma Showing Pedunculated Extragastric Development

Yuichi Ito Kazutoshi Takagi
Toshio Tomita Atsushi Sakuma
Seiji Ito Hiroaki Kogure

We report a rare case of extraluminal giant leiomyosarcoma of the stomach. A 60-year-old male was admitted with a palpable fist-sized tumor in the upper abdomen. Endoscopy showed a smooth elevated lesion in the posterior wall of the middle body of the stomach, but mucous membrane showed no other lesions. By endoscopic ultrasonography, the tumor was demonstrated as a heterogeneous lesion including partly anechoic area. Angiogram revealed a tumor in the middle body of the stomach similar to that in CT scanning and MRI.

Wedge resection of the stomach was performed for the tumor. The resected specimen was a giant leiomyosarcoma with a pedicle. It measured 14.5×12.0×10.0cm and weighed 950g. The cross section showed a solid tumor with white capsule including several parts of necrosis inside. Histologically, the tumor consisted of scattered spindle-shaped cells.

2nd Dept of Surgery, Dokkyo University School of Medicine.
<カラーは17pに掲載>