特 集

内分泌性高血圧について

Hypertension due to Endocrine Disorders

清水 直 容*
NAOKATA, SHIMIZU, M.D.

は じ め に

内分泌性高血圧症は、二次性高血圧症の一部をしめるにすぎないが、多くは完全治癒が可能な疾患であり、本態性高血圧症と診断する前に、一応どの高血圧症例においても、考慮されなければならない意味で、重要な疾患群である。更に最近、本態性高血圧症の一部（これは約20%といわれるが）で、内分泌異常がその発生病理に重要な関係をもつことが明らかにされてきたので、この点に関する最近の考え方を含めて広く内分泌性高血圧症の概説をのべる。

高血圧を伴う内分泌疾患

高血圧を伴う内分泌疾患には下垂体、副甲状腺機能亢進症、甲状腺機能異常症、糖尿病、副腎疾患、性腺疾患がある。

(1) 下垂体疾患 前葉に関係しては末端肥大症がある。本症では、糖尿病や動脈硬化症を合併することが多いから、成長ホルモン過剰と高血圧の間の因果関係は直ちに明らかではないが、少くとも活動性末端肥大症の患者を下垂体照射により治療すると、血圧の下降がみられる¹⁾。

(2) 副甲状腺機能亢進症では約30%の患者で高血圧症を合併するが、本疾患では腎疾患を合併することが多いから、副甲状腺ホルモン過剰—高カルシウム血症と高血圧との関係を論じる前に腎性高血圧の可能性を考慮する必要がある。しかしカルシウムの血管平滑筋に対する直接作用を介し高血圧を来す機序が考えられている²⁾。

(3) 甲状腺機能亢進症では、サイロキシンの作用によって心拍出量の増加をきたし、血圧の特徴は拡張期血圧の軽度低下を伴い、脈圧の増加をきたす。通常甲状腺に対する治療によつて血圧も下降する。

甲状腺機能低下症における高血圧症は Fuller ら³⁾によつて論じられており、治療は低サイロキシンの向けられるべきであり、この代償療法によつて、高血圧も緩解する。

(4) 糖尿病と高血圧との合併は頻度の多いものであるが、腎性因子、糖尿病性動脈病変を原因として考慮する前に、内分泌疾患による二次性糖尿病を除外する必要がある。かかる内分泌疾患として、甲状腺機能亢進症、末端肥大症、褐色細胞腫、原発性アルドステロン症、Cushing 症候群などがあり、いずれも高血圧を伴うものである。また本態性高血圧症の Thiazide 系薬剤による治療が時に尿糖の原因となることも知られているが、その頻度は多くない。

副腎疾患による高血圧症

高血圧を伴う副腎疾患としては表1の如きものがあり、代表的な疾患の本邦報告例は表2の如くである。以下その特徴について、髄質、皮質ごとに述べる。

1) 副腎髄質疾患

これに属するものには、褐色細胞腫、神経芽腫、副腎髄質過形成があるが主たるものは褐色細胞腫である。

褐色細胞腫の徴候の主なもの、持続性(65%)或は発作性(35%)高血圧、頭痛、発汗、動悸であるが、基礎代謝亢進、血糖上昇を伴うものも約半数例にみられる。

* 帝京大学医学部助教授(第1内科)
Teikyo University School of Medicine.
[Nov. 13, 1972 受付]

表1 高血圧を伴う副腎皮質疾患

褐色細胞腫
Cushing症候群
副腎過形成
{下垂体性 ACTH 過剰 (非腫瘍, 腫瘍)
{異所性 ACTH 産生腫瘍
{原発性副腎過形成 (Meador)
副腎腫瘍 (腺腫, 癌)
原発性アルドステロン症 (Conn)
副腎腫瘍 (腺腫, 癌)
副腎過形成 (グルココルチコイド不応性高血圧)
先天性副腎過形成 (酵素障害)
11 β -hydroxylase 欠損
17 α -hydroxylase 欠損 (グルココルチコイド反応性高血圧) (性腺異常を伴う)
グルココルチコイド反応性アルドステロン症 (グルココルチコイド反応性高血圧)
Deoxycorticosterone 産生腫瘍
Corticosterone 産生腫瘍
? レニン抑制性本態性高血圧症
(EHSR: Essential Hypertension with suppressed Renin)
(SNAME: Syndrome with normal aldosterone and mineralocorticoid Excess)

表2 本邦における副腎性高血圧

褐色細胞腫など	314例
原発性アルドステロン症	286例
Cushing症候群	328例
過形成	53%
腺腫	35%
癌	4.3%
異所性 ACTH	2%
副腎ステロイド合成障害	9例

高血圧患者で褐色細胞腫を疑うきっかけには、次の如きものがある。すなわち、経過中に発作と名づける出来ごとのあること、糖尿或は空腹時血糖の上昇、基礎代謝亢進、小児であること、起立性低血圧、発汗過多、微熱、頭痛のあること、家族に褐色細胞腫があること、体重減少、重症の網膜症、甲状腺髄様癌の合併などである。

このように褐色細胞腫は家族内発生をみることもあり、その時は両側性、若年性、副腎外の頻度

が高いが日本では4家系、外国では40家系の報告がある。甲状腺髄様癌を合併するものは Sipple 症候群とよばれ約30例の報告がある。

その他 Recklinghausen, Hippel-Lindau, Sturge-Weber, Bourneville, Café-au-lait 斑の合併も報告されているがその頻度は褐色細胞腫の約5%である。その他先天性心疾患との合併も多く、また妊娠時発汗、嘔吐、頭痛がつよく、褐色細胞腫が発見された例も約100例報告されている。

褐色細胞腫の頻度は一般剖検の約0.05%、高血圧患者の約0.5%といわれ腫瘍は10~100gのものが70%をしめ、レ線診断で発見されやすい。腫瘍は右がやや多く小児では特にその傾向がつよい。

診断には、薬理学的な Regitine テストなども有用であるが、なお、尿中カテコールアミンの測定が最も重要であり、未変化体の非抱合、抱合型の測定や、代謝物 VMA, HVA, Meta 代謝物の測定が可能である。

2) 副腎皮質疾患

皮質疾患で高血圧をきたす疾患は表1, 2でしめすごとくである。

副腎皮質ステロイド過剰によつて高血圧をきたす機序は、多くあげられているが、最終的には Na の蓄積と最も関係が深い。表3にしめした如く Na の蓄積作用は単位重量あたりで表わせば Aldosterone が最もつよい。

① Cushing 症候群

本症候群は、慢性のコーチゾール過剰症と定義され、その臨床像は、よく知られたように、中心性肥満、満月様顔貌、皮膚線条、多血症、多毛、

表3 副腎ステロイドの電解質作用

	Na貯溜	K排泄
Doc	100	100
Aldosterone	2,500	500
11-dehydro-B	10	10
B (corticosterone)	0.5	0.5
11-deoxy-Cortisol	3	1.5
Cortisol	0.03	24
18-OH-DOC	0.01	14
18-OH-B	6	6

痤瘡，高血圧，月経異常，骨粗鬆症などである。本症での低カリウム血症は，異所性 ACTH 産生腫瘍の時特に著明であるが，この原因は，DOC の過剰によるという Schambelan らの成績がある。本症候群の鑑別的診断に最も大切なものはデキサメサゾン抑制試験であるが，血中のコーチゾールを指標とする際には，いわゆる episodic secretion という現象を考慮に入れることが大切である。

治療は，下垂体性 ACTH 過剰の際には，下垂体に対する 4,000 レントゲンの照射を先づ試みるべきでこれによる緩解率は約 25%と決して高くはないが，補充療法を必要とせず最も理想的と云える。また効果が得られなくても，後に Nelson 症候群（副腎全摘後の Cushing 病で発生する下垂体嫌色素性細胞腺腫）の発生予防になる可能性がある。しかしこの療法は，精神障害の著しいもの，或は高血圧の高度のものなどで，急速な治療効果を必要とする場合には用いられない。照射の無効な場合或は急速な効果を必要とする場合には，副腎両側の全摘が理論上正しい方法である。

② 原発性アルドステロン症

本症はアルドステロン産生腫瘍による疾患で，高血圧と低カルシウム血症に由来する種々の症候，例えば，頭痛，しびれ，脱力感，筋麻痺，多尿（ピトレッシン抵抗性）などで発見される。最近では低カリウム血症を有しない本症の存在が知られているが，その症例は，現在非常に少く日本でこれが確認されたのは数例にすぎない。診断は，レニン刺激試験に対するレニン増加の欠如，アルドステロン分泌増加，高血圧の存在などと，レ線手技，血管造影法或は ^{125}I コレステロールなどによる腫瘍部位の確認などで，決定される。

腫瘍は他の副腎腺腫にくらべ小さいものが多い。その 82%は 6 g 以下である。本症は一般に良性高血圧の経過をとり，腫瘍摘出後の心血管系の予後は良好である。

鑑別すべきものには，続発性アルドステロン症の一部で高血圧を伴うもの（Robertson 症候群など），低カリウム血症を伴うもの（Bartter 症候群）や，高血圧，低カリウム血症を伴いアルドステロ

ン過剰症のない，いくつかの症候群（Liddle 症候群，DOC産生腫瘍，B産生腫瘍など）がある。また次にのべる， 17α -hydroxylase欠損症も，ACTH の過剰による鉱質ステロイド（主としてDOC）過剰症を来とし，原発性アルドステロン症と同一の病態をしめすが，グルココルチコイドの投与で，血圧が下降することによつて臨床的には鑑別できる。

3) 副腎皮質ステロイド合成酵素欠損による副腎皮質過形成

この項目に属する病態のうち高血圧を伴うものは 11β -hydroxylase 欠損と 17α -hydroxylase 欠損によるものである。いずれもコーチゾール合成障害の結果，negative feed back 機構により下垂体 ACTHの分泌増加を来とし，合成経路の障害部位の前駆物質が増加することが原因である。かかる物質としては deoxycorticosterone の関与がもつとも重視されている。 17α -hydroxylase の完全欠損の症例は，Bigleri ら⁴⁾の報告例で代表され，性腺においても，同酵素の欠損を有すると考えられる。これらの例は，いずれもアルドステロンは，むしろ低下しており，この点 Newら⁵⁾の報告例で代表されるグルココルチコイド反応性アルドステロン症とは区別しておいた方が便利である。

低レニン性本態性高血圧症

この名前であげた本態性高血圧症の一つのサブグループが，疾患単位であるか否かは，現在是不明であり，また副腎皮質の病態との関係についてもはつきりした結論はえられていない。しかし研究の方向は，何等かの鉱質ステロイド活性或は作用の増加であり，ここでは主として副腎皮質との関係についてのべる。

このような疾患群が明らかにされたのは，原発性アルドステロン症の診断にレニン刺激試験が用いられるようになってからで，この試験に反応せず，かつアルドステロンの増加をみない高血圧の存在が，次第に興味をもたれてきた。

これらの一群の本態性高血圧症に対しては，Low Renin Essential Hypertension (LREH)，

表4 低レニン性本態性高血圧の頻度

報告者	年次	刺激方法	頻度
Helmer	1965	なし	174/600
Ledingham	1967	なし	6/68
Creditor	"	低Na+サイアザイド	12/30
Kuchel	"	低Na+diazox	8/25
Channick	"	Furosemide, p.o.	38/100
Weinberger	1968	低Na, 立位	6/14
Granger	"	" "	16/60
Fishman	"	" "	5/24
金子ら	"	Nitroprusside	12/28
Jose	1970	低Na, 立位	12/45
Crane	"	" "	77/300
Spark	1971	立位	8/23
Wisnbaugh	1972	低Na, 立位	6/49
金子	"	Furosemide i.v.	5/13
計			385/1379 (27.9%)

Hyporeninemic Hypertension, Syndrome of Normal Aldosterone and Mineralocorticoid Excess (SNAME)などいろいろの呼び方があるが、現在までの種々の報告をまとめてみると、その頻度は、表4に示すごとくである。これによるとその頻度は平均約28%になるが、著者は日本人ではこれよりも高い成績をえている。

現在この LREH の特徴としてあげられているものは、総交換性Naの増加、スピロノラクトン、aminogluthethimideの有効性、thiazideの無効性、唾液 Na/K 比の平均的低下、Na 制限時に平衡に達する期間が長く、アルドステロンの増加をきたさないことなどである。これらは、本症候群の原因が鉱質ステロイドの過剰であることをしめすものであるが、Melby は、12例中5例

で 18-hydroxy-DOC の増加をみとめ、これをその一つの候補にしているが、18-OH-DOC の鉱質ステロイド活性は表3に示した如く、強力でない。

最近 Spark⁶⁾は、18-OH-DOCより更に極性の高い物質を、かかる患者の副腎組織と 18-OH-DOC とのインキュベーションによつて高率にうることから、このような物質の同定をすすめている。

このように、低レニン性本態性高血圧症では、鉱質ステロイド作用の増加状態であることは確かであるが、可能性としては、

- 1) 生体が鉱質ステロイドに対し感受性が高い(ステロイドの過剰はなくてよい)
- 2) アルドステロンのごく軽度の増加がある。
- 3) 未同定の鉱質ステロイドの過剰があるのいずれかが考えられ、今後この問題の進展が注目される。

本文は、第182回順天堂医学会学術集会講演旨で、臨床例などの図・表を省略して問題点のみを抄録したものである。

文 献

- 1) Souadjian, J. V. & Schirger, A : Am. J. Med. Sci., **254**, 1305, 1967
- 2) Earll, J. M., Kurtzman, N. A. & Moser, R. H. : Ann. Int. Med., **64**, 378, 1966
- 3) Fuller, H., Spittel, J. A., McConahey, W. M., & Schirger, A : Postgrad. Med., **40**, 425, 1966
- 4) Biglieri, E. G., Herron, M. N. & Brust, N : J. Clin. Invest., **45**, 1946, 1966
- 5) New, M. I. & Peterson, R. E. : J. Clin. Endocr., **27**, 300, 1967
- 6) Spark, R. F. Now. Eng. J. Med : **287**, 343, 1972