原 著

椎 骨 動 脈 の 局 所 解 剖 学 的 研 究

Topographical Studies on the Vertebral Artery

大 貫 裕 康

Hiroyasu ŌNUKI*

内 容 目 次

- §. 研究のいとぐち。
- §. 文献にみられるこれまでの研究と
椎骨動脈に就いての現在の知識。
- §. 研究目的、材料と方法。
- §. 研究の結果と考察。
- §. 総括と結論。
- (附) 引用文献。

§ 研究のいとぐち

造影剤の血管内注入による脳血管撮影法が生れて、内科、外科、神経科等の領域に於ける診断、治療に長足の進歩を来したことは人のよく知る所であるが、その方法たるや、初めは専ら頸動脈に造影剤を注射する方法によった (Moniz等)。而もそれは手術によって動脈を露出して行く切開法であった。これは確実な方法ではあるが、皮を切るといふことは後に傷痕を残すために気安く行ふことが出来ないばかりでなく、同じ人に繰返し行うことは、たとえ必要があっても、仲々難しいという欠点がある。

この欠点を除いた清水健太郎 (1932年) の単純経皮法は皮膚の上から触れて動脈を探し出しそこへ注射するという頗る簡単な方法で、切開法よりか幾らか不確実ではあるが、気軽に行える点が非常に有利で、このために脳動脈撮影法は長足の進歩をし、それによる診断、治療に大なる貢献をなした。

周知のように、脳を養う血は A. carotis interna と vertebralis により供給され、この2

つの動脈の末は Willis の動脈輪を作って吻合する。然し2つの動脈の灌流する領域は、個人的に少しの差はあっても、各個人に於いて大体一定であって、僅な状況の変化では変らないことが明らかにされた。これはこの脳血管撮影法によるこれまでの知見の誤りを正した1つの例である。

然るにこの頸動脈 (Carotis) 注射による脳血管撮影法では Carotis 支配下の脳の前、中部の状況は分るが、後部の状況は出て来ない。所がその後部の支配者である椎骨動脈は Carotis より深い所にあり、簡単な切開では出て来ないし、それを出すために深い所迄解剖を進めることは流石の白人もよくならなかった。

所が、1933年、Moniz は600の脳血管像の写真の中5例に脳底動脈 (A. basilaris)、後大脳脈 (A. cerebri posterior) と1例の小脳動脈 (A. cerebellaris) のはっきりしているのを見出した。これは彼等の切開法による写真であるから、造影剤は Carotis→Brachiocephalicus→Subclavia→Vertebralis と流れたものでなければならぬ。そこで彼は A. subclavia を Fossa supraclavicularis で切開により露出し、造影剤が A. vertebralis 以外の他の末梢に流れるのを防ぐように Matus-Klemme で圧えて後、注入することにより A. vertebralis の撮影に成功したが、しかし、この方法は A. subclavia に多数の分枝があるため多量の造影剤を必要とし、而も余り良い結果が得られないことが多いということなどのため、多くの人によって実施されなかった。

*順天堂大学医学部解剖学教室
昭和32年2月2日受付

1935年, Olivecrano は A. vertebralis に直接注入することを思ひ立ち, 成功したが, それは切開法によるもので, 動脈の在り場所よりして, 相当高度の外科的技術を必要とし, Carotis よりするものに比べ甚だしく困難で, 余り実際的とは云えない。

初めから直接 A. vertebralis 注入法による経皮的に脳血管撮影を実施したのは高橋角次郎²¹⁾ (1938年) である。彼は数百, 千に及ぶ経皮的 Carotis 注入法による脳血管撮影法を実施したが, その中時々異常な像に出会うことに気がついた。初めはそれを失敗例だと思っていたが, 大凡 300 例位に 1 回の割でそれが出るのに気が付き, 改めて注意して像を調べると, それは後頭部の血管像で, それが Carotis の積りで Vertebralis に注入したものであることに思い至った。これは偶然ではあるが, 方法を以てすれば, 割にたやすく, 経皮的に Vertebralis に注入することが出来ることを悟った。彼は屍体に就いて, 局所解剖学的考察を進め, 彼自身の独自の注射方式を考え出した。それは彼の著“脳血管撮影法”に詳しいが, それを要約すると:

A. carotis communis は前から見れば, 上に昇るに従い, わきの方にそれて, ほぼ甲状軟骨の上縁で内, 外の頸動脈に分れるが, A. vertebralis は A. subclavia から分れて上に行くに

したがいい, 内に傾き, 第VI頸椎の横突孔に入る。だから前から見れば Carotis と Vertebralis は恰も交叉するように見える。交叉点より上では Vertebralis が内である。彼はこの交叉点と Subclavia よりの分岐点を求め, それより Vertebralis の走行を決めようとした。それには患者を仰向けに寝かせて, 頭を出来るだけ後に曲げさせ, 甲状軟骨の最も前に突出した所 (上甲状切痕) から 4 cm 下で横に水平線を作り, それが総頸動脈 (この走向は搏動を触れて決める) と交わる点を求める。これが Vertebralis と Carotis の交叉点に当る。次に Clavicula の内側の端からその上縁に沿うて 2 cm 側方に点を求める。これが Subclavia より Vertebralis の分れる点にほぼ一致する。この点と前述の交点とを結びつけると, これが Vertebralis の走向にほぼ一致するから, この線上の何れの部分からでも注入が出来るわけであるが, Carotis と Vertebralis との前より見ての交点より下で, Clavicula に余り近くない所が穿刺点として工合がよいという。(Fig. 1.)

教室主任椿教授はこの方法による時は容易に経皮的に Vertebralis に注入することが出来るという高橋の敘述に疑を抱いた。後に示す様に Vertebralis の Carotis に対する位置関係は高橋のいう如く簡単ではないからである。

Fig. 1: Relation between arteria carotis and vertebralis.
(Original, Takahasi, K.; Nokekkan-Satueiho)

そこでこの間の関係を明らかにすべく、1949年以降、学生解剖実習用屍体に就いて調査を進めていたが、1951年以後この調査研究は著者に委ねられた。

事実、著書では頗る簡単に成功するかの如く述べているが、著者高橋自身の述懐によれば、Vertebralis の注射は毎回必ずしも容易ではなく、かなりの熟練を要し、成功するまでには何度も針を刺し直すことが稀でないという。

このことは後述する⁽¹⁸⁾著者の研究結果を裏書するものであり、佐野⁽¹⁸⁾(1950年)が Vertebralis の走行途上でなく、その第VI頸椎横突孔に入ろうとする辺をねらった理由でもある。

A. vertebralis を捉えるにはこの外動脈が Atlas の横突孔を出て、Arcus posterior の Sulcus a. vertebralis を通り、Membrana atlantooccipitalis posterior を貫いて Cavum cranii に入るまでの所の方がより確実らしく思われる。そして Berczeller und Kugler⁽⁴⁾は屍体に就いて実験的に行っており (Freilegung der Arteria-vertebralis am Sulcus atlantis : 1937)、高橋の談によれば、アメリカで生体で実施した報告があるとのことであるが、それに就いての文献を見付るとが出来なかった。

§ 文献に見られるこれまでの研究と椎骨動脈に就いての現在迄の知識

脳を養う重要な動脈でありながら、Vertebralis については割に研究が少い。そして文献に出ているものは多くは“破格”の1例報告で、それも Vertebralis が Arcus aortae より出ると報告が多い。

Adachi (足立文太郎) はその大著, “Das Arteriensystem der Japaner (1928)” の中で A. vertebralis のいろいろな型を報告している。清水⁽¹⁹⁾の, “胎児動脈系の解剖学的研究: 椎骨動脈について”⁽²³⁾も同様である。同様なことは A. Thomson の報告にもあるが、これらは Vertebralis がどこから分かれるかを示したものでいくつかの型に分け、その頻度を挙げているのであるが、これらに就いては後に又ふれる。

然し、これらは椎骨動脈それ自身についての

み詳しく、それと他のものとの関係は、ことに位置関係は考慮されていない。而して動脈の他の器官との位置関係を主に見ている研究報告は未だ知らない。

解剖学教科書や局所解剖学の本によると (例へば, Benninghoff⁽³⁾, Corning⁽⁸⁾, Gray⁽¹⁵⁾, Rauber-Kopsch⁽¹⁷⁾, Schultze⁽²⁰⁾ 等の著書), 椎骨動脈は次の様に述べられている。

A. vertebralis は A. subclavia の最初の、そして割に太い枝として出て、M. scalenus anterior より上方で後ろに引張られ、第VI(少数は第V)頸椎の横突孔に入り、それより頸椎の横突起の孔を連絡して作られる管の中を第II頸椎まで上り、第II頸椎横突孔の中で後ろ、外の方へ曲り(第I屈曲)、そこより弓形にAtlasの横突孔の中に達し(第2屈曲)、それを出て後ろ、内に曲って Atlas の後弓の上面に出来る椎骨動脈溝 (Sulcus a. vertebralis) に横たわり(第3屈曲)、最後に Atlas 後弓から Foramen magnum 側辺で前上に引かれて(第4屈曲)、Membrana atlantooccipitalis 及び Dura mater を貫いて頭蓋腔内に入る。頭蓋腔内に入った A. vertebralis は上前、内側に進み、Pons の下縁、Clivus の上で左右が1本の A. basilaris に合し、更に上前に進んで、Pons の前縁で左右の最終枝 A. cerebri posterior に分れ、A. communicans posterior を通して、A. carotis interna の最終枝と連絡し Circulus arteriosus (Willisii) を形づくるが、その間に脊髄や小脳へ脊髄枝、硬膜枝、前後の脊髄動脈、後下小脳動脈等を出す。

以上の様な記述は大体に於いて正しい。而して付近の器官との関係に於いては A. vertebralis は4つの部分に分けて述べられている。

第1部: 起りより後ろの方へ M. longus colli と M. scalenus anterior の間に向って走る部分; 動脈のすぐ前には V. vertebralis があり、更に前には V. jugularis interna があり又 A. thyroidea inferior がよぎる。左椎骨動脈ではその外胸管がよぎる。背後には第VII頸椎横突起、交感神経幹及びその下頸神経節がある。

(然しこの交感神経は動脈の前を走ったり、又神経節も前にあったりすることは我々の調査で明らかになった)。

第2部：第VI頸椎横突孔より上方 Atlas に向って走り、そして下頸神経節の枝により又頸の下部で椎骨静脈が発達する静脈叢によって囲まれる。Epistropheus まで殆んど垂直、それより上側方に Atlas の横突起に向って走る。

第3部：外側頭直筋の内側の上で最後の孔から出て、Atlas の上関節突起の後ろで後ろに曲り、環椎後弓の溝を走る。そして後環椎後頭膜を貫いて脊椎管に入る。動脈は此の部では M. semispinalis capitis に蔽われ、後頭下三角(大後頭直筋、上頭斜、下頭斜筋によって境される三角形の所)内にある。椎骨動脈と環椎後弓の間には第1頸神経及び後頭下神経が存在する。

第4部：硬膜を貫き、延髄の前で内側に傾く。そして舌下神経と第1頸神経の前根枝の間及び歯状靱帯の下に位置する。橋の下縁で他側の椎骨動脈と合して脳底動脈を形成する。

我々の調査研究は、この中第1部と第3部の部分に就いてであり、第2、第4部は考への中に入れてない。というのは我々の目的が椎骨動脈の位置を推測又は確めて、経皮的にそれに薬剤を注入し得るための基礎資料たらしめたいというにあるからである。

前述のように高橋は表面上より椎骨動脈の位置を決める方法として、頭を後ろに出来るだけ曲げた位置で、上甲状切痕から下4cmの所に横に水平線を引き、それが総頸動脈と交わる点を求め、一方鎖骨の内側端からその上線に沿って2cm側方の点と前述の点とを結ぶとその直線は前方から見た椎骨動脈の走行に一致するという。

然し佐野はそれに反対し(1950)、注入には第VI頸椎横突起を目標にする方が簡単且つ確実だという。それは左右共に C₆ に入るのが88%、とにかく1側が入る場合は93.6%であり、C₆の前結節即ち所謂頸動脈結節は触知出来るから、輪状軟骨及至は頸動脈結節の高さ或はそれより

1~2cm 下方で、頸動脈(その搏動が触れ得るなら)の走行より稍々内方頸側に針を進めるとよいという。

はたしてそうだろうか？

§ 研究目的、材料と方法

研究の目的は、イトグチにも述べてあるように、A. vertebralis に薬剤を注入するに最も良い方法を発見するための基礎として、この動脈が他の器官、ことに A. carotis, Atlas 等と如何なる関係にあるか？ その分岐の有様、太さ、走り方、交感神経との関係等を明らかにするにあった。

材料となったものは順天堂大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京女子医科大学に於ける学生実習中の屍体で、その数は次の様に総数135体(内♂92, ♀43)である。

	順天堂	東京大学	東医歯大	東京女医大	計
合	21	46	22	4	93
♀	24	10	5	3	42
計	45	56	27	7	135

材料の年齢分布は Table 1 に示す如く、50才より80才に至る間が最も多く、割に老年者である(平均年齢♂55才, ♀65才)が、然し50才以下のものも31例(約1/4)ある。最高年齢は♂93才, ♀90才, 最少は♂20才, ♀24才である。尤も年齢の中には推定年齢のものも含まれている。

これらの材料を学生の実習中、適当な時に自ら必要な所を解剖して、必要な部分(頸部の)を正面より見て、出来るだけ正確に写生し、その材料を後に整理したのであるが、何分にも学生の実習中のことなので、時には必要な部分が除れていたりして(ことに神経がそう)思う通りにならなかった面もあるが、調査したものは正確な所だけである。

写生図には Arcus aortae, Truncus brachiocephalicus, A. carotis communis, A. subclavia, A. vertebralis, M. scalenus anterior, M. longus colli, 時に M. longus capitis, Ganglion cervicale medium, inferius 等である。

Table 1. Distribution of age.

Age	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Male	1	2	1	1	1	2	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1
Female	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Age	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Male	1	1	2	1	1	2	2	0	0	1	1	4	2	0	0	3	4	1	1
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
Age	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Male	3	2	2	0	3	3	5	2	1	2	0	1	2	2	2	4	3	0	0
Female	0	0	3	1	2	0	0	1	0	1	1	2	1	1	4	2	0	0	1
Age	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
Male	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Female	2	2	4	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Age	Unknown		Total		Mean														
Male	9		92		53.4														
Female	3		43		65.8														

写生の外、計測として *A. vertebralis* の起りより *M. longus colli* (又は *capitis*) の後ろに入る所までの長さの直線距離、及びその所の血管の太さ、Atlas の左右の横突孔より *A. vertebralis* が出て来る所でその1方の外側より他方の外側までの幅等を計ったが、これは材料全部について調べることが出来ず、例数は全部で35例に止まった。主に順天堂の材料に就いてである。計測はmmを単位とし(血管の太さには0.5mmまで読んだ)、スベリザシ(Gleitzirkel, sliding caliper)を用いた。

各屍体に就いての調査事項の一覧表は Table 2 に示した。

尚 Carotis や Vertebralis の Sternum や Clavicula に対する位置などを見ようとしたが、何分にも学生実習中の材料なので思うに委せず、1, 2 成功したものもあるが、統計的に扱う程多数ではなく、又 Cartilago thyreoidea に対する Vertebralis の位置を確かめようと写真を撮ったのも3, 4 あるが、之亦同様不成功に終わった。

而して、これらを次の様な項目に分けて整理し、考察した。

- I. 椎骨動脈の起始に就いて。
- II. 大動脈弓より起る枝の配置。
- II. 椎骨動脈の入口に就いて。
- IV. 椎骨動脈と総頸動脈との走行関係。

V. 椎骨動脈の走行方向。

VI. 椎骨動脈の長さに就いて。

VI 椎骨動脈の太さに就いて。

VII. 椎骨動脈、総頸動脈及び鎖骨下動脈の異常屈曲に就いて。

IX. Atlas 部に於ける椎骨動脈。

1. 出口に於ける左、右椎骨動脈間の幅。
2. 左、右椎骨動脈の中心までの距離。
3. 入口に於ける左、右椎骨動脈間の幅。
4. 椎骨動脈の出口及び入口に於ける太さ。

X. Atlas に於ける観察と計測。

1. 観察。
2. 計測。

§ 研究の結果と考察

I 椎骨動脈の起始について (Tab, 2 参照)

A. vertebralis は *A. subclavia* の第1枝であるのが普通だが、その他 *Arcus aortae* などから出るものも少数ながらある。著者の調査例でも、

(4): 左右の椎骨動脈が夫々の鎖骨下動脈から出ているものが

$$^{113}/_{120} \text{例} = 94.2\% \pm 2.15\%$$

$$\text{♂ } ^{75}/_{81} \text{例} = 93.8\% \pm 2.70\%$$

$$\text{♀ } ^{38}/_{40} \text{例} = 95.0\% \pm 3.45\%$$

此の中の No.66(♂)の左椎骨動脈は左鎖骨下動脈が大動脈弓より起って間もなくその右側より分れて出ていたが、大動脈弓よりその所

迄の距離は計らなかつた。又、No. 42(♂)では左は左鎖骨下動脈から出ていたが、右は Truncus brachiocephalicus が総頸動脈、鎖骨下動脈に分れるその分岐角から出ていた。これは非常に珍しい例で、右が Subclavia より以外から起ることは、他の研究者もまれにしか報告していないことは後に示す如くである。

(四)：右の椎骨動脈は右の鎖骨下動脈から出るが、左は大動脈弓より直接に、然も全て左鎖骨下動脈よりも右に、即ち左総頸動脈と左鎖

骨下動脈の間より起っていたものが、

$$7/120 \text{例} = 5.8\% \pm 2.13\%$$

$$\text{♂ } 5/80 \text{例} = 6.3\% \pm 2.72\%$$

$$\text{♀ } 2/40 = 5.0\% \pm 3.45\%$$

この中No. 11, No. 55, No. 94の♂, No. 107の♀では、左椎骨動脈と左総頸動脈は大動脈弓で分岐角を作って、つまり、相接して起っていたが、No. 49の♂では左総頸動脈と左椎骨動脈の間が少し離れて別別に Arcus aortae から起っていた。(No. 132♂, No. 68♀ も Table 3 ではこの中に入るが)

Table 3. Frequency of variation in various races.

Human race	Reporter	Number of specimens	Number of variations	Percentage
Japanese	Author	120	7	5.83%
Japanese	Adachi	516	25	4.83%
English	English committee	500	29	5.8%
English	Quain	290	5	1.7%
American mulatto	Bean & De Garis	144	4	2.8%
American	De Garis	52	1	1.9%
Italian	Pellegrini	52	3	5.8%
Japanese (Fetus)	Mori	58	4	6.9%

Fig. 2: Various types of Arcus aortae and its branches.
(Original, Adachi, B: Das Arteriensystem der Japaner)

Table 2-1. List of specimens, showing the length, thickness and entrance height type and direction of vertebral artery etc.

No.	Sex	Age	Length		Thickness		Entrance		Type		Direction		Note		
			R	L	R(B)(E)	L(B)(E)	R	L	R	L	R	L			
1	♂	50					C ₆	C ₆	A	A	M	P			
2	♀	70					C ₆	C ₆	C ₁	C ₁	M	P	Fig. 6—2		
3	♂						C ₆	C ₆	A	A	M	M			
4	♂	50					C ₆	C ₆	C _{II}	A	P	M	Fig. 6—1		
5	♀	78					C ₆	C ₆	A	A	M	M			
6	♂						C ₆	C ₆	D	C _{II}	P	L	Fig. 6—3		
7	♂	22	35	60	3.5	3.5	C ₅	C ₅	A	A	M	M	Fig. 4—2		
8	♂	64	25	47	5	4	C ₆	C ₅	A	C _{II}	M	L			
9	♂	21	9	30			C ₆	C ₆	C _I	B	M	P	Fig. 4—5		
10	♀	50	13	16	3	3.5	C ₆	C ₆	A	C _I	P	P			
11	♂	27	19	77	5	3.5	C ₆	C ₅	A	C _{II}	M	L	L from the aortic arch		
12	♂	24	32	43	6	3	4	3	C ₆	A	C _{II}	M	P	Fig. 5—1	
13	♂	72													
14	♂		31	33	3.5	2	7	5	C ₆	C ₆					
15	♂		46	39	3.5	3.5	5	5	C ₅	C ₆					
16	♀	50	23	29	3.5	3	5	3	C ₆	C ₆					
17	♂	48	26	32	4	3	3.5	3.5	C ₆	C ₆					
18	♀	60	34		5	5	4	C ₆	C ₆						
19	♂	20													
20	♂	55	20		4	3	6	3	C ₆	C ₆					
21	♂	72													
22	♂	64	33	31	6	6	6	6	C ₆	C ₆					
23	♂	25	29	33	5.5	4	4	3.5	C ₆	C ₆					
24	♂	58	22	55	6	4.5	3.5	3	C ₆	C ₆					
25	♂														
26	♀	72	13		5	5	3.5	3.5	C ₆	C ₆					
27	♂	93	30	42	4	3.5	3.5	4	C ₆	C ₆	D	C _{II}	M	L	Fig. 4—9
28	♀	65	19	25	4.5	4	5.5	5	C ₆	C ₆	D	C _I	M	M	Fig. 5—2
29	♂	73	21	28	5	5	5	5	C ₆	C ₆	A	D	M	P	
30	♀	71	15	20	2.5	2	4	3	C ₆	C ₆	D	C _I	P	P	

Table 2-2.

No.	Sex	Age	Length		Thickness		Entrance		Type		Direction		Note
			R	L	R(B)(E)(L)	L(B)(E)	R	L	R	L	R	L	
31	♂	57	25	30	5	4	4	C ₆	C _I	C _{II}	M	M	Fig. 4-6
32	♀	57	20	20	3.5	3	4	C ₆			M	P	
33	♂	65	20	25	4.5	3	5	4	C ₆	B	P	P	Fig. 4-4
34	♂	71		29		5.5	6	7	C ₆			M	
35	♀	81	34	20	4.5	4	3	C ₆			M	P	
36	♂	64	27	26	3	2	6	5.5	C _I	C _{II}	M	P	
37	♀		13		5	5	3.5	3.5	C ₆		L	P	
38	♂	50	29	29	4.5	4.5	5	5	C ₆	C _{II}	D	M	Fig. 6-4
39	♀	62	16	11	6	5	4.5	4	C ₆	A	D	M	Fig. 6-5
40	♂	64	24	36	5.5	4	3.5	4	C ₆	D	B	M	
41	♂	55	14	24	4	3.5	4	4	C ₆	D	C _{II}	M	
42	♂	55	79	37	7	4	4	3.5	C ₄	D	C _{II}	M	Fig. 5-3
43	♂	37	12	39	4	3	5	5	C ₆	A	B	M	Fig. 4-3
44	♂	63	30	37	4	4	4.5	5	C ₆	C _{II}	C _{II}	M	Fig. 4-7
45	♂	59	18	41	3.5	3	4.5	3.5	C ₆	D	B	M	Fig. 4-8
46	♀	69	25	26	4	4	5	4	C ₆	C _I	A	M	Fig. 6-6
47	♂	73	26	35	4.5	4.5	3.5	3.5	C ₆	D	B	M	Fig. 7-6
48	♂	63	22	24	4	3	4	5	C ₆	D	A	M	
49	♂	31	13	78	5	4	3	2.5	C ₆	A	C _{II}	M	L from the aortic arch
50	♂	41	16	9	5	4	4	4					
51	♂	58	20	26	3	3	5	4	C ₆	C _I	D	M	
52	♂	29	39	45	4	4	5	4	C ₆	C _{II}	C _{II}	P	
53	♂	30	22	29	4	4	4	4	C ₆	D	B	M	
54	♀	24	19	24	5	3	4	4	C ₆	C _I	A	M	Fig. 35-4
55	♂	44	28	91	7	7	4	4	C ₆	C _I	C _{II}	P	Fig. 5-5
56	♂	25	14	33	5	4	4	4	C ₆	A	B	M	L from the aortic arch
57	♂	37	20	21	3	3	4	2	C ₆	A	A	M	
58	♂	77	18	28	3	3	5	4	C ₆	C _I	C _{II}	M	Fig. 5-6
59	♂	50	20	20	4	4	5	4	C ₆	C _I	C _I	P	
60	♂	40	32	30	3	3	4	4	C ₆	C _I	C _{II}	P	Fig. 5-7

Table 2-3.

No.	Sex	Age	Length		Thickness		Entrance		Type		Direction		Note
			R	L	R(B)	L(B)	R(E)	L(E)	R	L	R	L	
61	♂	59	24	49	6	4	5	5	C ₆	C ₆	D	C _{II}	M P
62	♂	39	23	31	4	4	4	4	C ₆	C ₆	A	B	M P
63	♂	62		30			5	4	C ₆		B		L
64	♂	62	19	30	3.5	3.5	6.5	5	C ₆	C ₆	D	D	
65	♀	60	22	28	5.5	4	7.5	6	C ₆	C ₆	C _{II}	B	P
66	♂	38	37	110	4	4	4	2.5	C ₆	C ₆	C _{II}	A	P
67	♀		25	24					C ₆				L almost from the aortic arch Fig. 5-8
68	♀	90		90			4	3	C ₆				P L from the aortic arch
69	♂		17	18	5	3.5	4.5	4	C ₆	C ₆	A	C _I	M
70	♂			28			5	4.5	C ₆				M
71	♂	43	29	35	4	3	6.5	5	C ₆	C ₆	A	C _{II}	M P
72	♀		41	42	5.5	5	4.5	4	C ₆	C ₆	D	B	P L Fig. 5-9
73	♂		18	22	3	3	5	4.5	C ₆	C ₆	D	B	M L Fig. 5-10
74	♂	42	55	33	4	3	4	4	C ₆	C ₆	D	D	P P
75	♂	64	63	39	4	4	4.5	4.5	C ₆	C ₆	D	C _{II}	P P
76	♂	60		59			4	3	C ₆		C _{II}		P
77	♀	60							C ₆	C ₆	D	C _{II}	P Fig. 5-11
78	♀	34	30	26	3	3	3	3	C ₆	C ₆	B	D	P P
79	♂	60	29	36	4	3	5	3.5	C ₆	C ₆	A	B	P P
80	♂	54	28	30	4.5	4	4	4	C ₆	C ₆	B	B	L L
81	♂	63	28	30	4	4	4	4	C ₇				P L
82	♂	65	27	34	6	5	5	4	C ₆	C ₆	C _I		M P
83	♂	51	33	28	3	3	4.5	4.5	C ₆	C ₆	C _{II}	C _{II}	P L
84	♀	62	14	19	5	4	3.5	3.5	C ₆	C ₆	C _I	A	M P
85	♀	78	26	23	4	3	5	4	C ₆	C ₆	D	B	P L
86	♂	70	22	24	5	4	4.5	3	C ₆	C ₆	C _I	C _I	M P
87	♂	74	45	43	3	2.5	4	4.5	C ₅	C ₅	C _{II}	C _{II}	P L
88	♀	69	20	15	4.5	3	3.5	3	C ₆	C ₆	C _I	C _{II}	M L Fig. 7-3
89	♂	67		35			4	4			B		P
90	♂	51	43	45	3	3	5	4.5	C ₅	C ₆	D	C _{II}	P P

Table 2-4.

No.	Sex	Age	Length		Thickness		Entrance		Type		Direction		Note
			R	L	R(B)	L(B)	R(E)	L(E)	R	L	R	L	
91	♂	21	30	46	4	3.5	5	4.5	C ₆	C ₆	C _I	B	M P
92	♂	23	25	33	4	3	4	3.5	C ₆	C ₆	C _I	B	M P
93	♂	43	28	45	3.5	3.5	5	5	C ₆	C ₇	C _{II}	B	L P
94	♂	27	48	95	5	4	4	4	C ₅	C ₄	C _{II}	P	P L from the aortic arch
95	♀	61	28	48	4	4	3	3	C ₆	C ₆	D	C _{II}	L
96	♂	70	24						C ₆		D	D	M L Fig. 7-4
97	♂	56	14	13	6	5	4.5	4.5	C ₆	C ₆	D	D	M L
98	♀	81	16	16	4	4	3.5	3.5	C ₆	C ₆	C _I	B	P L
99	♂	73	21	24	3	3	3.5	3.5	C ₆	C ₆	C _I	A	M P
100	♀	79	17	22	7	6	3.5	3.5	C ₆	C ₆	D	A	M P
101	♂	74	22	27	3.5	3.5	3	3.5	C ₆	C ₆	C _I	A	M M
102	♂	74	30	20	3	3	5	4	C ₆	C ₆	D	C _I	M M
103	♀	72	14	20	4	4	4	4	C ₆	C ₆	D	B	M L
104	♂	62	16	16	6	5	5	4	C ₆	C ₆	D	C _I	M P Fig. 7-1
105	♀	68	17	9	4	4	3	3	C ₆	C ₆	D	D	M M Fig. 7-2
106	♀	72	16	20	5	5	6	6	C ₆	C ₆	C _I	A	M M
107	♀	73	17	78	6	5	4	3	C ₆	C ₆	C _I	B	M L from the aortic arch
108	♀	77	14	25	4	4	4	4	C ₆	C ₆	D	C _I	M L
109	♂	59	24	27	4.5	4	4.5	4	C ₆	C ₆	D	D	P P
110	♀	79	21	24	5.5	5	5	5	C ₆	C ₆	D	A	M M Fig. 7-5
111	♂	41	24	30	3	3	3	3	C ₆	C ₆	D	B	M L
112	♂	45	20	28	4	4	5	5	C ₆	C ₆	A	A	M P
113	♀	37	23	37	3	3	5	4	C ₆	C ₆	A	C _{II}	M L
114	♂	58	24	37	3	3	3.5	3	C ₆	C ₆	D	A	M P
115	♂	54	28	30	4.5	4	4	4	C ₆	C ₆	D	C _I	M P
116	♂		16	28	4.5	4	4	4	C ₆	C ₆	D	B	M P
117	♀	29	23	50	5	3	5	4	C ₆	C ₆	C _I	D	P L
118	♂	54	18	28	6	5	5	4.5	C ₆	C ₆	A	C _I	M M
119	♂	54	5	35	6		8	5	C ₆	C ₆	D	B	M P
120	♀	79	18	25	3	3	4	4	C ₆	C ₆	A	A	M M

Table 2-5.

No.	Sex	Age	Length		Thickness				Entrance		Type		Direction		Note
			R	L	R(B)	(E)	L(B)	(E)	R	L	R	L	R	L	
121	♂	66	20	30	6.5	6.5	3	3	C ₆	C ₆	A	A	M	M	Fig. 4—1
122	♀	84	16	20	4.5	4	4.5	4	C ₆	C ₆	A	A	M	M	
123	♀	72	25	23	3	3	6	5	C ₆	C ₆	A	A	M	M	Fig. 6—7
124	♂	79	30	17	5	5	4	4	C ₆	C ₆	A	B	M	L	Fig. 6—8
125	♂	69	36	34	5.5	5	5.5	4	C ₆	C ₆	<u>B</u>	<u>B</u>	P	M	
126	♀	76	19	14	2.5	2.5	4.5	3.5	C ₆	C ₆	A	C _I	M	M	
127	♂	73	19	29	5.5	5.5	6	6			D	B	M	L	
128	♀	83	13	14	4	4	4	4	C ₆	C ₆	A	C _I	M	P	Fig. 4—10
129	♂	67	34	33	5	4	5	4			C _{II}	C _{II}	M	M	
130	♀	77	21	30	5	4	5.5	4.5			D	D	M	P	
131	♀	73	42	19	7.5	7.5	4.5	3.5			D	<u>C_{II}</u>	M	L	Fig. 6—9
132	♂	45	43	78	4.5	3.5	4.5	3.5			B	C _{II}	P	P	Fig. 4—11
133	♀	67	22	22	5	4	5	5			D	C _{II}	M	L	L from the aortic arch Fig. 6—10
134	♀	79	27	32	4	4	6.5	6			C _{II}	C _{II}	P	P	
135	♂	71	30	36	5	5	6	6			D	C _{II}	P	L	Fig. 6—11

Type E
2 cases
or 0.4%

Type G
1 cases
or 0.2%

Type H
1 cases
or 0.2%

Fig. 3 : Other types of Arcus aortae and its branches.
(Original, Thomson, A; J. Anat. and Physiol.)

而してこれより以外の型は著者の検査した範囲内では見られなかった。この(イ)は所謂普通型で、(ロ)は Variation と見なされる。

然し Variation としては最もありふれた型で、約 6 %位の頻度があるものらしい。これより以外の型は稀にしか見られないもので、500例、1000例 に就き何例という位の頻度らしい。これまで報告された型を挙げるならば

(イ) : (ロ)と同様ではあるが、左椎骨動脈が左鎖骨下動脈よりも後から大動脈弓より出るもの (足立の E 型、3 例・0.6%—Fig. 2 参照)。

(ロ) : 左椎骨動脈が左鎖骨下動脈から分れるが、左の椎骨動脈が直接 Arcus aortae から出ている場合 (English comittee の G 型、1 例・0.2%—Fig. 3 参照)。

(ハ) : 左椎骨動脈は大動脈弓より、そして右椎骨動脈は右総頸動脈より出る型。この時右鎖骨下動脈が Truncus brachiocephalicus より出ずに下行大動脈より出て、右椎骨動脈が右総頸動脈より出る型 (Comittee の H 型、1 例 0.2%—Fig. 3 参照)。

などがある。

前に述べた様に Variation の中(ロ)の型、即ち右椎骨動脈は右鎖骨下動脈から分れ、左椎骨動脈は大動脈弓から直接出る型 (A. carotis communis と subclavia との間)は割に多く見られるもので統計的な報告も多い。Table 3 はこれらの報告と著者のものとをまとめたもので日本では足立が 500 余の材料に就いて、英人に

ついては Quain, English comittee, アメリカ混血人に就いては Bean Bezug²⁾ イタリア人については Pellegrini⁴⁾ アメリカ白人については、^{5), 6), 7)} De Garis の調査である。尚日本人胎児について^{10), 11)}の森の報告も加えた。この中アメリカ混血人について行った Bean と De Garis のものは

(a) Bean は 57 体中 3 体

(b) De Garis は 87 体中 1 体

を合せたものを記入して置いた。

著者の結果は英国人について行った Comitt-
ee の結果と同じ割合を示し、足立の結果と比較すると 1 %程高い値になっているが確な差とは云へない。Pellegrini も例数は少ないが大体 5.8 %を示し、Bean だけのものについて云えば 5.3 %である。然し Quain, Bean & De Garis, De Garis では割合に低い値が出されている。その理由は分らないが、しかし人種差とは思われない。イギリス人やイタリア人でも 5 %前後の割合で此の破格があることを考えるとヨーロッパ人と日本人との間にこの破格に就いて人種的な頻度の差があるとは考えられない。又森の日本人胎児では著者及び他の報告者に比較して 1 ~ 2 %位高い値を示しているが、有意な差とはいえない。

男女の間に於ける関係を見るに

	♂	♀
著者	6.3% ± 2.72% (⁵ /80 例)	5.0% ± 3.45% (² /40 例)
足立	5.4% ± 1.12% (²² /404 例)	2.7% ± 1.53% (³ /112 例)

という結果になっているが、男子に就いてみると著者と足立の間には1%以下の差で問題はなく、又女子に就いてみるにその間の差は2%強となっているが有意の差はみられていない。

此外、左椎骨動脈は記載していないが、右鎖骨下動脈が大動脈の最後の枝として出る場合に右椎骨動脈が右総頸動脈から出ていたもの（鈴木、平光、長谷部）、左椎骨動脈が左総頸動脈より出ていたもの（Krause）、右椎骨動脈が第1頸椎の高さで右内頸動脈より出ていたもの（平光〔1919〕）等も報告されてはいるが、これらを見る事は極めて稀で、500~1000 或はそれ以上に1例位の割合であるらしく、椎骨動脈に注射をする目的で、その存在位置を推定する手掛りとしては(4)及び(5)の型を考慮に入れるだけで十分である。

然しこの椎骨動脈の起りのいろいろの型の問題については、大動脈弓より分れる色々な動脈がどんな順序で、どんなにして分れるかという問題を考える必要が出て来る。

II. 大動脈弓より起る枝の配置

大動脈弓より起る動脈の順序は先づTruncus brachiocephalicus が分れて（それは更に右総頸動脈と右鎖骨下動脈に分れる）、次に左総頸動脈、左鎖下動脈の順に枝分れするのが普通である。が、この外尚色々な型がある。著者の調査範囲に於いても総数85例に於いて：

(1). 普通型：68例（♂44例，♀24例）80%

一足立のA型，森のA型

(2). 左総頸動脈が腕頭動脈と同一管として大動脈弓より出るもの：10例，11.7%

一足立のB型，森のB型

No. 40, No. 46, No. 64, No. 66, No. 69,
No. 73, No. 114, No. 119, No. 124, No.
131（♂8例，♀2例）

(3). 左椎骨動脈が直接大動脈弓より起って、而も左総頸動脈と左鎖骨下動脈の間より出るもの：4例・4.7%一足立のC型，森のC型。

(4). 普通型ではあるが、腕頭動脈と左総頸動脈との間が大きく離れた距離にあるもの：

2例・2.4%

No. 41（♂），No. 92（♂）

(5). 普通型ではあるが、左総頸動脈と左鎖骨下動脈との間が大きく離れた距離にあるもの：

1例・1.2% No. 112（♂）

以上の如く5型を分類出来た。尤もこの(4), (5)は大きくはなれたとはいっても計測をしたわけではなく図に就いて目測で判定したものである。

之を先人の研究と比較してみるに、足立はその「日本人の血管系」に於いてA—Gの7つの型を分類している。（Fig. 2.）

今之をみると、A型即ち普通に見られる型は80%を占め、B型即ち左総頸動脈が腕頭動脈と同一管として大動脈弓から起る型は11%、C型即ち左椎骨動脈が総頸動脈と左鎖骨下動脈の間で而も大動脈弓より起始する型は4%となり、A, B, C型で95%を占め、D, E, F, G型は極めて稀なものとなっている。

又Anatomical Society of Great Britain and Ireland²³⁾のCommitteeによる報告ではA—Hの8型を報告しているが、足立のA, B, C型と同じ型のA, B, C型が夫々82%, 10%, 5%で全体の97%を占め、割合も殆んど足立と同じようで、他は極めて稀である（Fig. 3）。足立のSchemaと重複しないものはそのF, G, Hの3つであるから、これから分枝型を分けると10型になる。

足立やEnglish committeeはArcus aortaeより枝分れする動脈の順序は考へるが、その間の距離は考への中に入れていないので、著者の5つの型の中(4)と(5)のようなのは(1)の中に入れられることになる。とすると(1)型は71例となり5例との比率は83.5%で足立やCommitteeとはほぼ同じ割合である。後の7つの型に相当するものを著者は見なかったが、足立のDにCommitteeのF型や足立のE型はそれでもかなり高い割合（0.6%位）であるらしいが、後の5つは殆ど偶然ではなければ見られない程の稀なものであるらしい。従って問題となるのは(1), (2), (3)の型即ち足立やCommitteeのA, B, Cの3型である。

Table 4. Correlation between the beginning and entrance of vertebral artery.

Entrance height (Foramen transversarium)	Left vertebral artery from the left subclavian artery.			Right vertebral artery from the aortic arch.			Sum-totals			Right vertebral artery			Sum- totals (R+L)
	♂	♀	Total	♂	♀	Total	♂	♀	Total	♂	♀	Total	
IV	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
V	8	1	9	3	1	4	11	2	13	5	2	7	20
VI	67	36	103	0	0	0	67	36	103	71	36	107	210
VII	2	0	2	0	0	0	2	0	2	2	0	2	4
Total	77	37	114	4	1	5	81	38	119	79	38	117	236

Table 5. Combination and correlation of the beginning and entrance of both side vertebral arteries.

Entrance height (Foramen transversarium)		Beginning						
		Both sides from the subclavian artery			Dextra from the subclavian artery Sinistra from the aortic arch			
Dextra	Sinistra	Author	B. Adachi	R. Mori	Author	B. Adachi	R. Mori	
IV,	V	1(♂)						1
IV,	VI		5(♂3, ♀2)					
V,	IV				1(♂)			
V,	V	3(♂)				3(♂2, ♀1)		1
V,	IV	3(♂1, ♀2)	14(♂10, ♀4)	1				
V,	VI		1(♀)					
V&IV,	IV			1				
VI,	IV					2(♂)		
VI,	V	5(♂4, ♀1)	9(♂6, ♀3)	1	3(♂)	15(♂14, ♀1)		1
VI,	VI	96(♂62, ♀34)	436(♂344, ♀92)	50		4(♂3, ♀1)		1
VI,	VII	1(♂)	6(♂4, ♀2)			3(♂2, ♀1)		
VI,	VI	1(♂)	2(♂)					
VII,	VII	1(♂)		1				
Total		111(♂74, ♀37)	473(♂369, ♀104)	54	4(♂)	27(♂23, ♀4)		4

又森の胎児に於ける調査を見るに、森はその分類をA—Eの6型(C型はC及びC'となっているので)に分けてあるが、その中A, E, C型の3型は著者及び足立などと同様であるが他の3型は異っていて著者及び足立などにも記載されていない例である。C'型は著者ではA型に含めており(足立及びComitteeも同様ではないかと思う), D, E型と称するものは1, 2の外国人の報告例もある様であるが著者及び足立等は之をみていない。

III. 椎骨動脈の入口に就いて

ここでいう椎骨動脈の入口というのは、頸椎横突孔への入口のことで、これは第6頸椎の横突孔に入るのが大部分で、第5頸椎、第4頸椎

のそれに、又稀に第7頸椎のそれに入るものもある。

両側の椎骨動脈の起始と入口の明らかなもの♂で78屍体(156側), ♀で35屍体(70側), 起始と入口が両側共に明らかなものと限らず、片側だけでも明らかなものは、♂で左81側, 右79側 ♀では左右共に38側づつであった。(Table 4及び5はこの関係を示している) Table 4は左右のVertebralが何処に入るかを示しているが、これで明かなように、♂, ♀共に第6頸椎に入るのが大部分で、

♂: 左 $\frac{67}{81} = 82.7\% \pm 4.20\%$,

右 $\frac{71}{79} = 89.9\% \pm 3.45\%$

♀: 左 $\frac{36}{38} = 94.7\% \pm 3.63\%$,

右 $^{36}/_{38}=94.7\%\pm 3.63\%$

計：左 $^{103}/_{119}=86.5\%\pm 3.13\%$,

右 $^{107}/_{117}=91.5\%\pm 2.58\%$

を示し、やや女の方に正常のものが多い数字となっている。次いで第5頸椎に入るのがそう多くはないがみられ、

♂：左 $^{11}/_{81}=13.6\%\pm 3.81\%$,

右 $^5/_{79}=6.3\%\pm 2.73\%$

♀：左 $^2/_{38}=5.3\%\pm 3.63\%$,

右 $^2/_{38}=5.3\%\pm 3.63\%$

計：左 $^{13}/_{119}=10.9\%\pm 2.86\%$,

右 $^7/_{117}=6.0\%\pm 2.20\%$

で、♀ではこの2つの型以外はみられなかったが、♂では更にこの外に第7頸椎に入るものが、左 $^2/_{81}=2.5\%\pm 1.74\%$ 、右 $^2/_{79}=2.5\%\pm 1.76\%$ 、第4頸椎に入るものが、左 $^1/_{81}=1.2\%\pm 1.21\%$ 、右 $^1/_{79}=1.3\%\pm 1.27\%$ あった。

Table 5は左右の椎骨動脈の起りと入口との色々な組合せの表であって、両側共に鎖骨下動脈から出るものが両側の第6頸椎の横突孔に入るものが大部分で、

$^{96}/_{115}=83.5\%\pm 3.46\%$ 96体(♂62体, ♀34体)を示していることはこの型が正常型とされる理由であるが、面白いことは、右は鎖骨下動脈より出、左が大動脈弓より出ているもので、両側共第6頸椎横突孔に入るものは1例もないことである。これは左の椎骨動脈が大動脈弓より出ているものは皆異常な入口を示して(C_4 に入るのが1例、 C_5 が4例)いるからである。唯この場合、右側の入口がはっきりしないのが1例あるためこの型のもので両側もしくは1側が異常入口を示すのは、

$^4/_{115}=3.5\%\pm 1.27\%$ (何れも♂)となっているが、3例は左側は普通に第6に入っている。即ち左右共異常入口を示すものは唯1例だけである。

このことは両側が鎖骨下動脈より起っていて異常な入口を示すものが、

$^{15}/_{115}=13.0\%\pm 3.14\%$ 15体(♂12体, ♀3体)

(両側共5例、右側だけ4例、左側だけ5例)、右側だけについていへば、男女併せて $^{10}/_{117}$

$=8.5\%\pm 2.58\%$ で、異常入口を示すものは10%にも足りないことから見れば、左椎骨動脈が大動脈弓から出る異常が115例の中唯4例(全数115例中7例にこの異常が見られたが、右側の入口が分らぬものが3例もあるため、両側共分るものは4例だけ)しかないのに、その中1例に異常入口が見られたという事は *A. vertebrae sin.* が *Arcus aortae* から出るというような異常は左側にもかなりの影響を及ぼしているものと考えてよいのであらう。

男女、左右の別なく、椎骨動脈の入口を見るに、総数236側で第6頸椎に入るのが89%、第5頸椎に入るものが8.5%、第7頸椎に入るものが1.7%、第4頸椎に入るものが0.9%の順である。

左右別では左側で異常入口を示すのが少し多いが(左13.4%、右8.6%)、それは椎骨動脈が大動脈弓など異常な起りを見せるものが左側に多く、それは凡て異常入口をとるので、それを除くと左右差が殆んどなくなる。(左9.7%、右8.5%)

性別では女の方が少し異常入口を示す率が少ないようである。(♂13.8%、♀5.3%)

これを先人の研究に就いてみるに、足立の日本人での統計的な研究の外は、1例報告は割合にあるが、統計的なものは余り見当らず、外国にも少いと見えて、足立著の「日本人の血管」の椎骨動脈の所に *Bean Bezug* の仕事が引用されているだけである。

足立の結果とは非常によく似ていて両側共に鎖骨下動脈より起って第6頸椎に入るものが著者では $^{96}/_{111}=86\%$ 、足立では $^{436}/_{473}=92\%$ で、その間に6%差があるが有意差はない。この値は *Bean Bezug* に於いても殆ど同じで、左右併せて第6頸椎に入るのが著者で89%、*Bean Bezug* で91%である。*Bean Bezug* は入口を左、右と区別せずに見ているが(IV 1, V 4, VI 88, VII 4となっている)、唯異常入口だけに就いてみるに左で5%、右で4%著者の方が大きくなっているが、左右差では著者の右～左が3.6%、足立では2.8%で同じ様な値を示す。

又右の椎骨動脈は右鎖骨下動脈より起っているもので、左の椎骨動脈は鎖骨下動脈か又は大動脈弓の何れかより起っている場合に、如何なる入口を取るかを足立の調査と較べて見るに、第6頸椎に入るのは $89.0\% - 93.6\% = 4.6\%$ 著者に於いて低く、第5頸椎に入るのは $8.5\% - 4.5\% = 4.0\%$ 足立の方が低い。第7頸椎、第4頸椎に入る場合は殆ど同じである。

ここで足立は大動脈弓より起る左椎骨動脈の異常入口が左鎖骨下動脈より起るそれよりも大きな傾向をもつとしているが、著者では左椎骨動脈が大動脈弓より起始するときは全部異常入口を示すが、足立と著者では調査数に差があり、割合は大動脈弓より起る場合の方が大きいであらう。唯 Bean Bezug に於いては、第7頸椎に入るものが97例中4例で、その割合が4.1%という高い比率になっているが、(著者では1.9%、足立では1%) これは例数の少ないことに起因すると足立は言っており、著者も亦自分の調査よりして同様に感ずる。

結局左右併せて約90%の Vertebralis は第6頸椎横突孔に入り、而して残り約10%は異常入口を示すが、その中約9%は第5で、第7に入るのが約2%、第4に入るのが約1%あるという結果となる。

IV 椎骨動脈と総頸動脈との走行関係

この関係を調査するのがこの研究の主要な部分を成しているものであり、この関係が分れば目的の可成りな部分が達せられたことになるわけであるが、調査をつづけてみると、高橋のいうように、又これまでの教科書や局所解剖の図にある様に、総頸動脈と椎骨動脈とは甲状軟骨の下縁の高さで交叉するとか、又少くとも、前より見れば、交叉的になっているとは限らない、というよりは、そういうことは寧ろ稀であることを知った。

Fig. 4 はこの調査の基礎となった総計 124 体分のスケッチの 1 部であるが、この中 1 の No. 121, 66 才のものは、典型的な X 型に両動脈が交叉するもので、頗る教科書的であるが、前にも云った様にこの様なものは稀で、この型は

後にふれる分類の A 型の部に入るが、この A 型の中でも総数 50 例の中この様なものはこの 2 側だけである。

これに近いものは図の 2 にあげた No. 7 の 22 才の両側で、この場合は Carotis (以下 C とする) の外側より起り、C の後ろで入口にかくれる。いわばこれは入型又は人型で A とされた型は大部分この様なものである。

図の 3 は No. 43, 37 才のもので、2 と似ているが、左側が少し異なる。初めは両側とも外側より起ってから内上に進むが、これでは左側の Vertebralis (以下 V とする) は心持ち外に進んでから、ゆるく弧をえがいて内に進み、全体としていえば、真上に進んで。従って左外に上って来た C の後ろにかくれるようになるが大部分の経過は交叉的というよりは平行的である (A・B 型)。

図の 4 は No. 33, 65 才のもので、この平行的なものが最も典型的になっているもので、V と C は重なっていない (O・B 型)。

5 は No. 9, 21 才のもので、一寸見るとこの右側は 2 の右側に似ているようだが、V の大部分が C の後ろにかくれている。又左側の V は C と相接して進んでいる (Ci, B 型)。

6 は No. 31, 57 才のものの、V は両側とも大部分 C の後ろを進んでいる (Ci・Cii 型)。

7 は No. 44, 63 才のもので、両側とも V は長 S 型にくねっているが、これ又その経過の大部分又は全部が C の後ろにある (Cii 型)。

8 は No. 45, 59 才のもので、右の V は内上に真直ぐに進んでいるが、左は全体として真上に長 S 型に進んでいる。而も右では、V は全く C の内側にあるが、左では逆に外側である。(D・B 型)。

9 は No. 27, 93 才の早もので、右の V は内上に直ぐに進み、そこで折れて真上に走るか、

C の内側にあり、左は外上にはほぼまっすぐ、必持ち弧を描いて進むが C の後ろにある (D・Cii 型)。

10 は No. 128, 83 才の早もので、V, C も共にかなり強度に曲ったり、くねったりして

いる。老人性の変化を思はせる例である (B・C_{II}型)。

11はNo. 132, 45才♂のもので、VもCも多少の彎曲を来すが、共にかなり平行的に走る、ことに左はVが Arcus aortae から出ている側で、外上に走り、それより上にすぐにのびているが、外上に走るCとは次第にはなれようとしている (B・C_{II}型)。

これらの図から schema をつくつて見たのが、Fig. 5 のA, B, C_I, C_{II}, Dの5つである。勿論これはVとCとを前より見て (即ちfrontalの面に投射して) の位置関係の分類で、これには次の様な考慮が基になったのである。

先づ第1にCに対しVの位置が大部分外であるか、それとも内であるかにより3つに大別し、前2者を更に交叉的であるか、平行的であるかにより区別して、全部で5つの型に分けた：即ち。

A型：Vがその長さの長い、短いに関係なくCに対して交叉的に走るもの、交叉的とはいっても Fig. 4 の1のようにX型であることはごく稀で、多くは人型又は入型で、VがCの真後辺りで M. scalenus と longus colli の間に入ってしまうことが多い。しかし、ときにはハ型にVがCの後ろに入らないこともある。Vが曲ったり、くねったりしているときは、起りと入口の所とを結ぶ線を以てVの走行の方向とする方法を取ったが次のB型のばあいには走り方も又考への中に入れて判定した。

B型：VがCの外側にあって、ほぼ平行的に走るもの：VがCにはほぼ平行的に走ってその後ろにかくれない場合は勿論この中に入れるし、逆に先に行ってVとCがより離れるような場合即ち平行的ではなく、逆ハ型になる場合もこの中に入れる、が問題はVが少しCに平行的に走るが、結局Cの後ろに入って、入口に消えるような場合、A型との区別をどうするかとなると規準がなければ主観的にならざるを得なくなるので、こういう時にはVの長さ30mm以上はB型、29mm以下をA型とした。然しこれは便宜的で表中B又はAとしたのはこの長さの規準が大い

にものをいった。同様なことは次のCの場合にも当てはまる。

C型：VがCの後ろに大部分かくれているもの：これに2型を区別する。

C_I型：Vが短くて、その走行がCに対して交叉的なもの。

C_{II}型：Vが割に長くて、Cの走行と平行的と見なされるもの：長いと云ふ程でもないが、短くもなく、又全くCと平行的でなく、先の方が少しCよりはみ出している様な場合は長さ30mm以上か又はそれに至らぬかをC_{II}やC_Iやの判定の規準にしたことBとAの場合に同じ。然し短くとも起りと入口とを結ぶ線が全くCの走行に一致する場合は矢張りC_{II}、又Vが内より外に向け走る時も同様にC_{II}とした。

D型：Vが起りよりCの内側を走るもの：これにはCと交叉的 (逆ハ型に) か平行的かは問題にしない、起りがはっきりとCの内側で、先がCの後ろにかくれるようなものは見なかった。

定義や判定の規準は以上のようなのだが、さて実際にそれを如何にあてはめるかは伸仲問題で、具体的に Fig. 6 にいくつかの例をあげ、その判定の根拠を示せば、Fig. 6 の

1. はNo. 12, 24才♂, Vの長さ右32mm, 左43mm, これは右A, 左C_{II}の判定, 右は長さの規準ではBに入れてもよいようだが、明らかに交叉的なので、これをとってA, 左は入口がBの内側に出、Cの走行と交叉的ではあるが、長さが43mmといふ長さなのでC_{II}。

2. はNo. 28, 65才♀, 長さ右19mm, 左25mm D, C_Iの判定, 右は先づ問題ないが、左は1によく似ている。然し長さ25mmをとってC_I。

3. はNo. 42. 55才の♀, 長さ右79mm, 左37mm D, C_{II}の判定, 右はVがCよりは外から起るので、A型とも見られようが、大部分がCの内側故D, 左はVの全長にわたってCの後ろといつてよく、ことに内より外に走るのもC_{II}。

4. はNo. 54, 24才♀, 判定はC_I, A, 右は問題ないが、左はVがCの後ろに来なければ、全体として交叉的なのでA。

5. はNo. 55, 44才♂, 判定はC_I, C_{II}. 右の走

Table 6. List of various types in relation between arteria vertebralis and carotis communis.

Types		Male Specimen No.	Female Specimen No.		Male Specimen No.		Female Specimen No.	
right side	left side		right side	left side	right side	left side	right side	left side
A	A	No. 1	A	A	No. 5		B	D
A	A	3	A	C _I	10			
A	A	7	A	D	39			
A	C _{II}	8	A	/	67			
A	C _{II}	11	A	C _{II}	113			
A	C _{II}	12	A	A	120			
A	C _{II}	29	A	A	122			
A	D	43	A	A	123			
A	B	49	A	A	126			
A	C _{II}	56	A	C _I	128			
A	B	57	A	C _I				
A	A	62	A					
A	B	69	A					
A	C _I	71	A					
A	C _I	79	A					
A	B	112	A					
A	A	118	A					
A	C _I	121	A					
A	A	124	A					
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1			
D		1	D		1			
Total		19	Total		10	Total		3
Left side			Left side			Left side		
A		6	A		4			
B		5	B		0			
C _I		2	C _I		3			
C _{II}		5	C _{II}		1</			

行はほぼCに一致するとも見られるが、長さが28mmなのでC_I, 30mm以上ならばC_{II}とする所、左はAortaより出て上行し、91mmの長さを持つのでC_{II}, 最後はCより内側にあるであろうから。

6. はNo. 58, 77才♂, 右18mm, 左28mm, 判定はC_I, C_{II}, 右は長さも短いし、交叉的なのでC_I, 左は長さは30mmに足りないが、ほぼCと平行的だし、内より外に走るのでC_{II}。

7. はNo. 60, 40才♂, 右32mm, 左30mm, C_{II}, C_{II}の判定, 両側共長さが規準以上だし、ことに左側では曲っているが全体として、内より上外に走るのので、共にC_{II}。

8. はNo. 67, 早で年令不明, A, 0の判定, これは長さが25mmなのでA, 30mm以上あればBとする所?

9. はNo. 73, 年令不明の早, 判定はD・B, 以上述べ来った所より判定が妥当なことが分らう。長さは右41mm, 左42mm。

10. はNo. 73. 年令不明の♂, D・Bの判定, 右のDは問題ないが、左のBは走向が内より上外に走るが故。

11. はNo. 77. 60才早, 判定はD, C_{II}. Cは両側共に強く曲りくねって、Vも左は強く折れ曲っている。右はVが大部分Cの内にある故D。左もやはり大部分内側にあることはあるが、これはCがつよく折れ曲っている為で、Cを伸して考へればVはCの後ろに来、而してこれも曲っているVを伸して考へれば、大体Cと平行的となるのでC_{II}。

12. はNo. 85. 28才早, Vは両側共に強くくね

つている。判定のD・Bは右はVがCの内側にあるためだし、左はVの出口と入口を結ぶ線がCの走向と大体一致すると思はれるし、それにVの走向自体が少し上外に向く故である。

以上述べた定義と規準に基づき、判定例で示したような態度で個個のものに就き判定したのがTable 2のVのTypeの欄で、それをListにしたのがTable 6, 統計的にまとめたのが、Table 7である。スケッチは、前述のように、120体分あるのだが、Cが両側とも欠けているのが8体あるので、Listや統計に上ったものは♂77体, 早35体の計112体分だけである。

先づTable 7を見るに、O欄は反対側には何等かの型のものが写されてあるが、その側はないか又は不十分で型の判定が出来ないものを示す。これらを除くと♂で77体の中、右側73左側75, 早で35体の内、右側は35側, 左側は34側だけの調査の対照となるものがあることになる。この表を見て目につくことは、男も女も共に右左で型の分布にかなりはっきりした差があることである。唯早のAとC_Iではこの差が割に少く、右: 左が夫々10: 9, 9: 7となっているにすぎないが、同じ型でも♂では夫々19: 14, 14: 7と夫々約1.5倍, 2倍右が左に比べて多い。この傾向はD型に於いてことにはっきりしていて、♂で28: 7, 早で14: 5と夫々4倍, 約3倍の差を示す。

この反対がBとC_{II}で右: 左は♂で夫々3: 24, 9: 25, 早で1: 6, 1: 7と8倍, 約3倍と左側が多く、早ではそれが夫々6倍, 7倍になってくる。これらの事は明らかにVのCに対する態

Table 7. Statisticus of vertebralis types.

	Types	A	B	C _I	C _{II}	D	Total	0
Male	Right	19 (26.03)	3 (4.11)	14 (19.18)	9 (12.33)	28 (38.36)	73 (100.01)	4
	Left	12 (16.00)	24 (32.00)	7 (9.33)	25 (33.33)	7 (9.33)	75 (99.99)	2
	Total	31 (42.03)	27 (36.00)	21 (28.51)	34 (45.66)	35 (47.69)	148 (200.00)	6
Female	Right	10 (26.85)	1 (3.70)	9 (21.03)	1 (9.26)	14 (38.89)	35 (100.00)	0
	Left	9 (19.26)	6 (27.53)	7 (12.84)	7 (29.36)	5 (11.01)	34 (100.00)	1
	Total	19 (36.11)	7 (13.23)	16 (23.87)	8 (14.62)	19 (35.90)	69 (100.00)	1
Both sex	Right	29 (26.85)	4 (3.70)	23 (21.03)	10 (9.26)	42 (38.89)	108 (100.00)	4
	Left	21 (19.26)	30 (27.53)	14 (12.84)	32 (29.36)	12 (11.01)	109 (100.00)	3
	Total	50 (23.04)	34 (15.67)	37 (17.05)	42 (19.35)	54 (24.88)	217 (99.99)	7

Table 8. Frequency of various combination of vertebralis types.

R	L	Male	Female	Total	R	L	Male	Female	Total	Sum-totals
A	B	5	0	5	B	A	0	0	0	5
A	C _I	2	3	5	C _I	A	2	3	5	10
A	C _{II}	5	1	6	C _{II}	A	1	0	1	7
A	D	1	1	2	D	A	3	2	5	7
B	C _I	0	0	0	C _I	B	3	3	6	6
B	D _I	1	0	1	C _{II}	B	1	0	1	2
B	D	0	1	1	D	B	10	3	13	14
C _I	C _{II}	4	1	5	C _{II}	C _I	0	0	0	5
C _I	D	1	1	2	D	C _I	3	3	6	8
C _{II}	D	0	0	0	D	C _{II}	7	4	11	11
Total		19	8	27			30	18	48	75

度が右側と左側で異っていることを示すものといつてよく、差のはっきりしないA型だとてゝで、差は1.6倍弱であり、早でもA, C_I共に少ないながらも右が左に勝っている。

このAもC_Iもどちらかと云へば、Vが割に短いもので且つCに対して交叉的であり、B, C_Iは割に長く、Cに対して平行的である。而して差の最もはげしいDはVがCの内側にあるものである。このことは先づ第1にVと、Cの出方が右と左で根本的にちがうことから来ているためと考えられる。周知のように通例Cは右に於いては *Truncus brachiocephalicus* から別れ、左では直接 *Arcus aortae* より出ているから、どうも右は左に比べて顔の中心よりより外で起り、その走行のかなりな部分を左に比べて割に外を走ることになる。Dが右に於いて左よりも3—4倍も多い理由をなすと考へられる。又A, C_Iが右に多く、B, C_{II}が左に多い理由の1つはVの長さが右と左で異なることにもある。Table 11に示すように、Vの長さは右で25.2mm, 左で33.6mm平均を示し、33mm以上のものが左では $47/120=39\%$ もあるのに右では $19/118=16\%$ しかないことから分ると思う。Cが右に於いて左に於けるより外側を走る。というよりは左側が右側に比べてより内側を走る傾向が右に於いてD型が圧倒的に多い(♂で $28/73=38\%$, 早で $14/35=40\%$) 原因をなしたと同様に、Vが左側に於いて右側に於けるよりもより内側から起る傾向(総数的120例の中 *Arcus aortae* よ

り起ったものが7例あった外 *Subclavia* の根元に近くより起っていたものが7例もあったことはこの傾向をはっきりと物語るものである)がVをして左側に於いて右側に於けるよりも、内上でなく真上から外上の方に走らせる傾きを来らせ、引いてその長さを伸ばしCに対してより平行的ならしめる原因をなす。この様に右と左でVのCに対する態度がことなることは、左右異動であるのが当たり前で、同型は寧ろ例外的であると考へるべきで、事実 Table 6に示す様に、左右同型のものは、A型10(♂6, ♀4), B型2(♂のみ), C_I型3(♂2, ♀1), C_{II}型8(♂7, ♀1), D型7(♂5, ♀2), 計30(♂22, ♀8)で $30/105=27.6\%$, $1/3$ にも達しない理由をなす。割に左右同型の多いのはC_{II}型で、総計42例の中7体14例。即ち33.3%, $1/3$ である。これはC_{II}型がA, B型とD型の中間の位置を占めていることと相応する。

異型の組合せでどういふものがどれ程かを見るに Table 8に示す様に、とくに多いといふ程の組合せはないが、DB, DC_{II}という組合せが割に多く、13組(BDを入れると14組)と11組、次いでAC_IとC_IAの合計の10組、最も少ないのがBC_{II}とC_{II}Bの組合せで夫々1組(尤もBA, BC_I, C_{II}C_I, C_{II}D等は夫々0だが、その反対の組合せを等しいと考へれば、それ等は夫々5, 6, 5, 11組あることになる), その外の組合せは何れも同程度であるが、このDB, DC_{II}の組合せはDの頻度を考へると仲々高率で

あることが分る。(Table 6, 7参照)。

次に各型の頻度を考へるに、Table 7に示すように、右側では男女共にD, A, Ci, Cii, Bの順であり、左側では♂でCii, B, A, Ci, Dの順で♀ではA, Cii, Ci, B, Dと順序が少しちがってくるが、合計するとCii, B, A, Ci, Dと♂に於ける順序と同じになる(♀の総数が少ないので、♀の例数を♂並に引上げて平均してみるても同じ結果になる)。右側で最も多かったDが左側では最も少く、右で少い方のCiiとBが左では最高とその次に位する頻度を示す。ことに右側に於けるDは約4割の存在を示し、次位のAを10%も引はなし、3位のCiの倍もある。之に対して左のCiiは♂に於いては $\frac{1}{3}$ 、全体としても約3割、次位のBも少しそれに劣る高率の存在を示し、3位のAを10%程引はなす。然し最低のCi, Dも夫々約10%程あるに対して、右側では最低のBは4%に足りず殆んど無きに等しい程なのと妙な対照を示している。

これを別な見方をすれば、即ちAとBを1つのGroup, CiiとCiを1つのGroup, そしてDはそれで1つと見れば、即ちVがCより外にあるか、後ろにあるか、内にあるかに従って見れば右側にあつては内側が約40%, 外と後ろが夫々30%であるのに対し、左側では外側にある率が最も多く47%程、次が後ろの42%程で、内側にあることは10%程でしかなく、このVがCに対して内、後ろ、外の3つのGroupに分けて考へるといふ点からすれば、Table 6, 8は次の様に書き改めなければならない。

右	左	♂	♀	計
外	外	13	4	17
外	後	8	4	12
外	内	1	2	3
後	外	7	6	13
後	後	13	3	16
後	内	1	1	2
内	外	13	5	18
内	後	10	7	17
内	内	5	2	7
計		71	34	105

こういふ見方からしても尚且つ左右同型なのは105例中40例で4割に満たず、60%強は左右異型である。

これらの結果から、高橋のいう様にCの外下にVを求めようとしても成功する率は右で40%, 左で約半分ということになる。事実本人に確めた所によれば、著書には容易に注射に成功する様に書いてはあるが、術式通りにやっても、一度で成功するなどということは殆どなく、針の方向を内に向けたり、外に向けたり、時には全く引抜いて別な点を探したりして、成功するのだという。経験がものをいうわけで、頸の所でCarotisを道しるべとしてVertebralisに経皮的に注射することは仲々むづかしいことが分る

V. 椎骨動脈の走行方向：

A. vertebralis が A. subclavia 又は Arcus aortae から分れてから如何なる方向に進むかの正確な記述は割に少い。教科書等にも図があるだけで、記載は少い。然し、常識的に漠然と内上後ろに進むように思っているが、これが案外そうではなく、真上や外の方に(と云っても勿論上後ろの方向はとるが、frontalの面に投射して考へれば、この後ろの方向は観察の中に入ってくる)進むものがあることは前節でも述べた。それでこれらの3つの方向、内上、上、外上へと進むもの(M, P, Lと記す)がどれ位の割合かを見たものがTable 9である。

表の上の段は左右に於けるこれらの組合せによる頻度であり、下の段はそれを離れて、唯右と左による3つの方向をとるものの頻度を示した。

この表の下の部分で分るように、右側では流石に下外より上内に進むものが男も女も共に多く、約70%を示して圧倒的であり、反対に下内より上外に走るものは3%に満たず、殆んど例外的であるが、下より上へと進むものは30%近くを示している。これに対して左側では上内側に進むものが最も少い(といつても20%程で、右側に於ける最少の上外といふ方向のもののように例外的といつてよい程少いのとは異なる)、最も多いのは真上(といつてもほんとうは上、

Table 9. Direction of the course of vertebral artery.

	MM	MP	ML	PM	PP	PL	LM	LP	LL	OM	OP	OL	Total
Male	11	29	12	2	11	8	0	1	1	2	2	1	80
Female	11	9	8	0	6	4	0	1	0	0	1	0	40
Total	22	38	20	2	17	12	0	2	1	2	3	1	120

	M		P		L		Total	
	r	l	r	l	r	l	r	l
Male	52 69.33	15 18.75	21 28.00	43 53.75	2 2.67	22 27.50	75 100.00	80 100.00
Female	28 71.79	11 27.50	10 25.04	17 42.50	1 2.56	12 30.00	39 99.99	40 100.00
Total	80 70.18	26 21.67	31 27.19	60 50.00	3 2.63	34 28.33	114 100.00	120 100.00

後ろだが)に進むもので約50%, 上外に進むものが中間で30%程という結果で, 正常型と漠然と思っていたものが最も少い型だという実に案外な結果に直面した。このことは前の節(節IV)で述べたように, 右と左で Vertebralis の Carotis に対する態度が異なることと共に重要な相違である。Vertebralis は右と左とははっきりと異った経過, 態度を示すので, 左右の Vertebralis を対照的に考へてはいけないことを語るものである。

この左右の相違は上段の型の組合せの頻度にもはっきり反映している。両側共所謂正常型なる MM (共に内上方に向ふもの) は男女共に 11 例, 女では左側の M 型なるは全部右側も M 型の走行を示したし, 男でも左側の M 型 15 例中唯 2 例が右の P 型と組合っているだけ (2 例は右側の記載不十分で, 判定不能) である。つまり左側が M 型であるときは右側も M 型であることが非常に多い ($22/24=91.7\%$) ことを示している。然るに右側の M 型は左側の P 型や L 型とも組合さってくる。即ち右側の M 型は左側の M 型と組

んだ残りの余力を全部ほとんど平等に左側の P と L とに割いている (男女併せて P の 63%, L の 59% と組合う)。所が左側のいわば正常型である P 型は左側の M に取られた後の力の殆ど全部を右側の P との組合せに割いてしまい, 尚残った右側の P は左側の L と組合さるという形となる。これは 1 つは右側に L 型が少いためかも知れぬ。

例外的ともいえる程少い右側の L 型は左側の M 型とは組合わず, P と L とにはほぼ平等に組合っている。

このような Vertebralis の走り方の左右に於ける相違は或は年令的に動脈の長さの増大などに伴う位置の変化に基づくかも知れぬと思い, 型と年令との関係を見たのが Table 10 であるが, 左右両側共, M 型のものが平均年令が最も高く, P が最も低いという結果になった。この結果から見れば, 走り方の型と年令とは無関係だということになる。というのは若し関係ありとすれば, そして若し Vertebralis が年と共に延びるとか又は Subclavia も共に延びるとかい

Table 10. Correlation between course type and age.

Side	Type	Age→20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	?	Average
R	M	9	3	4	13	19	24	3	1	4	62
R	P	2	5	3	7	6	4	1	0	3	51
R	L	0	0	1	1	0	0	0	0	1	44
L	M	1	0	0	5	7	9	1	0	3	66
L	P	8	5	6	12	14	9	2	1	3	57
L	L	2	3	2	4	17	11	1	1	3	64

うことのために *Vertebral* の位置が移って、走り方の型が変わるのであれば、この年令の平均値と型との関係は M, P, L の順に低いとか又は反対に高いかの何れかでなければならぬからである。 *Vertebra* が単独にのびれば、その *Subclavia* よりの分岐部は下内の方に押され、従って型は M より P, P より L に移るだらうし *Verteralis* も *Subclavia* も共に延びれば、それは上外に押されて、L は P に、P は M にと変化するだらうから。

VI. 椎骨動脈の長さに就いて

ここにいう椎骨動脈の長さというのは動脈が

A. *subclavia* 又は *Arcus aortae* から分れ起

る所からそれが頸椎の横突起孔に入るために、*M. longus colli* や *capitis*, *scalenus anterior* 等の間で、その後ろに隠れるまでの直線距離のことであって、その間に動脈が折れたり、曲ったり、ねぢれたりするために管そのものの長さは長くなっているも、その長さ自体を忠実に表わしているものではなく、長さは血管の外側の線に於いて、その起りより入口までを計った。用具は「スベリザシ, Gleitzirkel, sliding caliper,」単位は mm で読んだが、集計の場合は 2 捨 3 入式に 5 mm 単位 of 階級に分った。個々の実際の値は Table 2, Length の欄に記入されている。

両側のあるものは 115 体、左側だけは 120 側

Table 11. Distribution of length of vertebral artery.

Length	Left		Total	Right		Total
	Male	Female		Male	Female	
5	0	0	0	1	0	1
10	1	2	3	2	0	2
15	3	5	8	8	15	23
20	6	10	16	21	10	31
25	9	10	19	14	8	22
30	24	4	28	18	2	20
35	18	1	19	6	2	8
40	5	1	6	1	2	3
45	7	0	7	4	0	4
50	1	2	3	1*	0	1
55	1*	0	1	1	0	1
60	2	0	2	0	0	0
65	0	0	0	1	0	1
70	0	0	0	0	0	0
75	1*	0	1	0	0	0
80	2*	1	3	1*	0	1
85	0	0	0	0	0	0
90	1*	1*	2	0	0	0
95	1*	0	1	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0
110	1*	0	1	0	0	0
Total	83	37	120	79	39	118
Average (mm)	36.4	27.3	33.6	27.0	21.4	25.2

Note,

× = from between A. c. c. and A. *subclavia sinistra*.

• = almost from the *Arcus aortae*.

Table 12. Correlation between length and abnormal entrance of the vertebral artery.

Length Entrance		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95.....110	Total
C ₅	L	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	2*	0	2	0	11
	R	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C ₄ & C ₇	L	C ₇	C ₇	0	0	C ₇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C ₄	4
	R	0	C ₇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C ₄	0	0	0	2

Length Entrance		45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95.....110	Total
C ₄	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1•	1
	R	0	0	0	0	0	0	0	1△	0	0	0	1
C ₅	L	3	0	0	1	0	0	1•	2•	0	2•	0	1• 10
	R	2	1•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C ₆	L	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
	R	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
C ₇	L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unknown		R	0	0	0	0	0	0	L•	0	0	0	2

Note,

×=perhaps three cases.

• =branches from the aortic arch or closed to it

△=from the corner between subclavia and carotis.

右側だけは 118 例，最も短いものは合で左が 9 mm (No. 50)，右で 5 mm (No. 119)，早では左 9 mm (No. 105)，右 13 mm (No. 37)，最も長いものは合で左 110 mm (No. 66)，右 79 mm (No. 42)，早では左 90 mm (No. 68)，右 42 mm (No. 131) であった。

長さの最も短いものの入口を見ると，合では左は記録不十分で不明だが (No. 50)，右側は C₆ (No. 119)，早では左，右共に C₆ (No. 105, 37) で何れも通常の入口を示しているから，多分合の左側の最短の No. 50 も C₆ に入るのであろう。

最も長いものの入口は合では左 C₆ (No. 66) 右も C₆ (No. 42) で，早でも左側は矢張り C₆ (No. 68) であるが右側は記載不十分で不明である (No. 131)。

長さの分布を示すものは 5 mm 階級で Table 11 に，異常入口と長さとの関係を Table 12 に示

した。Table 12 の下の段は 45 mm 以上の長さのものとその入口との関係で，併せて起りが，Arcus aortae 又はそれにごく近い所より出ているものを示した。

左側 120 例，右側 118 例，両側揃って記録されているもの 115 例の結果を集計した Table 11 が示すように，明らかに左は右よりも長く，その差は合で約 9 mm，早で約 6 mm に及ぶ。而して男と女の差も左で約 6 mm，右で約 5 mm である。男と女の差が一寸ありすぎるように思われるが，最大頻度の階級が左合では 30 mm 階級 (24 例)，次いで 35 mm 階級 (18 例) なのに，早では 20 mm 階級と 25 mm 階級 (何れも 10 例づつ) であり，右では合で 20 mm 階級 (21 例) 次いで 30 mm 階級 (18 例) と広いのに，早では 15 mm 階級 (15 例) 次いで 20 mm 階級 (10 例) と，1—2 階級づれていることから矢張り相

当大きな性による差が確実にあるのであらう。

Table 12 の上の段と Table 11 とを照し合せて見ると長さ75mm以上のもは皆異常入口を示すものか又は多分そうであろうもの（起りが Arcus aortae より出ているのが80mm階級の所に3例あり、中1例は記載不十分だけれど Arcus より起るものは異常入口を取る傾向がつよいから、これも多分C₅に入る）であるから、それらを除くとC₆入口のもで最も長いものは右63mm (No.75), 左59mm (No.76) である。そして最も短いものは何れもC₆の入口を示すもので右5mm, 左9mm であることは前述の如くであるから、A. vertebralis の長さの個人差は相当大きいものがあるといはねばならぬ。

前述のように75mm以上の長さのものはすべて異常入口のものか、異常な起りのもの（従っ

て多分異常入口）であるが、異常入口のもの必ずしも長いとは限らず(C₇に入るものを除く)最も短いものは左側37mm (No.42, ♂), 右側35mm (No.7, ♂), 34mm (No.35, ♀) というように平均値に近いものもある。

Table 12の下段は45mm以上の長さのものとその入口に、及び分岐部の様子を示したもののだが、50mm階級より上ではC₆に入るものは左側4例、右側2例で他の10例は何れも入口がC₅又はC₄となっている。面白いことは、C₇に入るもの必ずしも短くはなく、右1, 左側3例に就いて見るに夫々28mm (No.81, ♂右), 24mm, 30mm, 45mm (No.67, ♀左, No.81, ♂左, NO.93, ♂左) で、平均より低いものは左24mm, と30mmだけで、後は何れも少し平均値より大きいことである。

Table 13.

Number	Sex	Side	Length	Entrance	Length to the C ₆	Modified value	Modification from the abnormal branching	Difference from another side
7	Male	L	60	C ₅	-18	42		+21
7	Male	R	35	C ₅	-14	21		-21
8	Male	L	47	C ₅	-19	28		+3
• 11	Male	L	77	C ₅	-17	30	-30	+11
15	Male	R	46	C ₅	-16	30		-16
35	Female	R	34	C ₅	-17	17		-3
42	Male	L	37	C ₅	-12	25		-17
42	Male	R	79	C ₄	-37	42		+17
• 49	Male	L	78	C ₅	-15	27	-36	+14
• 55	Male	L	91	C ₅	-22	32	-37	+4
66	Male	L	110	C ₅	-15	54	-41	+17
67	Female	L	24	C ₇	+10	34		+9
• 68	Female	L	90	C ₅	-13	48	-29	/
81	Male	L	30	C ₇	+14	44		+4
81	Male	R	28	C ₇	+12	46		-4
87	Male	L	43	C ₅	-11	32		+10
87	Male	R	45	C ₅	-23	22		-10
90	Male	L	45	C ₅	-5	40		-3
93	Male	L	45	C ₇	+15	60		+32
• 94	Male	L	95	C ₄	-25	46	-24	+13
94	Male	R	48	C ₅	-15	33		-13
107	Female	L	78	C ₅	-11	27	-40	+10
• 132	Male	L	78					

(Modification impossible)

Table 16. Correlation between the type and length of the vertebral artery.

Side	Length		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	Total	Mean
	Sex	Type															
L	♂	A, B			1	2		8	3	3	1					18	$\frac{551}{18}=30.00$
		C			1	1	5	8	4	0	3		1	1		24	$\frac{791}{24}=33.00$
		D			2	2	4	6	6	2	1	1		1		25	$\frac{795}{25}=32.00$
	♀	A, B		1	3	1	4	0	1							10	$\frac{210}{10}=21.00$
		C			2	2	3	1				1				9	$\frac{259}{9}=29.00$
		D		1		5	4	1		1		1				13	$\frac{329}{13}=25.00$
	♂	A, B	1	2	3	12	6	5	2							31	$\frac{658}{31}=21.00$
		C			4	6	4	9	3	1	2				1	30	$\frac{810}{30}=27.00$
		D			2	2	2	2					1			9	$\frac{214}{9}=24.00$
R	♀	A, B			7	3	3			1						14	$\frac{205}{14}=21.00$
		C			3	4	2	1		1						11	$\frac{240}{11}=22.00$
		D			2	0	1	1								4	$\frac{86}{4}=21.50$

Table 17. Distribution of the thickness of the vertebral artery.

Side	Thickness		2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	Total	Mean
	Parts	Sex															
L	Beginning	♂			5	6	26	10	23	2	6	2	1	0	1	82	4.6
		♀			3	8	9	5	7	1	2	1	0	1	0	37	4.4
		Total			8	14	35	15	30	3	8	3	1	1	1	119	4.5
	Entrance	♂	1	2	8	11	30	9	14	1	3		1			80	4.2
		♀	0	0	9	8	13	1	3	0	3		0			37	3.9
		Total	1	2	17	19	43	10	17	1	6		1			117	4.1
	Beginning	♂		0	12	8	21	9	13	4	9	1	2			79	4.4
		♀		2	5	2	9	3	9	3	2	0	1	1		37	4.4
		Total		2	17	10	30	12	22	7	11	1	3	1		116	4.4
R	Entrance	♂	2	1	22	9	26	3	8	2	1	1	1			76	3.8
		♀	1	1	10	0	14	0	8	0	1		1			36	4.0
		Total	3	2	32	9	40	3	16	2	2	1	1			112	3.9

左一右の全体の平均は5.5mmで、左がそれだけ右より長くなっている。このことは頻度分布で+5が最も多く、次いで+2, +6, +7, +3という所が多いのと相応している。

以上のことから大凡 A. vertebalis はC₆の横突起の下、♂右で15—35mm。左で20—45mm、♀では右で15—25mm、左で15—30mmの間に

あると見てよく、Vの結果からいうと右の約半数は Carotis より外下に、残りの $\frac{3}{4}$ はほぼ Carotis の後ろであり、又左では約40%が Carotis より内にあり、残りの中約35%は Carotis の後ろで、Carotisより外下にあるのは約25%だけであるが、これらの3つの型と長さとの関係を示したものが、Table 16で、各型の間には

Table 18. Side difference (left-right) of the thickness of the vertebral artery.

	-4.0	-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	±0	+0.5	+1.0	+1.5	+2.0	+2.5	+3.0	+3.5	Total	Mean
Beginnig	0	2	3	1	6	8	14	10	24	10	16	5	9	2	3	1	114	0.02
Entrance	1	1	1	1	2	5	13	6	32	12	21	7	7	0	1	1	111	0.16
	L > R			L = R			L < R											
Origin	46(40.4 ±4.60)			24(21.1 ±3.82)			44(38.6 ±4.56)											
Entrance	49(44.1 ±4.71)			32(28.8 ±4.30)			30(27.1 ±4.22)											

少しの差がありC型が平均して最も長く、次いでD型、A、B型は最も短いことが知られる。

VII. 椎骨動脈の太さに就いて

この動脈の太さはそれが A. subclavia 又は Aorta より起る所とそれが頸椎横突孔に入るために M. longus colli 等の後ろに隠れようとするその入口の所と Atlas の所で、横突起孔から出た所と膜を貫いて頭蓋孔に入ろうとする所の4ヶ所で計ってあるが、この後2者に就いては後に再び Atlas の所で触れることにし、ここでは専ら前2者に就いて述べる。計測は全てmm単位で、その0.5まで区別した。

左右両側の性及び場所による太きの分布は、Table 17 に示してあるが、左側は起りで最小3.0mm、最大8.0mm、入口部で最小2.0mm、最大7.0mm、右側では起りで最小2.0mm、最大7.5mm、入口部で2.0mmと7.5mmである。

数字の上では性による差があるようにも見えるが、はっきりしない、というよりはないと見た方がよい様である。然し僅かではあるが左と右による差はあるようである。平均値では、Table 17によるも Table 18によるも確差は出てこないが、左>右の方が僅であるが左<右より数が多いし、先人の業績でもそういう結果が出ている。例へば足立はその著書の中で己の結果を挙げているが、それによると、左>右、左=右、左<右は夫々60, 28, 26例で、全数 114例の夫々52, 6%, 24, 6%, 22, 8%を占めるとし又47例の OKAYAMA の観察を引用し、そして夫々20, 21, 8例としている。両者を合せると80, 48, 34例で%は夫々48, 1, 30, 1, 20, 8となる。これが著者の場合では、起りの所では夫々46, 24, 44例: 40, 4%, 21, 1%, 38.6%, 入

口の所では49, 32, 30例で44.1%, 28.8%, 27.1%と%は少し異なるが、傾向としては大体同様なものを示している。

又足立によると Kubo 及び Matsui は28人の日本人で左>右=17, 左<右=7例であったといい、Barkow のヨーロッパ人では50屍体で左>右=15例, 左<右=11例であったといっている。これによるとヨーロッパ人で或は左右の差はないのかも知れぬ。

然しここに一寸面白いことは、大体左>右の方が左<右より又左=右よりも多いのに、A. vertebralis が左では Aorta から、右では Subclavia から出ている場合にはこの関係が逆になることである。即ち著者の例でもこの様なのを出口の所で計っているのが7例、入口の所で計っているのが6例あるが、その結果は次のようである。

右一左の差、

出口の所, 1.5, 1.0, 2, 0, 2, 3, 0,
平均1.4mm

入口の所, ×, 0, 2, 0, 1.5, 3, 0,
平均1.3mm

だけ右の方が左より太いということになる。

僅に7例と6例ではあるが、左<右が5及び4例といふ大きな差であるから、この差は確差としてよろしい。足立は京都の材料で同様のものを17例報告しているが、それによると左>右左=右、左<右は夫々1, 3, 13で圧倒的に右の方が大きいものが多い。

左側が異常な起りを持つ場合は右の方が太いことが多いとしても、全体として左側は右側より太いことが多いのは確かといえるが、しかしその差は僅で、殆んどないといってもよく、性差も余りはっきりしないが、出口よりも入口の方が少し細くなってくる様である。それは平均値の差を見れば分るのであって、左も右も共に起りの方が太く、その差は左で0.4mm、右で0.5mm といふ値になっている。これは一寸

Table 19. Difference between thickness in origin and entrance of the vertebral artery.
(Beginning-Entrance)

	-1.0	-0.5	±0	+0.5	+1.0	+1.5	+2.0	+2.5	+3.0	Total	Mean
L	2	4	48	23	27	7	3	0	2	116	+0.5
R	0	0	52	17	28	9	3	0	2	111	+0.5

不思議なことである。というのはこの間に於いて椎骨動脈は何等枝別れすることなく、従って中を通す血液の量に変化はない（少くも目立っ程の）筈なのに太さが先にゆくに従い減ってゆくことは妙である。然し Table 19を見ると先にゆくのと反って之よりも太くなっているのも僅かであるがある。起り—入口の太さで、-0.5が4例(No. 27, No. 40, No. 87, No. 101何れも否)、-1.0が2例(No. 34, No. 48何れも否)で何れも左側であった。然し又その反対に2 mm, 3 mmと入口の方が細いのも左右両側とも夫々3例, 2例とあった。然し差のないのが約40—45%もあり, 0.5mmだけ入口で細いのが左20%, 右15%両者を合せると殆んど差のないのが左右共61—62%である。計算では左+0.5mm弱, 右0.5mm強起りの所が太いことになってTable 17の結果と少しこととなるが, これは数字の上の差にすぎない。

ここで Table 17に帰って, 太さそれ自体を眺めてみると, 平均値で起りの所が約4.5mm, 入口の所が約4.0mm, 3.0mm—5.0mmのものが大部分で, 起りの所で右⁹¹/₁₁₆=78%, 左¹⁰²/₁₁₉=86%, 入口で右¹⁰⁰/₁₁₂=89%, 左¹⁰⁷/₁₁₇=91%, 3 mmに足りないのは起りの所で右2例, 左0, 入口で右5例, 左3例といふ例外的な少さ, 5 mmより大きいものは起りの所で右²³/₁₁₆=20% 左¹⁷/₁₁₉=14%, 入口で右⁷/₁₁₆=6%, 左⁸/₁₁₉=7%であるから, 例外的な少数例を除き, 動脈が細い為に薬剤の注入が出来ないといふことは先づないと見て良いであらう。唯3.0mmに足りない血管では, 皮膚の上からのまさぐりでは或は注入が出来ないかも知れぬけれども。

VIII. 椎骨動脈, 総頸動脈及び鎖骨下動脈の異常屈曲に就いて

Fig. 4, Fig. 5は割にありふれた例を示してあ

るのだが, それでも動脈がうねっていたり, 曲りくねったりしているのがしられるように (Fig. 4の10, Fig. 5の11など), Vertebralis も Carotis も, そして Subclavia さえも, 波打ったり, うねったり, ねぢれたり, 曲り, 折れ, くねり, 巻いているのが仲々多い。Table 20には図のある総数 121 体の評価の一覧表を示してあるが。V・C・Sの略語は夫々 Vertebralis, Carotis, Subclavia を示し, Nは普通のもの, Cは弓形に曲っているもの, Wは波打ち, くねっているもの, それらの小文字の c や w はその程度の僅なもの, Tは曲り, 巻き, ねぢれているものである。異常の程度はNよりc, w, C, W, Tの順にひどくなるものと思われる。尤もcとwは性質がちがふから, c→Cにはなっても, c→w→C になるものではないと思われるし, w→W にはなるかもしれないが, c→C→T又はc→C→Wとなるものかどうかは分らない。

今これらの評価を如何して行ったかを知らせるために Fig. 6の例によって説明しよう。

Fig. 6の1はNo. 4の50才のもので, 左右のV, C, Sが何れもNとされたものである。

同様なものはFig. 4の1—6, Fig. 5の1, 2, 4及び5もそれであるが, NとはVに就いては起りより入口まで真直なもの(左右, 上下に就いてで前後については分らない)であり, Cに就いては少し外下に弓形に彎曲している程度で大体真直ぐなもの, Sに就いては下に大きく弓を描いて, なめらかに外に向うものである。つまりこれらを正常な状態と見たわけである。図の3の右のCも少し波打つようだがこれ位はNと見た。

Cは弓形に曲るものだが, CやSはもともと多少のCurveを描くのが正常であるから, その度が正常より強いものをCとしたわけで, ことにSに於いては起りよりも内の方に彎曲が出て

いるのをCとした。図の4の右のV, 左のS, 図の7の右と左のV, 3の右のS, 5の左のSなど参照。

Wはうねり, くねっているもので, 図の3の左右のV, 4の左のV, 6, 7の右のV, 9, 10, 11の右のV等参照, Carotis に就いては6, 8, 10, 11の右, 6, 10の左など, 又Sに就いては, 5, 6, 7, 10, 11の右は何れもW, 図の2の右のCarotisはwと見たもの。

Tは曲り, 折れ, ねぢれ, 巻いているもので図の2の左のV, S, 5の左右のV, 6, 8の左のV, 9, 10の右のV, 9の左右のC, S, 8の左の5等何れも相当な程度にそうであるのを見る。

今 Fig. 6の1—11図の各各に就いての評価を表より写して見ると:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
右	{	V	N	N	W	c	T	W	c	W	T	T	N
		C	N	w	N	/	/	W	/	W	T	W	W
		S	N	N	C	/	W	W	W	T	T	W	W
左	{	V	N	T	W	W	T	T	c	T	W	W	W
		C	N	N	c	/	N	W	c	c	T	W	/
		S	N	T	N	c	C	N	N	T	T	N	N

両側Vが共に異常なもの22例(内♀15, ♂7) 少くも片側のVが異常なもの20例(内♀9, ♂11)で合計42例(34.7%)は異常な屈曲をしていることが知られる。これは仲々に頻度が高い。中両側共Tは7例(内♀6例) 片側T, 片側wは6例(内♀5例), 両側共Wは7例(内♀3例), 片側w, 片側Cが2(内♀1)例で, 女が非常に多いことが分る。これに片側だけのものを見るとTが8例(内♀6)で少くも片側がTのもの21例(内♀16例)は全体の17.3%強に当り, 女だけで $16/42=38.3\%$ はである。

両側共Vが程度の強い異常な彎曲や曲折, 屈曲を示す22例に就いてCやSの態度を見るにCarotisでT 4, W 9, C 6, 不明17例, 正常及びそれに近いもの8例, SubclaviaではT 8, w 8, C 2 不明5で正常又はそれに近いもの21例でCの半数以上($19/27=70\%$), Sの半数近く($18/37=46\%$)がやはり異常を示している。これらの異

常を示すものは何れも高年者で男女共に最低年令62才で不明の1例を除き平均72才である。

片側異常を示す20例もやはり高令で, 1例♂40才といふのがあふ外は何れも50才以上である。この平均年令64才弱でこの20例について見てもCarotisはT 1, W 3, c 4, N 11, /21でSubclaviaはT 1, W 9, C 0, /3, N 27, でCの半分近く, Sの約 $1/3$ はやはり異常な屈曲を示す。

Vは正常又はそれに近く, CやSが異常な屈曲を示す6例は1例年令不明なものを除き, 最低♂50才で平均70才強。

40才以下のものが135例中20例(男女併せて)もあるのに, これらの異常を示す49例の中唯の1例40才のものがあるだけで, 他は何れも50才以上だということはこの異常な屈曲が年令の変化によるものであることを示唆するものである。そしてこのことはこの高度な異常を示す合計51例を除く他の70例に就いて見ても, これが全く異常なしと見られるものは24例にすぎず, 異常ありかなしか全く不明のもの(つまり異常のあり得るもの)10例あり, wやc等程度の異常を示すもの16例, 軽度の異常に加うるに不明な点のあるもの20例(つまり少くも軽い異常のものが36例, 半数あるということ), そして40才以下の老人ならぬもの20例は正常のものの中に9, 軽い異常のものの中にもあつて, 軽い異常に加うるに高度の異常の可能性あるもの20例中には唯2例, 不明のもの10例中3例という分布であることからいえると思う。つまり若い時には例外的な, きはめてまれな畸形としての異常な屈曲(もしありとすれば)を示すものの外はこれらの動脈は屈曲することはなく, 年寄るに従ひ何等かの理由により次第に長くなつて一定の距離内におさまらず次第に彎曲し, 屈曲し, ねぢれ, 曲って行くものである。

この様な屈曲を示すものの中男3例(No. 42, 87, 90)と女2例(No. 35, 107)はVertebralisが異常な入口を示していた。No. 42—C₄, C₅, No. 87—C₅, C₆, No. 90—C₆, C₆, No. 35—C₅, C₆, No. 107—C₆, C₅。これは一寸見ると非常に多い様だが, 異常入口の全数16例の $1/4$ であつ

Table 20-1. List of the condition of arteria vertebralis, carotis and subclavia.

Number	Sex	Age	Left	Right	Left	Right	Sex	Age	Left	Right	Sex	Age	Left	Right	Number
1	Male	50	V	N	C	S	Female	67	C	S	Female	90	C	S	67
2	Female	70	N	N	N	N	Female	68	N	N	Female	90	/	N	68
3	Male	/	T	N	N	T	Male	69	N	N	Male	/	/	N	69
4	Male	50	N	N	N	N	Male	70	N	N	Male	/	/	N	70
5	Female	78	N	N	N	N	Female	71	N	N	Male	43	/	N	71
6	Male	/	N	N	N	N	Male	72	N	N	Female	/	/	N	72
7	Male	22	W	N	C	N	Male	73	N	N	Male	/	/	N	73
8	Male	64	N	N	N	N	Male	74	N	N	Male	42	/	N	74
9	Male	21	N	N	N	N	Male	75	N	N	Male	64	/	N	75
10	Male	30	N	N	N	N	Male	76	N	N	Male	60	/	N	76
11	Female	21	N	N	N	N	Female	77	N	N	Female	60	/	N	77
12	Male	24	N	N	N	N	Male	78	N	N	Female	34	/	N	78
26	Female	72	T	N	/	/	Female	79	/	/	Male	60	/	/	79
27	Male	93	W	N	N	N	Male	80	N	N	Male	54	/	N	80
28	Female	65	N	N	/	N	Female	81	N	N	Male	63	/	N	81
29	Male	73	C	W	W	W	Male	82	W	W	Male	65	/	N	82
30	Female	71	W	N	/	/	Female	83	/	/	Male	51	/	N	83
31	Male	57	N	N	/	N	Male	84	/	/	Female	62	/	N	84
32	Female	52	N	N	/	N	Female	85	/	/	Female	78	/	N	85
33	Male	65	N	N	/	N	Male	86	N	N	Male	70	/	N	86
34	Male	71	/	T	N	/	Male	87	/	/	Male	74	/	N	87
35	Female	81	N	N	/	N	Female	88	/	/	Female	69	/	N	88
36	Male	64	N	N	/	N	Male	89	/	/	Female	67	/	N	89
37	Female	/	w	c	/	/	Female	90	/	/	Male	51	/	N	90
38	Male	50	W	N	/	/	Male	91	/	/	Male	21	/	N	91
39	Female	62	W	T	N	W	Female	92	/	/	Male	23	/	N	92
40	Male	64	T	T	/	/	Male	93	/	/	Male	43	/	N	93
41	Male	55	N	N	/	N	Male	94	/	/	Male	27	/	N	94
42	Male	55	w	N	/	N	Male	95	/	/	Female	61	/	N	95
43	Male	37	N	W	/	W	Male	96	/	/	Male	70	/	N	96
44	Male	63	W	N	/	N	Male	97	/	/	Male	56	/	N	97
45	Male	59	N	W	/	W	Male	98	/	/	Female	81	/	N	98
46	Female	69	W	W	/	W	Female	99	/	/	Male	73	/	N	99
47	Male	73	W	W	/	W	Male	100	/	/	Female	79	/	N	100
48	Male	63	N	N	/	N	Male	101	/	/	Male	74	/	N	101
49	Male	31	N	N	/	N	Male	102	/	/	Male	74	/	N	102
51	Male	58	N	N	/	N	Male	103	/	/	Female	72	/	N	103
52	Male	29	N	N	/	N	Male	104	/	/	Male	62	/	N	104
53	Male	30	N	N	/	N	Male	105	/	/	Female	68	/	N	105
54	Female	24	N	N	/	N	Female	106	/	/	Female	72	/	N	106
55	Male	44	N	N	/	N	Male	107	/	/	Female	73	/	N	107
56	Male	25	N	N	/	N	Male	108	/	/	Female	73	/	N	108
57	Male	37	N	N	/	N	Male	109	/	/	Male	59	/	N	109
58	Male	77	N	N	/	N	Male	110	/	/	Female	79	/	N	110
59	Male	50	N	N	/	N	Male	111	/	/	Male	41	/	N	111
60	Male	40	N	N	/	N	Male	112	/	/	Male	45	/	N	112
61	Male	59	N	N	/	N	Male	113	/	/	Female	37	/	N	113
62	Male	39	N	N	/	N	Male	114	/	/	Male	58	/	N	114
63	Male	62	N	N	/	N	Male	115	/	/	Male	54	/	N	115
64	Male	62	N	N	/	N	Male	116	/	/	Female	29	/	N	116
65	Female	60	N	N	/	N	Female	117	/	/	Male	54	/	N	117
66	Male	38	N	N	/	N	Male	118	/	/	Male	54	/	N	118
			N	N	/	N	Female	119	/	/	Female	79	/	N	119
			W	W	/	W	Female	120	/	/	Female	79	/	N	120

Table 20-2.

Number	Sex	Age	Left	Right	Left	Right	Sex	Age	Left	Right	Sex	Age	Left	Right	Number
67	Female	90	C	S	C	S	Female	67	C	S	Female	90	C	S	67
68	Female	/	/	/	/	/	Female	68	/	/	Female	/	/	/	68
69	Male	/	/	/	/	/	Male	69	/	/	Male	/	/	/	69
70	Male	/	/	/	/	/	Male	70	/	/	Male	/	/	/	70
71	Male	43	/	/	/	/	Male	71	/	/	Male	43	/	/	71
72	Female	/	/	/	/	/	Female	72	/	/	Female	/	/	/	72
73	Male	/	/	/	/	/	Male	73	/	/	Male	/	/	/	73
74	Male	42	/	/	/	/	Male	74	/	/	Male	42	/	/	74
75	Male	64	/	/	/	/	Male	75	/	/	Male	64	/	/	75
76	Male	60	/	/	/	/	Male	76	/	/	Male	60	/	/	76
77	Female	60	/	/	/	/	Female	77	/	/	Female	60	/	/	77
78	Female	34	/	/	/	/	Female	78	/	/	Female	34	/	/	78
79	Male	60	/	/	/	/	Male	79	/	/	Male	60	/	/	79
80	Male	54	/	/	/	/	Male	80	/	/	Male	54	/	/	80
81	Male	63	/	/	/	/	Male	81	/	/	Male	63	/	/	81
82	Male	65	/	/	/	/	Male	82	/	/	Male	65	/	/	82
83	Male	51	/	/	/	/	Male	83	/	/	Male	51	/	/	83
84	Female	62	/	/	/	/	Female	84	/	/	Female	62	/	/	84
85	Female	78	/	/	/	/	Female	85	/	/	Female	78	/	/	85
86	Male	70	/	/	/	/	Male	86	/	/	Male	70	/	/	86
87	Male	74	/	/	/	/	Male	87	/	/	Male	74	/	/	87
88	Female	69	/	/	/	/	Female	88	/	/	Female	69	/	/	88
89	Female	67	/	/	/	/	Female	89	/	/	Female	67	/	/	89
90	Male	51	/	/	/	/	Male	90	/	/	Male	51	/	/	90
91	Male	21	/	/	/	/	Male	91	/	/	Male	21	/	/	91
92	Male	23	/	/	/	/	Male	92	/	/	Male	23	/	/	92
93	Male	43	/	/	/	/	Male	93	/	/	Male	43	/	/	93
94	Male	27	/	/	/	/	Male	94	/	/	Male	27	/	/	94
95	Female	61	/	/	/	/	Female	95	/	/	Female	61	/	/	95
96	Male	70	/	/	/	/	Male	96	/	/	Male	70	/	/	96
97	Male	56	/	/	/	/	Male	97	/	/	Male	56	/	/	97
98	Female	81	/	/	/	/	Female	98	/	/	Female	81	/	/	98
99	Male	73	/	/	/	/	Male	99	/	/	Male	73	/	/	99
100	Female	79	/	/	/	/	Female	100	/	/	Female	79	/	/	100
101	Male	74	/	/	/	/	Male	101	/	/	Male	74	/	/	101
102	Male	74	/	/	/	/	Male	102	/	/	Male	74	/	/	102
103	Female	72	/	/	/	/	Female	103	/	/	Female	72	/	/	103
104	Male	62	/	/	/	/	Male	104	/	/	Male	62	/	/	104
105	Female	68	/	/	/	/	Female	105	/	/	Female	68	/	/	105
106	Female	72	/	/	/	/	Female	106	/	/	Female	72	/	/	106
107	Female	73	/	/	/	/	Female	107	/	/	Female	73	/	/	107
108	Female	73	/	/	/	/	Female	108	/	/	Female	73	/	/	108
109	Male	59	/	/	/	/	Male	109	/	/	Male	59	/	/	109
110	Female	79	/	/	/	/	Female	110	/	/	Female	79	/	/	110
111	Male	41	/	/	/	/	Male	111	/	/	Male	41	/	/	111
112	Male	45	/	/	/	/	Male	112	/	/	Male	45	/	/	112
113	Female	37	/	/	/	/	Female	113	/	/	Female	37	/	/	113
114	Male	58	/	/	/	/	Male	114	/	/	Male	58	/	/	114
115	Male	54	/	/	/	/	Male	115	/	/	Male	54	/	/	115
116	Male	/	/	/	/	/	Male	116	/	/	Male	/	/	/	116
117	Female	29	/	/	/	/	Female	117	/	/	Female	29	/	/	117
118	Male	54	/	/	/	/	Male	118	/	/	Male	54	/	/	118
119	Male	54	/	/	/	/	Male	119	/	/	Male	54	/	/	119
120	Female	79	/	/	/	/	Female	120	/	/	Female	79	/	/	120

Table 20-3.

Number	Sex	Age	Right			Left		
			V	C	S	V	C	S
121	Male	66	N	N	N	N	N	N
122	Female	84	c	c	N	c	N	N
123	Female	72	c	/	W	c	c	N
124	Male	79	W	W	T	T	c	T
125	Male	69	c	w	W	w	N	N
126	Female	76	T	N	N	T	w	w
127	Male	73	w	N	N	w	N	N
128	Female	83	W	T	T	T	W	N
129	Male	67	N	N	N	N	N	N
130	Female	77	N	N	w	w	c	N
131	Female	73	T	T	T	W	T	T
132	Male	45	w	c	N	c	c	N
133	Female	67	T	W	W	W	W	N
134	Female	79	W	N	N	W	N	N
135	Male	71	N	W	W	W	C	N

Total 121 cases (Male 79 cases, Female 42 cases)

Note,

N=normal or straight.

c=curved. C=greatly curved.

w=waved. W=greatly waved.

T=crooked and twisted.

Table 21-1.

1. Both sides vertebral arteries abnormal.

Number	Sex	Age	Right	Left	Right	Left	Number	Sex	Age	V	Right	S	V	Left
6	Male	/					2	Female	70		C	S		C
26	Female	72					27	Male	93	N	w	N	T	N
29	Male	73					28	Female	65	N	/	N	N	N
30	Female	71					38	Male	50	c	/	/	T	/
35	Female	81					40	Female	64	T	/	N	W	/
39	Female	62					42	Male	55	w	/	W	N	/
44	Male	63					45	Male	59	N	W	W	W	W
46	Female	69					51	Male	58	N	N	/	T	N
47	Male	73					60	Male	40	N	/	N	T	N
85	Female	78					77	Female	60	w	W	w	T	/
88	Female	69					84	Female	62	N	/	N	T	T
96	Male	70					86	Male	70	c	c	c	T	/
103	Female	72					87	Male	74	w	/	w	W	c
104	Male	62					89	Female	67	/	/	/	C	/
105	Female	68					90	Male	51	N	N	W	T	/
110	Female	79					95	Female	61	w	/	W	W	C
124	Male	79					107	Female	73	N	C	W	C	C
126	Female	76					108	Female	77	c	/	N	W	N
128	Female	83					119	Male	54	N	/	W	W	/
131	Female	73					135	Male	71	N	W	W	W	/
133	Female	67					Total 20 cases (Male 11 case, Female 9 cases)							/
134	Female	79												W
														S
														T 1
														W 9
														C 3
														/ 27
														N 27

Table 21-2.

2. One side vertebral artery abnormal.

Number	Sex	Age	V	Right	S	V	Left
2	Female	70	N	C	S	N	C
27	Male	93	W	w	N	N	N
28	Female	65	N	/	N	N	/
38	Male	50	c	/	/	/	/
40	Female	64	T	/	N	W	/
42	Male	55	w	/	W	W	/
45	Male	59	N	W	W	W	N
51	Male	58	N	N	/	N	N
60	Male	40	N	N	N	w	/
77	Female	60	w	W	w	T	T
84	Female	62	N	/	N	T	/
86	Male	70	c	c	c	W	c
87	Male	74	w	/	w	C	/
89	Female	67	/	/	/	T	/
90	Male	51	N	N	W	W	C
95	Female	61	w	/	W	W	C
107	Female	73	N	C	W	W	C
108	Female	77	c	/	N	W	N
119	Male	54	N	/	W	W	/
135	Male	71	N	W	W	W	/

Total 20 cases (Male 11 case, Female 9 cases)

V	C	S
T 8	T 1	T 1
W 10	W 3	W 9
C 2	C 4	C /
	/ 21	/ 3
	N 11	N 27

Note; w and c are included in N.

3. Carotid and subclavian arteries abnormal.

V		(Female)		C		S		Number		Sex		Age		Right		Left	
T	T	7	(6)	T	4	T	8	48	Male	63	Male	63	V	C	C	S	
T	W	6	(5)	W	9	W	8	73	Male	/	Male	/	N	W	W	N	
W	W	7	(3)	C	6	C	2	76	Male	60	Male	60	/	C	N	c	
W	C	2	(1)	N	8	N	21	97	Male	56	Male	56	w	/	c	N	
				/	17	/	5	98	Female	81	Female	81	N	W	N	N	
								99	Male	73	Male	73	w	/	w	N	
								100	Female	79	Female	79	w	/	w	N	
								123	Female	72	Female	72	c	/	c	N	
								125	Male	69	Male	69	c	w	c	N	
Total 9 cases (Male 6 cases, Female 3 cases).																	
C S V																	
T 0 T 1 N 4																	
W 3 W 5 c 4																	
C 2 C 0 w 9																	
N 8 (c, w) N 11 (c, w) / 1																	
/ 5 / 1																	

て決して多くはなく、寧ろ少い位で、異常屈曲と異常入口との無関係を示すものと云える。

ここに面白いことは我々の例では高度な異常を示すものに女が多いこと、ことに高度な屈曲 T に於いては V の 21 例中女は 17 例で男の 4 に対して実数に於いて 4 倍、割合からいって、 $\frac{17}{79} = 21.5\%$ に対して、 $\frac{4}{21} = 3.3\%$ であるから約 7 倍の多数であることと、左の S に異常屈曲の起り方の少いこと (左 118 例中 T 4, W 3 なるに對し右 111 例中 T 7, W 19, C 1 という割合) とである。この後者は左と右の Subclavia の起り方の差という解剖学的関係により説明出来るとしても、前者即ち早が占よりも多くの異常を示していることは、我々の例では早の平均年齢が占のそれよりも 10 年も年上だというような関係によるのか、それとも性差によるものなのか何ともいえない。性差だとするとそれは如何なる理由によるのか? 他の動脈でもこういう差があるのか? も分らない。

これらの異常は表でも分る様に左右両側、3 つの動脈の 2 つ以上に連合して起っている。それらの中でことに高度なものは No. 39, 46, 47, 77, 88, 96, 104, 105, 110, 124, 128, 131 及び 133 の 13 体である。ことに No. 88, 104, 105, 124, 131, 133 はその中でも更に高度な連合を示す。これらの中幾つかは己に図で示されているが、でないものは Fig. 7 に示した。

No. 131, 早, 73 才 (Fig. 6—9) はことに高度の異常屈曲を示し、両側の C は夫々半廻転、両側の S と左の V は夫々 1 廻転のねぢれ、曲りをしているし、左の V もかなり強いうねりを示す。

No. 124, 占, 79 才 (Fig. 6—8) は前者に次ぐ高度な異常を示すもので、両側の S が 1 廻転の強いねぢれを示し、左の V も 1 巻きし、右の V はかなりなうねりで C₆ に入り、右の C もかなりなつよい屈曲、左の C は弱い彎曲を示している。

No. 104, 105 は 62, 68 才、占と早で両側の V が強い曲りやねぢれを示している上に、右の S も亦強い屈曲の廻転を示し、No. 104 では不明

だが、No. 105 では両側の C も亦強いうねりを示す (Fig. 7—1 及び 2)。

No. 133, 早 67 才 (Fig. 6—10) は両側の V と C が共に高度な屈折やうねりを示している上に右の S も亦強いうねり様である。

No. 88, 早, 69 才 (Fig. 7—3) は両側の S が強いうねりや曲りを示す上に V も C も共に高度な彎曲や屈曲を示す。

No. 128, 早, 83 才 (Fig. 4—10) では右の C と S が曲り、くねり、左の V が強く折れ曲っている上に C も亦つよいうねりを示し、右の V もかなりうねって C₃ に入り、比較的異常の少いのは左の S だけである。

No. 39, 46 (Fig. 6—5, 6) と No. 77 (Fig. 5—11) では両側の V がかなり強い折れ曲りやうねり、くねりを示している上に、後 2 者では更に両側の C が強いうねりや曲りを示し、右の S はほぼ正常だが左の S はかなり強いうねりを示すし、No. 39 では C はほぼ正常でも S は或は強く彎曲、或はかなりなくねりを示す。

No. 96, 110, 47 (Fig. 7—4, 5, 6) も同様左右の V の強い曲りやうねりくねりの外、C や S もかなりな変化が伴っていること図に示す通りである。

以上の 13 例は頗る高度な異常であるが、而もそれは全数 121 例の 10% 以上を占め、これ程でなくても強い異常屈折は少くも両側の V に異常のあるもの 22 例 + 少くも片側の V に異常のあるもの 20 例 + V には異常はないが、少いが C や S にあるもの 9 例、合計 51 例、全数の約 42% に見られたのであって、これがかりに老人性変化の結果だとすると、少くも 50 以上の人にとっては約半数は V や C, S の異常屈曲を示すということになるから、それらにあっては皮膚の上よりしては Carotis は何とか大凡の位置を定め得られるとしても、V は全く不可能といふ外はない。というのは入口はかりに C₆ の横突孔としても、Subclavia の位置の変化の為に起りが全く不定になってしまうからである。このことは V の走行の方向の項でも少しくふれたが、かりに走る方向、つまり、初めと終りの位置関係が一定だ

Table 22. List of measured values of the vertebral artery in the atlas region.

No.	Sex	Age	Outside- breadth	Breadth		Inside- breadth	Outside -Inside	Thickness			
				Right -half	Left -half			Right Exit Entrance	Left Exit Entrance		
1	♂	50	65	31	34						
2	♀	70	65	34	31						
3	♂		70	35	35						
4	♂	50	66	34	32						
6	♂		64	31	33						
7	♂	22	61	31	30	47	14	4		4	
8	♂	64	58	30	28	13	45	4		4	
9	♂	21	61	31	30	15	46	3		2	
10	♀	50	55	27	28	17	38	2		2	
11	♂	27	64	32	32	24	40	2		2	
12	♂	24	62	32	30	15	47	3		4	
13	♂	72	66	30	36	19	47	3.5		4	
14	♂		66	32	34	19	47	3		5	
15	♂		66	33	33	19	47	3	2.5	3	4
16	♀	50	58	27	31	15	43	3.5	3	4	4
17	♂	48	56	27	29	20	36	4		4	
18	♀	60	63	29	34	19	44	4		5	
19	♂	20	54	27	27	15	39	4		4	
20	♂	55	65	32	33	17	48	3.5	4	3	3.5
21	♂	72	63	31	32	12	51	4		5	
22	♂	64	74	37	37	17	57	5.5	4	5.5	5.5
23	♂	25	59	29	30	20	39	4.0	—	—	—
24	♂	58	56	30	26	14	42	5	4	3	4
25	♂		68	34	34	16	52	4	4	5	4
27	♂	93	60	30	31	18	42	5	5	5	5
46	♀	69	59					3		5	
47	♂	73	61					3		3.5	
48	♂	63	57					3		4.5	
51	♂	58	62			21	41	3.5		4.5	
53	♂	30	61			20	41	4	4	3	3
54	♀	24	56					3		4	
74	♂		62	32	30	22	40	3.5	3.5	4	3.5
80	♂	54	64	32	32	24	40	4	4	4	3
81	♂	63	62			22	40	3	3	4	4
82	♂	65	67			25	42	5	5	5	4
Total			35	27	27	26	26	30	12	29	12
Mean			62.2	31.1	31.7	18.3	44.4	3.7	4.0	4.0	4.0

Outside breadth : breadth between outer wand of both side arteries at the foramen transversarium of the atlas.

Inside breadth : breadth between inner wand of both side arteries at the entrance through atlanto-occipital membrane.

Right-and Left-half : breadth from posterior tubercle of the atlas to the outer wand of artery at the foramen transversarium

としても、その途中が出たらめでは、その初めと終りの外は位置は不定ということになるが、その初めの位置すらも一定ではないとすると、Vの位置は唯その入口によってのみ確定するより外はなくなる。でなければ、かなりあてずっぽうで、唯 Carotisより深い位置ということで大凡の所を針でついて見るより外にいたしかたがない。

IX. Atlas 部に於ける椎骨動脈

頸椎の横突起孔に入ってから上に昇り, Atlas^sの横突起孔を出るまでの間の Vertebralis に就いては調査しなかったが、それから後 Membrana atlantooccipitalis を貫いて頭蓋腔に入るまでの調査がある。とはいっても全数に就いて調査出来たわけではなく、材料の関係から出来たのは漸く35例にすぎず、しかも全部が完全というわけではないが、その中計測値は Table

22に一覧表として示した。計測したのは左右の Vertebralis が Atlas の Foramen transversarium を出た所で、その外側の間の幅と、その左右両半分の幅、Vertebralis が Membrana atlantooccipitalis を貫くときの左右の動脈の間の距離、出口、入口の所に於ける夫々の太さ（直径）である。

(1) 出口における左右椎骨動脈の間の幅

(Outside breadth), 之は前述せるように椎骨動脈が下部頸椎の横突起孔を通過して上行し、第1頸椎横突起孔を通り抜けてから水平に椎骨動脈溝を通るために後ろ内に曲る所でその動脈の左右の外壁間を「スベリザシ」で計測した。例数は材料の都合で主に順天堂のものだけについて見たため全部で35例。幅は最小54mmより最大74mmまでで、その分布頻度はTable 23に示す如く、61, 62, 66mmが共

Table 23. Frequency of Outside and Inside Breadth.

Outside -breadth		Inside -breadth		Outside -Inside		mm	Right half freq.	Left half freq.
mm	freq.	mm	freq.	mm	freq.			
54	1	12	1	36	1	26	0	1
55	1	13	1	37	0	27	4	1
56	3	14	2	38	1	28	0	2
57	1	15	4	39	2	29	2	1
58	2	16	1	40	4	30	4	5
59	2	17	3	41	2	31	5	3
60	1	18	1	42	3	32	6	4
61	4	19	4	43	1	33	1	3
62	4	20	3	44	1	34	3	4
63	2	21	1	45	1	35	1	1
64	3	22	2	46	1	36	0	1
65	3	23	0	47	5	37	1	1
66	4	24	2	48	1	Total	27	27
67	1	25	1	49	0			
68	1	Total	26	50	0			
69	0			51	1			
70	1			52	1			
71	0			53	0			
72	0			54	0			
73	0			55	0			
74	1			56	0			
				57	1			
Total	35			Total	26			

Table 24. Frequency of Thickness.

mm	Exit		Entrance	
	Right	Left	Right	Left
2.0	2	3	0	0
2.5	0	0	1	0
3.0	9	4	2	2
3.5	5	11	1	2
4.0	10	11	6	6
4.5	0	2	0	0
5.0	3	7	2	1
5.5	1	1	0	1
Total	30	29	12	12

に4例で最大、次いでは56, 64, 65mmで共に3例, 61~66mmの間に20例, 全数の $20/35 = 57.1\%$ 弱が集って居り, 平均値は62.2mm弱, 60mm以下は11例で31.4%強, 67mm以上は4例, 11.4%強, 56~66mmの間に29例83%弱が集っている。

(ロ) 左右椎骨動脈の中心までの距離。

之は(イ)に計ったと同様に外壁より中心の後結節までを左, 右椎骨動脈より夫々計測したものであるが, これは35例の全部に於いて計測してなく, 皆で27例だけ。., 左, 右に於いて中心までの幅が左右対称のもの即ち同等のものは27例中7例, 左>右が12例, 右>左が8例となっており, 一寸見ると左が大きいようであり, 又平均値も0.6mm程大きくなっているが, 確差ではなく, 多分左右による差はないであらう。個々の値を見ると, 分布の範囲は左では26mmより37mm迄, 右は27mmより37mmまでとなっていて, Table 22の右方の分布表によると, 右半分の最大頻度は32mmの6例, 次いでは31mmの5例であるのに, 左では30mmの5例, 次いでは32, 34mmの4例で, 分布の様子が右と左で少し異なるようだが, これまた例数が少ないためで, 右は27—34mmの間に25例で全体の92%強が, 左では28—35mmの間に23例, 85.2%が集っている。平均値は右31.1mmと左31.7mm

(ハ) 入口に於ける左, 右椎骨動脈間の幅。

(Inside breadth) これは動脈が硬膜を貫いて頭蓋腔に入るその入口に於ける内側の幅で,

総数26例の頻度は Table 23 に示す如く, 幅は最小12mmより最大25mm, 15—20mmの間に16例, 61.5%強が含まれ, それより大きいのは6例, 23.1%, 小さいのは4例, 15.4%で平均値は18.3mm弱, 外側—内側の差は47mm, 40mm といふのが最も多く, 夫々5例, 4例で40—47mmが18例で69%程, 平均44.4mm程。

(ニ) 椎骨動脈の出口及び入口に於ける太さ。

出口といふのはAtlasの横突起孔を貫いて水平に曲る所, 入口は Membrana atlanto-occipitalis を貫こうとする所で右30, 左29例で計測された。左右共に2~5.5mmで, 左右両側共に4mmが最大頻度で共に夫々11, 10例づつ, 3—5mmの間に25, 27例づつで共に81.2%, 90%が集つて居り, 平均値は右3.7強, 左4.0 強で左が一寸大きいようにも見えるが確差はなく, 平均はまづ4.0と見ればよいようで, この点 Vertebralisの始めの部分の太さと大差ない。

入口部の太さも左右両側共4mmが6例づつで全体の半数を占めていて, 平均値は共に4.0mm弱。

以上のことから Atlas部に於ける Vertebralis は中央より左右に夫々平均の所から平均31mm, 23—33mmの所から, 平均9mm, 8—10mmまでホボ水平に Atlas の Arcusの上を夫々22mm程走り, その太さは略1様の4mm位(3—5mm)と見てよい。

然し我々の場合これは Atlasを頭蓋骨より切りはなして計測したのであるから, 太さは上から見ての話で, 上下の方向に於ける太さではないし, ましてこの約22mm程の走行の間に, Vertebralis が Sulcus a. vertebralisの中にどれ程かくれるかはこれだけでは分らない。この Sulcus は教科書の絵でみると割に浅い, ほぼ平な溝のように見えるが, 必らずしもそうではない。我々は Atlasだけを特にとり出して骨標本としたものを少しもっている。それについての所見を少し次に述べる。

Table 25. List of measured values of the atlas.

No.	Sex	Age	Outside	Breadth		Diameter of Foramen	
				Right-half	Left-half	Right	Left
1	?	?	57	28	29	4.5(10)	7.5(9.5)
2	?	?	56	29	27	6 (6)	5 (6.5)
3	Male	60	57	29	28	4.5(7)	4 (7)
4	Male	26	65	32	33	6 (8)	6.5(9)
5	Male	65	63	31	32	6 (7)	6 (7)
6	Male	61	55	27	28	5 (6)	6.5(7)
7	Male	39	57	28	29	5 (7)	5 (7)
8	Female	32	58	29	29	6 (7)	7 (8)
9	Male	60	66	32	34	8 (8)	7 (7)
10	Male	35	58	29	29	5 (6)	7 (7.5)
11	Male	?	54	26	28	6 (6.5)	5.5(7)
12	Male	60	55	28	27	7 (7.5)	8 (8)
13	Male	24	62	29	33	6 (6)	6 (7)
14	Male	38	59	30	29	7 (8)	7 (7.5)
15	Female	23	53	27	26	3.5(4.5)	5 (5.5)
16	Male	29	59	29	30	8 (8)	5 (9)
17	Male	30	55	27	28	4 (7)	4 (6.5)
18	Male	25	63	32	31	4.5(7)	5 (7)
19	Male	22	59	30	29	5 (8.5)	6 (8)
20	Female	60	50	24	26	6 (6)	6 (7)
21	Male	29	56	27	29	6 (8)	6 (7)
22	Male	55	64	31	33	6 (7)	7 (8)
23	Male	55	55	27	28	5 (7)	5 (7)
24	Female	24	60	30	30	6 (7)	5 (7)
25	Female	31	54	28	26	4.5(6)	6 (7)
26	Male	28	64	32	32	6.5(8)	7 (8)
27	Male	30	64	33	31	5 (8)	6 (8)
28	Male	23	70	36	34	8.5(8.5)	9 (9)
29	Male	41	63	31	32	6 (7.5)	8 (9)
30	Male	33	59	29	30	6 (8)	6 (7.5)
31	Male	51	58	30	28	4 (7)	4.5(8)
32	Male	57	64	32	32	4 (8)	7 (7)
33	Male	46	58	27	31	4 (7)	6 (7)
34	Male	37	58	28	30	5 (7)	6 (8)
35	Male	30	57	28	29	6 (7.5)	5 (8)
36	Male	24	61	31	30	5 (6.5)	2 (2)
37	?	?	60	30	30	5 (7)	6 (8)
38	?	?	58	28	30	6.5(6.5)	7 (7)
39	?	?	55	28	27	5.5(5.5)	5 (6)
40	?	?	60	30	30	5.5(6.5)	5 (6)
41	Male	37	60	30	30	5 (7)	5 (7.5)
42	Male	39	56	28	28	5 (7)	6 (6)
43	Male	57	63	32	31	5 (7.5)	5 (7)
44	?	?	60	30	30	6 (7)	5 (6)
45	Male	21	65	32	33	5 (6)	5 (6)
46	Male	54	60	31	29	7 (7)	5.5(7)
47	Male	27	60	30	30	7 (7)	5.5(7)
48	Male	51	62	31	31	5.5(7)	5.5(7.5)
49	?	?	61	31	30	7 (7)	6.5(8)
50	?	?	58	29	29	6.5(8)	6 (6.5)
51	?	?	59	29	30	7 (8)	7 (7)
52	?	?	59	30	29	4.5(7.5)	5.5(7)
53	?	?	63	31	32	6 (7)	5 (6.5)
54	?	?	65	33	32	6.5(7)	6.5(7.5)
55	?	?	62	31	31	6.5(6.5)	7 (7.5)
56	?	?	64	32	32	6 (7)	7 (7.5)

Note, ().....Maximum diameter.

X Atlas に於ける観察と計測

1. 観察: A. vertebralis は終には Atlas の Foramen transversarium を出て Atlas の Arcus dorsalis 上につくる Sulcus a. vertebralis を後ろ内に Foramen magnumの方に進み, Membrana atlantooccipitalisを貫いて頭蓋腔に入るが, この Sulcus a. vertebralisが教科書や図譜にあるもののようなものばかりなら事は簡単だが, 果してどうか?

手許にある総数56個の Atlas に就いてこれらの点を観察する, に12個(21.4%)に異常が見出された。これらは多くは異常に高度な化骨によるものであるが, 中に1個 Arcus posteriorが半ば程化骨不十分で欠けているのがあった (No. 48, ♀21才, Phot. 1)。これを除く 11個 (19.6%) は A. vertebralisの外側を多少蔽うように骨のよろいを作るものであった。その形は次の7型に分類される。

(a): 左, 右の Massa lateralisの上面の Fovea articularis cranialis の後外側より結節様物の化骨が進んで Arcus posteriorの Tuberculum より各々 $\frac{1}{2}$ の所の外側へ下後ろにのびて附着したためにSulcusではなくCanalis(Foramen)も形成したもの, No. 42. ♀39才, No. 44. ? ? (Phot. 2)

「トンネル」となっている部分の結節様物の巾は, No. 42, 左4 mm, 右3 mm, No. 44左7—4 mm, 右6—3 mm。

(b): 右側は(a)の様であるが, 尚その附着端は Arcus posterior の Tuberculum posterior までの右弓で, その外 $\frac{1}{3}$ のもので, 而も結節様に径4 mm程の Foramen があり, 左は結節様物が Fovea articularis superior の後端より Sulcus を半分程蔽った形になったもの。No. 35, ♀30才 (Phot. 3)

結節様物の幅は左8.5~4.5mm, 右9.5~3.5mm

(c): 右側が(a)の様の状態で, 左側は正常のSulcus となれるもの, No. 14, ♀38才。

結節様物の巾は3.5~2.5mm。

(d): 左側は普通のSulcusなるも, 右側のFovea articularis superior の後外側より結節様物の

化骨が進んで Processus transversusの上後側に附着したもの, No. 21, ♀29才。結節様物の巾は7.5~4 mm。

(e): 左, 右の結節様物の化骨は(a)の様であるが Arcus posterior 迄達せずに Sulcus を半ば以上蔽った形になったもの。No. 45, ♀21才。(Phot. 4) 結節様物の巾は左, 右共に5 mm。

この(b), (d), (e)の型では動脈は Sulcus の所でかなりな部分に於いて上後ろを包まれることになる。

(f): これは最初に述べた Arcus posterior が化骨不十分で半ば欠けたものであるが, これでは左側に於て Arcus 外 $\frac{1}{3}$ の所が非常に肥厚してその上端が Fovea articularis superior の後内側に向って半ば結節様物の化骨が見られる。

Table 26. Frequency of outside breadth, right and left half breadth of the atlas.

Outside breadth		Right half		Left half	
mm	freq.	mm	freq.	mm	freq.
50	1	24	1		0
51	0	25	0		0
52	0	26	1		3
53	1	27	6		3
54	2	28	9		7
55	5	29	9		11
56	3	30	10		13
57	4	31	9		6
58	7	32	8		7
59	6	33	2		4
60	7	34	0		2
61	2	35	0		0
62	3	36	1		0
63	5	Total	56		56
64	5	M±m	29.68		29.89
65	3		±0.28		±0.26
66	1				
67	0				
68	0				
69	0				
70	1				
Total	56				
M±m	59.55±0.51				

Table 27. Frequency of diameter of Foramen transversarium.

mm	Frontal		Sagittal	
	Right	Left	Right	Left
2.0	0	1	0	1
2.5	0	0	0	0
3.0	0	0	0	0
3.5	1	0	0	0
4.0	4	2	0	0
4.5	5	1	1	0
5.0	13	14	1	0
5.5	3	6	1	1
6.0	16	13	8	5
6.5	5	4	3	5
7.0	6	11	24	21
7.5	0	1	5	9
8.0	2	2	11	10
8.5	1	0	1	0
9.0	0	1	0	3
9.5	0	0	0	1
10.0	0	0	1	0
Total	56	56	56	56
M±m	5.7± 0.14	5.9± 0.14	7.1± 0.11	7.2± 0.14

(g) : (e) に似てその程度の軽いもの。

No. 10 35才, No. 18 25才

No. 31 51才, No. 41 37才

以上の7型に分類したものの年齢との関係を見るに、これらのAtlasの年齢の分ったものの平均年齢は39.2才(40例)、異常のあるものの平均年齢は35.6才(10例)で総平均年齢も、異常なものの平均年齢も共に割合に若く、これらの化骨の原因がこの場合では必ずしも老人性の変化とは云えず、若い時代から斯様な変化が起っているものと考ええる。

2. この総数56個のAtlasの各々に就き、左右のForamen transversariumの外側の間の巾(Outside breadth)とその左、右の各半分の巾(Right-half, Left-half)-これは孔の最も外側の点からAtlasの中心までの距離-と左、右のForamen transversariumの直径(Diameter)-Frontalの面で計ったもの-これらの値はTable 25に一覧表として示したがDiameterの欄の()内の値は最大径を示す。

(4) : 左、右の横突孔の外側間の幅 (Outside breadth)。

幅は最小50mmより最大70mmまでで、その分布頻度はTable 26に示す如くで、58mm, 60mmが共に7例で最も多く、次いで59mmの6例、55mm, 63mm, 64mmの5例で、55mmより64mmの間に47例で全数の $\frac{47}{56}=83.9\%$ 、全体の平均値は59.6mmとなっている。

(4) : 左、右横突孔の外側より中心迄の距離 (Right-half, Left-half)。

左、右に於いて中心までの幅が左、右対称のもの、即ち同等のものは $\frac{15}{56}$ 例=26.8%、左>右が $\frac{23}{56}=41.1\%$ 、右>左は $\frac{18}{56}=32.1\%$ で、左>右が多いように見えるが、平均値では左が29.9mm、右が29.7mmとなって、その間に差は殆ど見られず、又Table 26の右半分の分布の範囲でも左、右は28mmより32mmまでに夫々45例、44例が含まれて、全体の80、79%となり、IX章に於ける如く左、右には差はないものと考えられる。Atlas部に於けるVertebralの外側壁よりの距離よりも左で1.8mm、右で1.4mm少なくなっている。

(4) : Atlas部に於ける直径 (Right & Left diameter)。Atlas部に於けるA. vertebralの出口での太さは骨に於けるForamen transversariumのfrontalでのDiameterに相当するので、先づfrontalでのDiameterをみると、

右側では最少3.5mmより最大8.5mmまでの範囲で、最も多いのは6.0mmの16例、次いで5.0mmの13例、7.0mmの11例、6.5、4.5mmの5例の順になって、4.5mmより7.0mmまでが全数の $\frac{48}{56}$ 例=85.7%、平均値は 5.7 ± 0.14 mmとなり、左側では最小2mmより最大9.0mmの範囲で分布し、5.0mmが14例で最も多く、次いで6.0mmの13例、7.0mmの11例、5.5mmの6例の順になっていて、5.0mmより7.0mmの範囲に全体の $\frac{48}{56}$ 例=85.7%、平均値で 5.9 ± 0.14 mmとなり、右及び左の間には差がないといってよく、左右共に大体横突孔は6mm前後の太さと見てよい。

次に最大径をみると7mmが右で24例、左で

21例で最も多く、次いで8mmが右で11例、左で10例、次いで右で6mmの7例、左では7.5mmの9例となっている。平均値では右は 7.1 ± 0.11 mm、左で 7.2 ± 0.14 mmと左、右は共に同じ太さである。

§. 総括と結論：

以上詳述して来たことを簡単に総括してみると次のようになる。

I：一椎骨動脈の起始が、所謂正常型を示すものは約95%，異常型を示すものは約5%で、その大部分のものは左椎骨動脈が大動脈弓より直接に、然も左鎖骨下動脈の右側より起るもので、時に鎖骨下動脈の左側より、即ち大動脈弓の最後の枝として起るもの、及その他の場合があるが、之等は極めて稀である。又右椎骨動脈は右鎖骨下動脈より起るといっても過言ではなく、その異常型は極めて稀で、偶発的なものに過ぎない。

II：一大動脈弓より起る枝の配置は、

(1)普通型が80%

(2)の左総頸動脈が腕頭動脈と同一管とし起始するものが12%弱

(3)の左椎骨動脈が直接大動脈弓より起って而も左総頸動脈と左鎖骨下動脈の間より出るのが5%弱

(4)の普通型ではあるが、腕頭動脈と左総頸動脈との間が大きく離れた距離にあるものが2%

(5)の普通型であるが、左総頸動脈と左鎖骨下動脈との間が大きく離れた距離にあるものが1%

と5型に分られるが、(1)、(2)、(3)の3型を最も普通にみられる型とみてよい。

III：一椎骨動脈の横突孔への入口は

第6頸椎に入るもの、♂で左83%、右90%、♀で左95%、右95%となり、合計では左87%、右92%となり

第5頸椎に入るもの、♂で左14%、右6%、♀で左5%、右5%で合計では左11%、右6%

♂では此の外に第7頸椎に入るものが、左、右共に2例づつ、第4頸椎に入るものが1例づ

つみられた。

男女、左右の別なくその入口をみると、

第6頸椎に入るものが89%

第5頸椎に入るものが8.5%

第7頸椎に入るものが1.7%

第4頸椎に入るものが0.9%となり

左右別では左側の方が第6頸椎以外に入るのが多いが、これは左側は鎖骨下動脈以外より起るものがあり、この場合は例外なく異常入口を示すからである。

IV：一椎骨動脈と総頸動脈との走行関係は椎骨動脈が総頸動脈の内側を走るものが右で40%、左で10%、

外側を走るものが右で30%、左で47%、

後ろを走るものは右で30%、左で42%、

左右同型は40%に満たず、60%強は左右不同型を示している。

故に左右別々に考えると

左で外側を走るものは約50%、残りの50%は内側又は後ろ

右で外側を走るものは30%、残りの70%は内側又は後ろを走っていた。

V：一椎骨動脈の走行方向。

M型(下外より上内に走るもの)を示すものは男女共に右側で70%、左側で男19%、女28%、平均値では右70%、左22%。

P型(まっすぐ上に走るもの)は右では男28%、女25%、左は男54%、女43%、平均値では右27%、左50%。

L型(内下より外へ)は右では男3%、女3%、左で男28%、女30%、平均値で右3%、左28%。

右ではM型、P型、L型の順になり

左ではP型、L型、M型の順になっている。

VI：一椎骨動脈の長さは

最短は♂で左9mm、右5mm、♀で左は9mm、右13mm。

最長は♂で左110mm、右79mm、♀で左90mm、右42mmであった。

平均値は♂では左36.4mm、右27.0mm、♀で左27.3mm、右21.4mmとなり、左右差は♂で9mm、♀で6mm左が長く、♂と♀でも左

で9mm, 右で5mm 合が長くなっている。

5mm 間隔の分布で最大頻度は合で左30mm 階級, 右20mm階級, 早で左20, 25mm 階級, 右で15mm階級となっている。

第6頸椎の横突孔の下までで合左20~45mm, 右15~35mm, 早で左15~30mm, 右で15~25mmの間の長さにあると考えられる。

VII: 一椎骨動脈の太さは,

起始では左最小3.0mm, 最大8.0mm, 右最小2.5mm, 最大7.5mm。

入口部で左最小2.0mm, 最大8.0mm, 右最小2.0mm, 最大7.5mmであった。

左右差は 起始で左>右=40.4%, 左=右=21.1%, 左<右=38.6%, 入口で左>右=44.1%, 左=右=28.8%, 左<右=27.1%で, 左>右が多いが,

平均値は起始で左4.5mm, 右4.4mm, 入口部で左4.1mm, 右3.9mmで, 全体として左右差はないと考えられる。

VIII: 一椎骨動脈, 総頸動脈及び鎖骨下動脈の異常屈曲,

総数121体に於いて, 両側の椎骨動脈の異常屈曲が22例, 片側だけのもの20例で合計 $42/121=34.7\%$, 総頸動脈及び鎖骨下動脈の異常屈曲は9例(7.4%)——最もこの中には椎骨動脈の異常の場合を含んで居らず, この場合を考えると総頸動脈は $27/46=58.7\%$, 鎖骨下動脈は $28/74=37.8\%$ となる——がみられ, 男女に於いて女の方が多いこと, 又年令的にも大部分が老人で, 平均年令は72才である。

IX: 一Atlas 部に於ける椎骨動脈では

(i) Outside breadth は平均値は62.2mmで56~66mmに全体の83%弱が集っている。

(ii) 左右椎骨動脈の中心までの距離では, 同等のもの $7/27=25.9\%$, 左>右 $12/27=44.4\%$, 左<右は $8/27=29.6\%$ ではあるが, 左右の差はみられないと考えられ, 右では27~34mmの間に $25/27=92.6\%$, 左では28~35mmの間に $23/27=85.2\%$ がみられ, 平均値は右31.1mm, 左31.7mmである。

(v) Inside breadth は15~20mmの間に $16/26=$

61.5%で半ば以上になり, 平均値は18.3mm, 従って左右の椎骨動脈は横突孔を出てから $(62.2-18.3)\div 2=22\text{mm}$ 走って (frontal の面に投射しての話) 頭蓋腔に入ることになる。

(vi) 太さは出口及び入口部共に, 又左右共に4mmである。

X: 一Atlas に於ける観察と計測

Sulcus a. vertebralis が Fovea articularis superior 又は Arcus posterior よりの結節様物の化骨によって Canalis を形成するもの, 又は Sulcus を半ば蔽うものが20%近くにみられた。これは必ずしも老人性変化とは考えられず, 又正常と思はれるものにもかなりの数に於いて Fovea articularis superior の後端の突出によって Sulcus を「ヒサシ」状に蔽うものがみられた。

計測では Outside breadthは平均値59.6mmで, Atlas 部に於ける A. vertebralisの計測値よりは平均で約1.8mm少なく, 左半, 右半の幅では平均値は左29.9mm, 右29.7mm でIX節に於ける如く, 左, 右には差はみられず, Atlas部に於ける A. vertebralis の外側壁よりの距離よりも左で1.8mm, 右で1.4mm 少なくなっている。左, 右の出口での太さは大体6mmと考えられ, この値は屍体での動脈の太さの平均4mmよりは約2mm太くなっている。最大径は左, 右共に7mmとなつている。

以上の事実よりして, 冒頭の研究のいとぐちで述べた様に, 造影剤の血管注入による脳血管撮影のために椎骨動脈穿刺を行う3つの方法, 高橋法, 佐野法及び Atlas に於いて行う方法の中,

(1)高橋法の場合最も問題となるのは椎骨動脈と総頸動脈との走行関係であるが, 椎骨動脈が外側を走るものが左, 右共に50%に満たず, 寧ろ内側又は後ろを走るものが多い点, 又交叉的を加味した点であるM型(下外より上内に走るもの)が右はともかく, 左で非常に少ない点よりして, 穿刺は氏のいう如く易いとは思はれず,

(2)佐野法では椎骨動脈が第6頸椎横突孔に入るのが左右共に90%内外という事より, 第6頸

椎横突起の最外端の直下位で、少し内側をねらうならば成功率は高いと思うが、佐野氏の原法では高橋法と大差ない結果とならう。

(3)それよりも Atlas 部の椎骨動脈よりする方法が、Sulcus a. vertebralisを通る椎骨動脈の太さ、Sulcus の状態等を考慮しても最も有利であると考え。唯問題は生体で穿刺、注入、撮影を行うにこの (3)が (2)や (1)より有利かどうかであるが、それはこの研究とは別個な問題であ

る。

(1), (2)法といへどもこの研究の成果を考慮して行うならば、相当な成功を収めるであらうことを確信する。

なほ本研究の発表に臨み、終始変らざる御懇篤なる御指導と御校閲の労を賜りし恩師椿教授、及び材料の提供を心よくお許し下さった東京大学医学部解剖学教室、東京医科歯科大学解剖学教室、東京女子医科大学解剖学教室の方々に心より感謝の意を表す。

文 献

- 1) Adachi, B.: Anatomie der Japaner 1. Das Arteriensystem der Japaner. Kyoto. 1928.
- 2) Bean, R. B.: Observation on a study of the subclavian artery in man. Amer. J. Anat. Vol. 4 1905. Cited from Adachi, B. Anatomie der Japaner. 1. Das Arteriensystem der Japaner.
- 3) Benninghoff, A.: Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 2. 1952.
- 4) Berczeller, A. und H. Kugler.: Freilegung der Arteria vertebralis am Sulcus atlantis. Arch. Klin. Chir. 190. 1937.
- 5) De Garis, C. F.: Modes of origin of the subclavian artery in Whites and negroes etc. Anat. Recoad. Vol. 26. 1923.
- 6) De Garis, C. F.: Subclavian artery in Whites and negroes. Amer. J. Phys. Anthropol. Vol. 7. 1924.
- 7) De Garis, C. F., I. H. Black and F. N. Riemenschneider : Patterns of the aortic arch in american white and negro stocks, with comparative note on certain other mammals. J. Anat. Vol. 67. 1933.
- 8) Gray, H.: Anatomy of the human body. 1948.
- 9) 掛川康次: 脳血管造影法, 南江堂, 昭18.
- 10) 森良夫: 日本人胎児の大動脈弓及びその分枝に就いて, 解剖誌, 第17巻, 第2号
- 11) 森良夫: 日本人胎児の鎖骨下動脈及び其の領域に属する動脈に就いて, 解剖誌, 第17巻, 第4号
- 12) 中田瑞穂: 脳腫瘍, 南山堂, 昭25.
- 13) 小野勇, 時井実男: I 屍体に見出された数個の破格について. 解剖誌. I. II. 1954.
- 14) Pellegrini, A.: Le arteriae subclavia e axillaris nell'uomo studiate col metodo statistico. Arch. Ital. di. Embriol. Vol. 5. 1906. Cited from Adachi, B. Anatomie der Japaner. 1. Das Arteriensystem der Japaner.
- 15) Pernkopf, E.: Topographische Anatomie des Menschen. Bd. 1. 1937.
- 16) Quain.: Anatomy of the arteries of the human body. London. 1844. Cited from Adachi, B. Anatomie der Japaner. 1. Das Arteriensystem der Japaner.
- 17) Rauber-Kopsch.: Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen. Bd. 1. 1955.
- 18) 佐野圭司: 椎骨動脈注射, 脳と神経, 2.1. 昭25.
- 19) 清水秀夫: 本邦人胎児椎骨動脈並にその分岐動脈に就いて, 東京医科大学雑誌, 9巻, 2.3号. 昭26.
- 20) Schultze, O.: Atlas und Kurzgefasstes Lehrbuch der topographischen und angewandten Anatomie. 1935.
- 21) 高橋角次郎: 脳血管撮影法, 南山堂. 昭17.
- 22) 滝井常英: 九州日本人類前正中部の形態学的並に局所解剖学的研究. 熊本大学医学部解剖学教室業績. 第13号, 昭27.
- 23) Thomson, A.: Reports of the committee of collective investigation of the anatomical society of Great Britain and Ireland. J. Anat. and Physiol Vol. 25-29. 1891-1895.
- 24) 植村 上: 椎骨動脈穿刺に関する局所解剖学的研究. 鹿児島大学医学雑誌, 第7巻, 第1号, 昭30.

Summary

The encephaloarteriography by means of the contrastmedia injection into blood vessels is applied mainly for the photography of the anterior and middle regions of the brain under the control of the carotid artery. The posterior portion of the brain can only be photographed through injection into the vertebral artery, and the injection through the skin for this purpose was carried out first by Kakujiro TAKAHASHI (1938).

He invented his own method, but Professor TUBAKI of our laboratory doubted his description that injection into the vertebral artery could easily be done by his method, and K. SANO (1950) claimed that the injection should be done aiming at the anterior tubercle of the sixth cervical vertebra, i. e. the carotid tubercle or else 1-2 cm below that point.

Prior to him, in 1937, BERCZELLER & KUGLER tried similar injection into the vertebral artery in the Sulcus arteriae vertebralis atlantis, but their trial was only experimental using cadavers.

The present studies have been made in order to obtain basic information for an inventual discovery of the best method of contrastmedia injection into the vertebral artery, and for this purpose the author have made studies of the relationship between this artery and various organs, especially the common carotid artery, atlas, etc., as well as the manner of their branching, sizes and directions.

Materials consist entirely of the cadavers for students laboratory exercise, total 135 (92 males & 43 females) in number. The position of the arteries have been determined on the drawings prepared for the frontal views of these organs. The lengths and sizes of blood vessels and width of the atlas have also been measured.

The results of the studies may be summarized as follows:

1. As to the beginning of the vertebral artery, the normal type is formed in 95 % of the cases while the remaining 5 % are of abnormal type.
2. The arrangement of the branch beginning at the aortic arch is usual type in 85 % of cases and of abnormal type (consisting of several types) in 20 % of cases studied.
3. With respect to the entrance into the foramen for the vertebral artery, those which enter into the sixth cervical vertebra are found in 87 % (left) and 92 % (right) of the cases. The percentage is less for the fifth, seventh and fourth in the order listed.

These results confirm the results of the studies of the previous authors. The following results are entirely new and will be described in somewhat greater details,

4. Regarding the topographic relation of the vertebral artery and common carotid artery, in 50 % (left) and 30 % (right) of the cases the former runs outer side of the latter, while in 50 % (left) and 70 % (right) of the former runs either the inner side of the latter or behind it.
5. As to the direction of the vertebral artery, 22 % (left) and 70 % (right) are M-

type (that which runs up and inward from below and outside), 50 % (left) and 27 % (right) are P-type (that which runs straight up) and 28 % (left) and 3 % (right) are L-type (that which runs up and outward from below and inside). See Fig. 4-7.

6. For the length of the vertebral artery, the shortest has been found to be 5 mm in the male (right), the longest to be 110 mm in the male (left) and the average values have been 36.4 mm (left) and 27 mm (right) in the male, 27.3 mm (left) and 21.4 mm (right) for the female. The difference between right and left is 9 mm for the male and 6 mm for the female, the left being longer than the right. As to the sex difference, it is longer in the male by 9 mm in the left and 5 mm in the right.
7. As to the size of the vertebral artery the average value is 4.5 mm at the beginning for both sides, 4 mm at the entrance, and no significant difference is found between the right
8. With regard to the abnormal bendings of the vertebral, common carotid and subclavian arteries, abnormalities are observed for the both or one side of the vertebral artery in 34.7 % of the cases while abnormalities in the other arteries are seen in 7.4 % of the cases (those accompanied by the abnormal bendings of the vertebral artery are not included in these). These abnormalities are found more in the female and mostly in the aged (the average age is 72).
9. At the atlas region the outside breadth of the vertebral artery is in the average 62.2 mm while the inside breadth (the breadth at the inner side of the entrance of the artery into the cranial cavity through the dura mater) is in the average 18.3 mm. Therefore, both right and left vertebral arteries run 22 mm from the foramen transversarium and enter into the cranial cavity. The average size of the vertebral artery at both the exit from foramen and the entrance into the cavity is 4 mm for both sides.
10. In nearly 20 % of the cases are found that the sulcus arteriae vertebralis forms a canal by ossification from facies articularis superior to posterior arc or the groove is partly covered by the ossified process. Since the average age is young, these are hardly be thought as senile phenomenon. Measurements have indicated that the outside breadth is in the average 59.6 mm and the size is about 6 mm at the exit for both sides.

From these results described above it is clear that TAKAHASHI's method for contrastmedia injection into vertebral artery is not so easy as he described. since the vertebral artery runs outer side of carotid artery in less than 50 % of the cases on both sides and the M-type is very few on the left side. Since the entrance of the artery into the foramen transversarium of sixth cervical vertebra is 90 % for both sides, the injection appears likely to be successful in the SANO's method, if done right below the foramen transversarium. With regard to the method of injection at the atlas region, chances of encountering interferences to the puncture seem to be less, and hence the

likelihood of success appears to be high. However, it is quite another problem whether the puncture, injection and photographing in living men can be carried out readily or not by this than the SANO-and TAKAHASHI methods. The latter two methods would have higher chances of success, should these be used with the understanding of the results obtained and described above by the present author.

Department of Anatomy, Juntendo University, School of Medicine.

Phot. 1

Phot. 2. (a)

(b)

Phot. 3. (a)

(b)

Phot. 4. (a)

(b)

Fig. 5 : Various types of the relations between Arteria carotis and vertebralis.

1	Sp. No. 12,	Male, 24 years old	5	Sp. No. 55,	Male, 43 years old	9	Sp. No. 72,	Female	?
2	Sp. No. 28,	Female, 65 "	6	Sp. No. 58,	Male, 77 "	10	Sp. No. 73,	Male,	?
3	Sp. No. 42,	Male, 55 "	7	Sp. No. 60,	Male, 43 "	11	Sp. No. 77,	Female, 60 years old	
4	Sp. No. 54,	Female, 24 "	8	Sp. No. 67,	Female	12	Sp. No. 85,	Female. 85 "	"

Fig. 4 : Various types of Arteria vertebralis

1	Sp. No. 121,	Male, 66 years old
2	Sp. No. 7,	Male, 22 "
3	Sp. No. 43,	Male, 37 "
4	Sp. No. 33,	Male, 65 "
5	Sp. No. 9,	Male, 21 "
6	Sp. No. 31,	Male, 57 "
7	Sp. No. 44,	Male, 63 "
8	Sp. No. 45,	Male, 59 "
9	Sp. No. 27,	Male, 93 "
10	Sp. No. 128,	Female, 83 "
11	Sp. No. 132.	Male, 45 "

Fig. 6 : Various courses of Arteria vertebralis

1	Sp. No. 4,	Male, 50 years old
2	Sp. No. 2,	Female, 70 "
3	Sp. No. 6,	Male, ?
4	Sp. No. 38,	Male, 50 "
5	Sp. No. 39,	Female, 62 "
6	Sp. No. 46,	Female, 69 "
7	Sp. No. 123,	Female, 72 "
8	Sp. No. 124,	Male, 79 "
9	Sp. No. 131,	Female, 73 "
10	Sp. No. 133,	Female, 67 "
11	Sp. No. 135,	Male, 71 "

Fig. 7 : Abnormal bendings and windings of the vertebral, carotid and subclavian arteries.

1. Sp. No. 104,	Male, 62 years old	4. Sp. No. 96,	Male, 70 years old
2. Sp. No. 105,	Female, 68 "	5. Sp. No. 110,	Female, 79 "
3. Sp. No. 88,	Female, 69 "	6. Sp. No. 47,	Male, 73 "