「順天堂医学」52巻1号（2006年）2-10ページに掲載された、「田中亮太：神経幹細胞を用いた脳梗塞治療の可能性」について以下のように公告いたします。

1. 海外の共同研究者から、未発表の図表を含む論文を共同研究者の承諾なしに単著として発表した、という指摘があり、著者もこれを認め論文の取り下げを了解した。
2. したがって、遡って掲載を取り消すこととし、インターネット上の検索システムからの削除作業を行い、手続きを終了した。
3. それにともない、読者諸氏には印刷版から上記論文の削除をお願いいたします。

We hereby notify, in relation to “Ryota Tanaka: The therapeutic potential for cerebral infarction using neural stem cells” published in Juntendo Medical Journal, Vol.52, No. 1 (2006), pp. 2-10, as follows:

1. A foreign researcher has claimed that the author published the researcher's paper containing unpublished diagrams and figures as the author's own article without obtaining prior consent from him. The author accepted the claim and agreed to withdraw the article.
2. Therefore, we have decided to suspend the publication of the article, and deleted files containing it in the retrieval system on the Internet.
3. We would like to ask readers to delete the article mentioned above from the printed versions of Juntendo Medical Journal.

神経幹細胞を用いた脳梗塞治療の可能性*^{*}

田中 亮太^{*}

RYOTA TANAKA

成体の中枢神経組織には、ニューロン、グリアを新たに生み出す能力を持った神経幹細胞 (neural stem cells (NSCs)) の存在が近年の研究で明らかにされている。この神経幹細胞を利用した中枢神経系の再生医療が注目され、脳梗塞、頭部外傷、脊髄損傷など克服困難とされてきた中枢神経系疾患への新たな治療法として期待が寄せられている。今回われわれは、内在性神経幹細胞を利用した脳梗塞の治療の可能性について、ラットの局所脳梗塞モデルを用い検討した。脳梗塞後4日目より、神経幹細胞増殖因子であるプロラクチン (PRL)、神経細胞分化誘導因子であるエリスロポイエチン (EPO) をそれぞれ1週間ずつ脳室内に注入し、最長45日まで観察・検討を行った。運動機能テストではPRL+EPO群ではコントロール群に比し脳梗塞6週間後において優位な機能回復を認めた。一方治療群の脳組織ではBrdU/NeuN陽性の新生したニューロンが損傷部位とその周辺に優位に多数認められ、これら再生したニューロンが脳梗塞後の機能回復に関与していると考えられた。今後成人脳においても移植療法と同様に、内在性神経幹細胞を用いた機能回復を目的とした新しい治療法の確立が期待される。

キーワード：脳梗塞、神経幹細胞、再生医療、プロラクチン、エリスロポイエチン

はじめに

脳卒中は血管の閉塞に伴う脳梗塞と血管の破綻に伴う脳出血・くも膜下出血に大別される。近年血圧水準の低下に伴い脳卒中罹患率は減少してきているものの、生活スタイルの欧米化に伴い動脈硬化に伴う脳梗塞の頻度が増し、脳卒中全体としては本邦での死亡原因の第3位を占めている¹⁾。脳梗塞を発症すると高度の運動機能障害、感覚障害、嚥下障害、言語障害など様々な後遺症を残す

ことが多く、慢性期において自立した生活が困難となり、医療経済学の面からも多くの問題点が指摘されている²⁾。本邦における脳梗塞の治療は従来の抗血栓療法や抗凝固療法に加え、超急性期 (発症3時間以内) の血栓溶解療法や急性期の脳保護療法など新しい治療が臨床の場に登場している。しかしこれら新しい治療法にもかかわらず、重度の機能障害を残す脳梗塞患者は依然として多く、機能回復のための新しい治療法の開発が待たれるところである。近年成体中枢神経系のある特定の領域では、神経組織が持続的に新生していることが明らかにされ、そこにはニューロンやグリアの元となる神経幹細胞の存在が確認されている³⁾。これら神経幹細胞を利用した中枢神経系の再生医療が世界中で注目されており、治療への

*順天堂大学医学部神経学講座

Department of Neurology, Juntendo University
School of Medicine, Tokyo, Japan

**第309回順天堂医学会学術集会 [Nov. 19, 2005 開催]
[Jan. 20, 2006 原稿受領]

応用を視野に入れた研究が精力的に行われている。ここではカナダ国カルガリー大学医学部において行った基礎研究のデータに基づき、神経幹細胞を用いた脳梗塞の新しい治療法の可能性について文献の考察を加えながら解説する。

1. 成体脳における神経幹細胞

スペインの神経解剖学者S. Ramon y Cajal以来、神経科学の領域ではヒトを含めた成体哺乳動物の中枢神経組織においてニューロンの新生は起こらず、自己再生能力が欠如していると信じられてきた。しかしながら近年の研究結果から、哺乳動物の成体脳でもある特定の領域では神経組織の新生が続いていることがわかってきた⁴⁾。成体脳におけるニューロンの新生は線条体の側脳室周囲にある脳室下帯subventricular zone (SVZ)と海馬歯状回dentate gyrus (DG)で起こっていることが確認されており、そこにはニューロンやグリアの元となる神経幹細胞neural stem cells (NSCs)・前駆細胞neural progenitor cells

(NPCs)が存在している(図-1)。SVZから新生した細胞はrostral migratory stream (RMS)を移動し、嗅球まで遊走し、そこでinterneuronsに成熟・分化する。遊走した新生ニューロンは機能的にolfactory discrimination等に関与しているとされている⁵⁾⁶⁾。一方海馬歯状回では、subgranular layer (SGL)でニューロンの新生が起こり、顆粒細胞層に移動しながら成熟した顆粒細胞に分化する。このDGで再生したニューロンも記憶などの機能に関与しているとされている⁷⁾⁸⁾。これら神経再生は種々の周囲環境、運動などの負荷、また虚血やけいれんなどの脳に対するストレスなどによって修飾を受けることが分かっており、これら種々の因子が神経再生を誘導し、脳損傷に対してもなんらかの影響を与えていると考えられている⁹⁾¹⁰⁾。このような成体哺乳動物において確認されている神経新生は、ヒトの成体脳でも同様の現象が報告されている¹¹⁾¹²⁾。

図1A

図1B

図-1 retrovirusでラベルした成体脳の神経幹細胞 (NSCs)・前駆細胞 (NPCs)

A: マウスのSVZには多数のラベルされたNSCs, NPCsが存在し、それらは時間経過とともにrostral migratory stream (RMS)に移動し、最終的には嗅球 (OB)に到達し成熟したニューロンに分化する。B: Gerbilのdentate gyrus (DG)にも成熟した顆粒細胞がラベルされ、一過性全脳虚血後ではCA1領域の細胞死が起こる一方で、DGでは神経再生は増強されることが確認されている。

2. 神経幹細胞を用いた脳梗塞の治療

神経再生をターゲットとした脳梗塞の治療は、大きく移植療法と内在性神経幹細胞を利用する方法に分けられる。移植のためのソースとしてヒト胎児脳あるいは成体由来の神経組織、神経幹細胞、ES細胞、骨髄間質細胞などが挙げられ、neural stem cell lineを用いた研究では実際に脳梗塞後のヒトの脳に移植が行われている¹³⁾。一方内在性神経幹細胞を利用した方法では、げっ歯類の脳梗塞モデルを用いた研究が精力的に行われている。Arvidssonらはラットの中大脳動脈の虚血再灌流モデルを用い、脳梗塞後よりSVZの神経幹細胞・前駆細胞が増殖・動員されることを確認している。新生した細胞の一部は梗塞部位に移動し成熟したニューロンに分化することを報告しており、脳梗塞後の成体脳でも神経再生による組織修復が起こっていることが明らかになった¹⁴⁾。一方で、両側頸動脈閉塞による一過性全脳虚血においては海馬歯状回の顆粒細胞の新生が増幅されることが知られている。最近の研究では遅発性神経細胞死で消失した海馬CA1領域の錐体細胞においても、脳室周囲部に存在する神経前駆細胞が移動・動員され、消失した神経細胞に置き換えられることが分かってきた¹⁵⁾。近年これら神経幹細胞の増殖・分化に関わる種々の因子が明らかにされてきており、それらのような因子による内在性神経幹細胞・前駆細胞を活性化する脳梗塞後の神経再生の治療の検討も多く報告されている。Nakatomiらはラットの一過性全脳虚血モデルを用い、虚血後よりEGF、FGF-2を脳室内に注入し側脳室周囲部の神経幹細胞・前駆細胞を活性化し失われたCA1領域神経細胞のreplacementに成功した。行動学検査でも優位な機能回復が認められ、新しい治療法の可能性を報告している¹⁶⁾。

3. プロラクチン、エリスロポイエチンを用いた脳梗塞治療の可能性

Shingoらはマウスを用いた検討で、妊娠中ではプロラクチンの分泌亢進に伴い、SVZの神経新生が増幅され、嗅球で新しいニューロンが増えることを報告した¹⁷⁾。この報告のなかで彼らは脳

室内、あるいは皮下にプロラクチンを注入することによって、同様に神経新生を増幅できることを確認し、プロラクチンがSVZにおける神経幹細胞・前駆細胞の増殖因子として働くことを示した。また、赤芽球系の増殖因子であるエリスロポイエチンが神経幹細胞に作用し神経分化誘導因子として機能することが報告されている¹⁸⁾。このような知見に基づき、今回われわれはこれらプロラクチン、エリスロポイエチンが脳梗塞後の神経新生を誘導し、運動機能の回復に対して有効であるかについて、ラットの局所脳梗塞モデルを用いて検討を行った。

方 法

1) 手術

雄性ラット (Long Evans Rats; Charles-River) 200-250gを用い、ラットのpial stripping modelを作成¹⁹⁾。Pentobarbital (60mg/kg)を腹腔内注射し、麻酔後頭蓋をステレオ装置に固定。予め行った行動学テストにて確認した利き手と反対側に梗塞巣を作成した。Bregmaより前後に±3.0mm、横に1.0~4.0mm領域の頭蓋を取り除き、顕微鏡下に硬膜を丁寧に剥離し、滅菌生理食塩水に浸した綿棒で表層の血管を除去した。出血がないことを確認し、同部位を縫合した。術中の体温は直腸温で $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ で維持し、覚醒するまでheating pad上で呼吸状態などを観察した。術後4日目に同様の麻酔条件下で、障害側と反対側にBregmaから後方0.4mm、側方1.5mm、骨表面から深さ4.2mmの位置にカニューラを挿入し、脳室内に留置。後日カニューラに浸透圧ポンプ (Alzet 2001; Alza Corporation, Palo Alto, CA)を接続した。ポンプはvehicle (0.9% saline containing 1mg/ml rat serum albumin; Sigma), prolactin (rat recombinant, National Hormone & Peptide Program, Torrance, CA 264 $\mu\text{g/ml}$), Erythropoietin (EPO; human recombinant 10,000IU/ml)を各々満たしたものを準備した。control (vehicle+vehicle), PRL+EPO,

PRL+vehicle, EPO+vehicleの4つのグループに分け、各ポンプ1週間ずつトータル2週間それぞれ投与した。新生細胞のマーキングのため、BrdU (Sigma; 120mg/kg) を第一ポンプ注入完了直後に2時間置きに計6回腹腔内注射した。

2) 行動学テスト

運動機能の評価としてCylinder test²⁰⁾, Single pellet reaching test²¹⁾を用いた。Single pellet reaching testは脳梗塞を作成する前に食事制限とreaching and graspの訓練を約2週間行い、成功率が55%を超えるものを使用した。行動学テストはビデオカメラで撮影し、後日コンピュータ上で解析した。脳梗塞作成後各週それぞれ1回行い、6週間後まで観察した。

3) BrdU染色

脳梗塞未作成のラットにPRL (rat recombinant 264 μ g/ml) を脳室内1週間注入し、その直後にBrdU (Sigma; 50mg/kg) を2時間おきに計6回腹腔内注射し、その後ラットを灌流固定し脳を取り出した。Rat anti-BrdU (1:150; Sera-Lab, Sussex, UK) にて染色し、SVZでの細胞増殖・新生を定量化した。

4) 免疫染色

脳梗塞45日後にラットの脳を灌流固定し、免疫染色を行った。Rat anti-BrdU (1:150; Sera-Lab, Sussex, UK), goat anti-doublecortin (DCX 1:200, Santa Cruse), mouse anti-neuronal nuclei (NeuN 1:100, Chemicon) を用い、それぞれ2重染色を行った。梗塞巣あるいは、その周辺部におけるBrdU, BrdU/DCX, BrdU/NeuN陽性細胞について共焦点顕微鏡で観察し、またcell countを行い定量化し比較検討を行った。

5) 統計

統計学的優位差についてはOne-way ANOVAを用い、個々の比較はFisher's LSD, Turkey's HSDで解析した。

結 果

1) 成体ラット脳におけるrat PRL注入

まずラットの脳でマウス同様PRLの脳室内投与によるSVZの新生細胞の増幅効果を確認した。PRL投与群ではVehicle群に比較し、SVZ領域の

図2A

図2B

図-2 PRL投与後のSVZにおけるBrdU陽性細胞

A; SVZのBrdU陽性細胞はコントロール群に比しPRL投与群にて明らかに多くとめられる。B; 定量化し検討したが、PRL投与群では優位にBrdU陽性細胞が確認できた。

BrdU陽性細胞が多く見られ（図-2A），cell countデータでもPRL投与群では優位にBrdU陽性細胞が多く認められた（図-2B）。このことから，rat PRLもマウス同様にSVZの神経再生を増加させることが確認できた。

2) PRL+EPO投与による梗塞領域の神経再生・修復

はじめに，梗塞あるいはその周辺領域でのBrdU陽性細胞を解析した。BrdU陽性細胞はPRL+EPO群だけでなく，PRL，EPO単独投与群

表-1 梗塞領域でのBrdU，BrdU/DCX，BrdU/NeuN陽性細胞のcell count

	Number of BrdU+ cells	% of Dcx+ cells	% of NeuN+ cells
VEH	285.4±27.7	1.6±0.53	2.1±0.29 (n=7)
PRL	386.7±54.1	3.4±0.75*	3.4±0.76 (n=6)
EPO	329.0±40.8	1.9±0.29	4.2±0.62 (n=6)
PRL+EPO	407.0±61.6	2.4±0.48	6.1±1.1* (n=8)

図-3 DCX陽性細胞の梗塞巣への動員・移動

コントロール群ではSVZ付近のDCX陽性細胞が一部梗塞巣に向けて移動しているが（A，B），PRL+EPO投与群では多数のDCX陽性細胞が梗塞巣周辺に認められる（C，D）。それらはBrdUとの2重染色でも同様に認められる。

においてもコントロール群に比し多く認められた。しかし明らかな優位差は認められなかった（表-1）。次にimmature migrating neuronのマーカーであるDCXについて検討した。コントロール群ではDCX陽性細胞は梗塞巣と同側のSVZに認められ，その一部は梗塞巣にmigrationしていた（図-3A，B）。一方でPRL+EPO投与群，PRL，EPO単独投与群ではDCX陽性細胞が梗塞周囲部で多数認められ，それらは同側のSVZから障害側に向かって移動しているように見られ，一部は梗塞巣内に進入していた（図-3C，D）。BrdU/DCX陽性細胞の数はコントロール群に比べ，PRL+EPO群，PRL，EPO単独群いずれも増加していたが，PRL群においてのみ優位差が認められた（表-1）。最後に新生したニューロンについて成熟神経細胞のマーカーであるNeuNとBrdUの2重染色を行って検討した。コントロール群でBrdU/NeuN陽性細胞はほとんど認められなかったが（図-4），PRL+EPO投与群ではNeuN陽性細胞が梗塞巣の周囲部で認められ，BrdU/NeuN陽性細胞も多数確認できた（図-4）。cell countのデータではPRL+EPO投与群においてコントロール群に比し，優位にBrdU/NeuN陽性細胞が確認できたが，PRL，EPO単独投与群では優位な増加は認められなかった（表-1）。

図-4 梗塞巣におけるBrdU/NeuN陽性細胞

コントロール群では梗塞巣周辺でNeuN陽性細胞はほとんど認められないが，PRL+EPO投与群では多数のBrdU/NeuN陽性細胞が見られ，梗塞巣における新生ニューロンの成熟化が確認できた。

3) PRL+EPO 投与による脳梗塞後の機能回復 Cylinder test (図-5)

このテストはプラスチックで出来た透明の円筒の中にラットを入れると、ラットは上方の空間を探索するために両足で立ち上がり、何度も両手で円筒の壁をタッチし体を支えるという習性を利用したものである。一回のテストはそれぞれ4分間行う。脳梗塞前では全ての群で手の使用は左右共に50%程度であったが、梗塞後は運動機能障害のため、全ての群で梗塞巣と反対側の手の使用が減少した。コントロール群、PRL、EPO 単独投与群においては梗塞後6週後までに自然軽快の傾向を示したが、いずれも優位な改善は認めなかった。一方PRL+EPO 群では梗塞後3週より障害を受けた手の使用の改善が認められ、コントロール群に比し優位差を示した。この機能回復は脳梗塞後6週まで持続して認められた。

Single pellet reaching test (図-5)

まず空腹状態のラットをプラスチックの透明の長方形の箱に入れる。この箱に1cm前後のスリッ

トを作成し、その前に置かれた柵にバナナ味のペレットを置く。ラットは利き手を使用しスリットから手を伸ばしペレットを手で握り、口に持っていき食べるという行動をとる。この手を伸ばしてペレットを正確に食べるという一連の行動の成功率を比較検討する。実際のテストの前に約2週間程度の訓練が必要で、各々のテストはビデオカメラで撮影し、一回のテストは20ペレット分行う。後日コンピュータ上で詳細に解析する。梗塞前では全ての群で同程度の成功率が認められた。梗塞後では全ての群で10~20%程度の成功率に低下した。全ての群である程度の自然回復の傾向が認められたが、PRL+EPO 群では梗塞後6週間後までにコントロール群に比し優位な機能回復が認められた。

考 察

Arvidsson らが成体げっ歯類の脳梗塞後の神経再生・修復が起こっていることを報告して以来、多くの研究者が神経新生による脳梗塞の機能回復を目指した研究を精力的に行っている。今回われわれはラットの局所脳梗塞モデルを用い、内在性神経幹細胞を利用した脳梗塞後の機能回復について検討した。PRL+EPO の脳室内注入によって、脳梗塞6週間後ではSVZから移動してきたと思われる新生した成熟ニューロンが多数梗塞周辺領域で認められ、さらに運動機能の回復を伴っていた。PRLはげっ歯類のSVZでの神経新生を増幅するだけでなく、血管新生を誘導する因子であるとの報告もある²²⁾。またEPOは神経保護作用や血管増殖因子として働く一方、SVZの神経新生のかかわり、神経細胞の分化誘導因子として作用することが報告されている¹⁸⁾。われわれの結果では、PRLあるいはEPO 単独投与でも梗塞巣やその周辺部に新しいニューロンの新生を誘導することができたが、運動機能の回復を得るまでは至らなかった。単独投与群では成熟したニューロンの新生を十分に誘導することができなかったためと推測される。その意味で機能回復を目的とした場合には、PRL

図-5 行動学テスト

Cylinder test, Single pellet reaching test共にPRL+EPO 投与群のみ6週後の機能回復が認められた。

によるSVZの新生細胞の増幅、EPOでのニューロンへの分化誘導両者の関与が必要と考えられた。今回の検討では、PRL、EPOの血管新生作用について、あるいは再生したニューロンが新しいネットワークを形成し機能しているか等の検討は行っておらず、今後さらなる詳細な確認が必要と考えられる。また実際の臨床適応を考えると、これらPRL、EPO等の因子が脳室内投与ではなく、全身投与にて同様の効果が得られるかも重要な問題である。これら解明されるべきいくつかの問題点があるものの、PRL+EPO投与が脳梗塞後の機能回復を目的とした新しい治療法となる可能性を示唆する興味深い結果と思われる。

4. 将来の新しい治療法の確立について

現在神経幹細胞を用いた脳梗塞における機能回復の治療の一つとして移植療法が検討されている。移植のためのソースとしてヒト胎児脳あるいは成体由来の神経組織、ES細胞、骨髄間質細胞などがあげられ盛んに研究されている。しかしながら移植細胞の確保や拒絶反応、腫瘍形成などの問題点が多く、臨床応用としては時期尚早の感は拭えない。一方われわれが示したように内在性神経幹細胞を利用した治療法については、多くの研究者が臨床応用を目指した研究を行っており、われわれの報告しているPRL+EPO以外にも、EPO単独投与²³⁾、VEGF (vascular endothelial growth factor) 投与²⁴⁾、骨髄増殖因子であるG-CSFの投与²⁵⁾が梗塞領域での神経再生を誘導し、脳梗塞後の機能回復に効果のあることが報告されている。特にすでに臨床で使用されている薬剤等においては、近い将来臨床応用の可能性が考えられ、今後の研究結果を注視していきたい。

謝 辞

今回私の留学・研究においてご指導・ご協力いただいた脳神経内科水野 美邦教授をはじめ、医局の望月 秀樹助教授、卜部 貴夫講師の諸先生方に厚く感謝の意を表します。また神経幹細胞研究について留学中格別のご指導いただいたSamuel

Weiss教授 (Calgary 大学医学部教授) に深謝いたします。

文 献

- 1) 厚生統計協会：衛生の主要指標。国民衛生の動向・厚生指標 (臨時増刊), 2005; **52**: 43~48.
- 2) 松本 昌泰：脳卒中治療の戦略的展開——医療経済学的視点からの考察——, 神経進歩, 2001; **45**: 399~409.
- 3) Reynolds BA, Weiss S: Generation of neurons and astrocytes from isolated cells of the adult mammalian central nervous system. *Science*, 1992; **255**: 1707~1710.
- 4) Gage FH: Mammalian neural stem cells. *Science*, 2000; **287**: 1433~1438.
- 5) Luskin MB: Restricted proliferation and migration of postnatally generated neurons derived from the forebrain subventricular zone. *Neuron*, 1993; **11**: 173~189.
- 6) Enwere E, Shingo T, Gregg C, *et al*: Aging results in reduced epidermal growth factor receptor signaling, diminished olfactory neurogenesis, and deficits in fine olfactory discrimination. *J Neurosci*, 2004; **24**: 8354~8365.
- 7) Kuhn HG, Dickinson-Anson H, Gage FH: Neurogenesis in the dentate gyrus of the adult rat: age-related decrease of neuronal progenitor proliferation. *J Neurosci*, 1996; **16**: 2027~2033.
- 8) Shors T, Miesegaes G, Beylin A, *et al*: Neurogenesis in the adult is involved in the formation of trace memories. *Nature*, 2001; **410**: 372~376.
- 9) Jin K, Minami M, Lan JQ, *et al*: Neurogenesis in dentate and subgranular zone and rostral subventricular zone after focal cerebral ischemia in the rat. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2001; **98**: 4710~4715.
- 10) Tanaka R, Yamashiro K, Mochizuki H, *et al*: Neurogenesis after transient global ischemia in the adult hippocampus visualized by improved

- retroviral vector. *Stroke*, 2004; **35**: 1454 ~ 1459.
- 11) Sanai N, Tramontin AD, Quinones-Hinojosa A, *et al*: Unique astrocyte ribbon in adult human brain contains neural stem cells but lacks chain migration. *Nature*, 2004; **427**: 740 ~ 744.
- 12) Eriksson PS, Perfilieva E, Bjork-Eriksson T, *et al*: Neurogenesis in the adult human hippocampus. *Nat Med*, 1998; **4**: 1313 ~ 1317.
- 13) Nelson PT, Kondziolka D, Wechsler L, *et al*: Clonal human (hNT) neuron grafts for stroke therapy: neuropathology in a patient 27 months after implantation. *Am J Pathol*, 2002; **160**: 1201 ~ 1206.
- 14) Arvidsson A, Collin T, Kirik D, *et al*: Neural replacement from endogenous precursors in the adult brain after stroke. *Nat Med*, 2002; **8**: 963 ~ 970.
- 15) Bendel O, Bueters T, von Euler M, *et al*: Reappearance of hippocampal CA1 neurons after ischemia is associated with recovery of learning and memory. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2005; **25**: 1586 ~ 1595.
- 16) Nakatomi H, Kuriu T, Okabe S, *et al*: Regeneration of hippocampal pyramidal neurons after ischemic brain injury by recruitment of endogenous neural progenitors. *Cell*, 2002; **110**: 429 ~ 441.
- 17) Shingo T, Gregg C, Enwere E, *et al*: Pregnancy stimulated neurogenesis in the adult female forebrain mediated by prolactin. *Science*, 2003; **299**: 117 ~ 120.
- 18) Shingo T, Sorokan ST, Shimazaki T, *et al*: Erythropoietin regulates the *in vitro* and *in vivo* production of neuronal progenitors by mammalian forebrain neural stem cells. *J Neurosci*, 2001; **21**: 9733 ~ 9743.
- 19) Farr TD, Whishaw IQ: Quantitative and qualitative impairments in skilled reaching in the mouse (*Mus musculus*) after focal motor cortex stroke. *Stroke*, 2002; **33**: 1869 ~ 1875.
- 20) Gonzalez CLR, Kolb B: A comparison of different models of stroke on behavior and brain morphology. *Eur J Neurosci*, 2003; **18**: 1950 ~ 1962.
- 21) Biernaskie J, Szymanska A, Windle V, *et al*: Bi-hemispheric contribution to functional motor recovery of the affected forelimb following focal ischemic brain injury in rats. *Eur J Neurosci*, 2005; **21**: 989 ~ 999.
- 22) Corbacho AM, de la Escalera GM, Clapp C: Roles of prolactin and related members of the prolactin/growth hormone/placental lactogen family in angiogenesis. *J Endocrinol*, 2002; **173**: 219 ~ 238.
- 23) Wang L, Zhang Z, Wang Y, *et al*: Treatment of stroke with erythropoietin enhances neurogenesis and angiogenesis and improves neurological function in rats. *Stroke*, 2004; **35**: 1732 ~ 1737.
- 24) Sun Y, Jin K, Xie L, *et al*: VEGF-induced neuroprotection, neurogenesis, and angiogenesis after focal cerebral ischemia. *J Clin Invest*, 2003; **111**: 1843 ~ 1851.
- 23) Schneider A, Kruger C, Steigleder T, *et al*: The hematopoietic factor G-CSF is a neuronal ligand that counteracts programmed cell death and drives neurogenesis. *J Clin Invest*, 2005; **115**: 2083 ~ 2098.

Summary

Activation of endogenous adult neural stem cells to promote functional recovery following stroke

The discovery of multipotential neural stem cells in the adult forebrain has precipitated research into harnessing these endogenous cells to aid in recovery from disease. Numerous studies have looked at changes in neurogenesis, as well as cell migration and differentiation following ischemia. A previous report demonstrated that infusions of prolactin (PRL) result in a significant increase in neural stem cell proliferation in the adult mouse subventricular zone (SVZ). We have also shown that an infusion of erythropoietin (EPO) will enhance the differentiation of new cells to a neuronal phenotype. In this study, we investigated the effect of a sequential intracerebroventricular (ICV) infusion of prolactin, followed 7 days later by erythropoietin, on recovery following primary motor cortex devascularization. We found a significant increase in neural stem cell proliferation in the SVZ with prolactin infusion, as well as a significant increase in differentiation to a neuronal phenotype when prolactin infusion was followed with erythropoietin. Furthermore, we were able to demonstrate forepaw recovery only in those rats receiving both prolactin and erythropoietin. These results support the suggestion that the exogenous administration of growth factors can be used to aid functional recovery through the mobilization of endogenous neural stem cells.

Key words : Ischemic stroke, neural stem cells, regeneration, prolactin, erythropoietin