麻酔の線維素溶解に及ぼす影響

Influence of the Narcosis on Fibrinolysis

田 口 光 一 郎*

Mitsuichiro TAGUCHI

緒 言

線維素溶解については既に古くから Zimmermann (1846), Green¹⁾ (1887) 等が注目して居るが、始めて“Fibrinolysis”なる語を使用したのは Dastre²⁾ (1893) である。其の後幾多の学者によつて研究せられ、報告も多いが、その生理的意義その他は未だ不明の点が少ない。併し線維素溶解（以下線溶と略記）の初期は Selye の所謂警告反応の一種である事は諸学者の一致せる見解である⁴⁾。臨床的には突然の外傷死⁵⁾⁶⁾⁷⁾手術中及び術後⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾麻酔¹²⁾¹³⁾精神的不安¹⁴⁾、過労¹⁵⁾肝障害¹⁶⁾¹⁷⁾、火傷¹⁸⁾、出血性ショック¹⁸⁾、アレルギー性疾患¹⁹⁾、妊娠中毒²⁰⁾²¹⁾²²⁾、アドレナリンやヒスタミン注射後²³⁾²⁴⁾或はチアソクロテン注射後¹⁷⁾に線溶が認められるとされ、Tognon¹⁸⁾ (1946) 等によると線溶の認められる場合の共通の臨床的症狀は Peripheral vascular failure であると云う。

外科的侵襲の線溶に及ぼす影響については Cuthbertsen (1943), Vaughan (1947), Cops (1943), Taylor (1943), Chaurtin & Gjessing (1946), Ehman (1944) 等が報告し、本邦では福田¹⁷⁾ (1951)、渋沢²⁴⁾ (1953) は術中術後の実質性大量出血例に線溶を認めた報告を始め、術中術後出血傾向と線溶の関係が注目せられ、又大量輸血に伴う出血傾向に線溶が論ぜられに至つた。豊田⁴⁾、古島¹⁷⁾、柴崎²⁵⁾、栗島²⁶⁾等の報告がある。

併し麻酔の線溶に及ぼす影響についての研究は僅かに Macfarlane & Beggs¹²⁾ (1946) のモルヒネ、アトロピン注射時及び豊田²⁷⁾の局麻、全麻（マスク）麻酔注射時の報告、研究があるに過ぎず、之等はいづれも簡単なもので麻酔施行前の状態、施行中、施行後等の時間的経過に従つて線溶の出現を検査したものではなく他の種々なる因子もあまり考慮に入れてなかつた。線溶は急速に出現し急速に消失する事があるので時間的に克明に検査を要する。又手術は麻酔を前提として行われる故、麻酔を無視して手術侵襲の線溶に及ぼす影響を論ずるわけにはいかない。生体の輸血の副反応が全麻によつて著しく

抑制される事実は周知の如くであるが、生体の警告反応の一つと見做される線溶が麻酔によつて何等かの影響を受けるであろうか。

私はかゝる観点から、麻酔前、麻酔後、手術中術後等の線溶の現れ方を時を追求し、多少の知見を得たので報告する。

臨床的研究

I 実験方法

1 検査方法及び成績判定

線維素溶解を検査する方法は種々ある⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾が私は臨床的に便利な Macfarlane 法の变法によつた。即ち静脈血を 1/9 量クエン酸ソーダに混じ遠心沈澱して血漿を分離し、これを pH 7.4 の M/10 ヴェロナール緩衝液で pH 7.4 に調整した生理的食塩水で 16 倍、32 倍、64 倍に稀釈し 3.5% 塩化カルシウム溶液 1~2 滴を滴下し 37°C 孵卵器に入れ 1 時間後試験管内容の凝固を確め更に 24 時間放置し、凝固した線維素の溶解の有無を調べた。

成績判定は

64 倍稀釈血漿の凝固が完全に溶解しないもの

.....陰性 (—)

64 倍稀釈血漿の凝固のみ完全に溶解したもの

.....弱陽性 (+)

64 倍、32 倍稀釈血漿の溶解したもの

.....中等度陽性 (++)

64 倍、32 倍、16 倍稀釈血漿ともに溶解したもの

.....強陽性 (+++)

とした。又陽性試験管数を数え、総試験管数との比率を 100 分率であらわし之を陽性試験管率とした²⁹⁾。之は陽性試験管数の増加即ち陽性試験管率の増加は Plasmin 活性度の強い事を推定しうる。

$$\frac{\text{陽性試験管数}}{\text{試験管総数}} \times 100 = \text{陽性試験管率}$$

以上の操作はすべて無菌的に実施した。

2 実験対照並びに採血時間

実験対照は手術患者を各種麻酔に従い実験を行い麻酔群として、無麻酔対照群として線溶の出現を予想される外傷患者等を外来で、又輸血副作用の強かつた入院患者

* 順天堂大学医学部第 1 外科学教室
1960 年 2 月 10 日受付

を選び無麻酔対照群に加えた。採血時間は麻酔群患者に対しては麻酔前、麻酔操作中及び麻酔経過、更に手術侵襲に特に変化ありと予想される皮切時、侵襲最大時、皮膚縫合前後、終了後2時間或は翌日に採血し、無麻酔対照群に於ては外来到着時、或は輸血副作用発現時等適宜状態に応じて採血した。

II 実成績

1 無選択各種手術侵襲時線維素溶解出現

1) 局所麻酔下手術群における線溶

実験対照、病名、手術式は表1の如くである。前投薬はオピアル 1.0cc (2mg) 術前30分に皮注し局麻は1.0%又は0.5%ノボカインを使用した。

表1 局麻群

病名	気管支喘息	肋膜癒着	臀部腫瘍	計
例数	29	1	1	31
術式	腋窩神経圧搾術	ヤコベウス焼灼術	腫瘍剥出術	

実験成績は表2、図1の如く検査例数31例中手術前日又は基礎麻酔前(手術当日)及びオピアル皮注後に各1例の線溶陽性(+)をみたがオピアル皮注による影響は

表2 局麻群線溶成績及び陽性試験管数(率)

検査時	成績	例数	(H)	(+)	(-)	陽性(%)	陽性試験管数(%)
手術前日又は基礎麻酔前		31	0	1	30	1(3.3%)	2(2.1%)
オピアル皮注後		31	0	0	30	1(3.3%)	1(1.0%)
手術中		31	2	1	28	3(9.6%)	8(8.6%)

図1 局麻群線溶出現度及び陽性試験管率

特に認められない。手術中には3例の陽性を認める。之はいづれも術中疼痛を訴えた時期に検査したものであり疼痛の影響によるものと思われる。検査試験管各93本

中陽性試験管数は基礎麻酔前2本オピアル皮注後1本、手術中8本であり手術による影響が僅かに認められる。アレギー疾患に線溶陽性率が高いとの報告¹⁹⁾(畔柳)があるが本群の93%(31例中29例)は気管支喘息の患者であるにもかかわらず、術前、術中共に殆んど線溶を認めなかった。

2) 腰椎麻酔下手術群に於ける線溶

実験対照は表3の如く局麻群に比し疾患及び患者の状態も重く手術侵襲も遙かに大である。基礎麻酔は強パンスコ 0.4cc を術前40分、塩酸エフエドリン 1cc を腰椎麻酔10分前に皮注、腰麻剤としては0.3%ペルカミンS

表3 腰麻群

病名	胃癌	胃潰瘍	胃潰瘍十二指腸腸瘍	腸閉塞	後腹壁膿腫	卵巣嚢腫	直腸癌	胃腸拡張	胆嚢炎	胆石症	胃下垂	計
例数	16	8	4	5	1	1	3	1	1	1	1	42
術式	胃腸切吻合	胃腸切吻合	胃腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	腸切吻合	

表4 腰麻群線溶成績及び陽性試験管数(率)

検査時	成績	例数	(H)	(+)	(-)	線溶陽性率(%)	陽性試験管数(%)
手術前日又は基礎麻酔前		42	0	0	40	2(4.7%)	2(4.6%)
腰麻後		42	0	1	37	5(11.1%)	6(4.7%)
手術中		42	10	7	23	19(44.7%)	46(36.5%)
手術直後		52	16	2	22	20(47.6%)	54(42.8%)

図2 腰麻群線溶陽性率及び陽性試験管率

2.5cc~3cc を $L_1 \sim L_2$, 又は $L_2 \sim L_3$ に使用した。(尙塩酸エフェドリンの線溶への影響については健康医師, 看護婦8名に実験したが線溶は全部陰性であった。)

実験成績は表4, 図2の如く手術前日又は基礎麻酔前の検査では線溶陽性は42例中2例4.7%であり局麻の場合と大差はないが腰麻後は局麻群の手術中成績を上まわる11.1%の陽性率を示す。之は不自然な姿勢で麻酔を施行する事や, 腰麻針刺入時の疼痛, 不安, 恐怖等が関係するものと思われる。術中は線溶陽性例が飛躍的に増加し44.7%に認める。陽性試験管率も局麻群術中8.6%に比し36.5%と約4倍に増加して居り, 且つ強陽性が増加して居る。手術直後は更に術中を上まわり47.6%に増加する。之はルンパールショック, 手術侵襲, 輸血輸液等の影響の外, 腸間膜牽引痛等の外に意識明瞭なるため手術に対する不安恐怖等により自律神経系の興奮失調を招来し(アドレナリン増加)古島¹⁷⁾線溶陽性度を増すものと考えられる。更に術後に少しく増加をみるが之は腰麻がきれるための疼痛によるものか, 他の侵襲其の他によるかは更に研究を要する。陽性試験管数も強陽性(++)が多くなり線溶の増加に比例しプラスミン活性化度の増強を推定しうる。

3) 全身麻酔下手術群に於ける線溶

全身麻酔を 1) エーテル全麻群, 2) 笑気全麻群, 3) サイクロペイン全麻群, 4) 腰麻+全麻(エーテル)群, 5) 人為低血圧麻酔群に分類した。1)のエーテル全麻群はマスク及び挿管によるエーテル全麻であるが予備試験にて円滑に行われた挿管は線溶に何等の影響は認められなかつたので両者を合せて表示した。4)の腰麻+全麻群は先ず腰麻を試みたが奏効せずマスクに依るエーテル全麻にきりかえた例である。

1) エーテル全麻群

エーテル全麻の実験対照は表5の如くである。

上記症例中マスク使用エーテル全麻例に於ては前投薬としてオビアル 1cc, 硫酸アトロピン 1cc (0.5mg) を, 挿管エーテル全麻例に於ては前投薬としてラボナ 3+錠 (150mg), 塩モヒ 1cc (10mg), 硫酸アトロピン 0.8cc (40mg) を皮注し, 挿管時ラボナル 300mg~500mg 及び筋弛緩剤 S.C.C. 2.0cc (40mg) を静注し挿管を行った。麻酔深度はⅢ期1層~Ⅲ期2層を保ち, 術中適時ラボナル及び S.C.C. を追加した。

実験成績は表6, 図3の如くで各検査時の線溶を検討するに, 前投薬前後に於て変化なくエーテル麻酔導入に及んで1例増加して居るに過ぎない即ち線溶及び陽性試験管共に局麻群とは大差はないが, 腰麻群に比して線溶

では41.7%で約6%低く陽性試験管数に於ては36%に比し27%で著明に減少して居る。

表5 エーテル全麻群

病名	肺腫瘍	肺結核	胃癌	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃憩室	直腸癌	乳癌	肝硬変	甲状腺腫	脾腫	胆石	胆炎	脾臓腫	鼠蹊肉腫	計
例数	2	7	8	4	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	36
術式	切除	成形区切	腸瘻胃切	胃切	胃切	胃切	人工肛門	切除	切除	試験開腹	切除	切除	胆嚢切除	胆嚢切除	切除	切除

表6 エーテル全麻群線溶成績及び陽性試験管数(率)

検査時	成績例数	(++)	(+)	(+)	(-)	線溶陽性率(%)	陽性試験管数(率)
手術前日又は前投薬前	36	0	0	1	35	1 (2.7%)	1 (0.9%)
前投薬後	36	0	0	1	35	1 (2.7%)	1 (0.9%)
全麻後術前	36	0	0	2	34	2 (5.4%)	2 (1.8%)
手術中	36	7	1	1	21	15 (41.7%)	30 (27.0%)

図3 エーテル全麻群の線溶陽性率及び陽性試験管率

2) 笑気挿管全麻群

実験対照は表7の如くである。前投薬はラボナ 2錠 (100mg) を後前2時間内に内服塩モヒ 1.0cc (10mg), 硫酸アトロピン 0.5cc (25mg) を1時間前に皮注した。麻酔開始にあたりラボナル 300mg~500mg を静注次いで筋弛緩剤 S.C.C. 2cc (40mg) を静注挿管し笑気に依り閉鎖循環式麻酔を行い麻酔は比較的浅くⅡ期3層~Ⅲ期1層の麻酔深度を保ち術中適宜ラボナル, S.C.C.

表7 笑気挿管全麻群

病名	胃潰瘍	胃拡張	肺腫瘍	肺結核	直腸癌	乳癌	肝硬変	甲状腺腫	脾臓腫	脾腫	胆石	胆嚢炎	計
例数	6	2	1	1	3	2	4	1	1	1	1	1	25
術式	胃試験開切腹	胃試験開切腹	試験開腹	別除	区切・成形	断人工肛門	切窩廓断	試験開腹	剔出	剔出	剔出	胆嚢剔出	胆嚢剔出

表8 笑気挿管全麻群線溶成績及陽性試験管数(率)

成績	例数	(H)	(+)	(+)	(-)	線溶陽性率(%)	陽性試験管数(%)
前投薬後	25	0	0	0	25	0(0%)	0(0%)
挿管後	25	2	0	1	22	3(12%)	7(9%)
皮切時	25	1	2	1	21	4(16%)	8(10%)
開胸開腹後	25	4	0	5	16	9(36%)	17(22%)
手術中	25	6	3	3	13	12(48%)	27(36%)
手術終了時	25	6	4	2	13	12(48%)	28(37%)
手術終了後	25	4	5	2	14	11(44%)	24(32%)

を投与した。

実験成績は表8, 図4の如く挿管により3例(12%)増加をみたが皮切時には更に1例増加となり開胸開腹時には9例(36%)には線溶陽性を算するに至つた。術中は更に増加し12例(48%)に達し局麻, 腰麻, ユーテル全麻を上回り手術終了時には同率を維持し, 術後は1例減少して(44%)に低下した。本群は表7の如く胃切除, 肺切除等の大侵襲手術も含まれるので線溶も比較的大となつたものと思われる。但し前投薬後(基礎麻酔後), 挿管時に低いのは前投薬が線溶抑制効果をもたすため

図4 笑気挿管全麻群の線溶陽性率及び陽性試験管率

と思われる。挿管は Vagoragal Reflex を起すと云われ, 又自律神経刺激時にはアドレナリンの分泌により線溶を発現すと云われて居る¹⁷⁾が本実験によれば挿管による影響は認められない。或は前投薬の抑制効果に依るものとも考えられる

3) サイクロプロペイン (C_3H_6) 全麻群

肝臓保護に有効である (E.A. Roberstein)³²⁾と云われるサイクロプロペインを使用するにあたり特に肝障害患者を選んで此の麻酔を行つた。前投薬はオピスタン 1cc (35mg), アトロピン 0.5cc (25mg) を術前1時間に皮注し導入は C_3H_6 をマスクで使用し挿管に際して S.C.C. 2cc (40mg) を使用した。実験対照は表9の如くであり肝疾患群として肝機能検査の結果を付記した。

実験成績は全例共に術前術中術後を通じ線溶出現を認められなかつた。

古島¹⁷⁾に依れば肝障害例は線溶出現率が高いと報告されて居るが本実験と比較し興味深いものがある。

表9 サイクロプロペイン全麻群

No.	氏名	性	年齢	病名	手術術式	肝機能						
						モイレン グラハト	B.S.P. 45	高田反応	Hrd. B	コバルト	テモール 濁	尿ウロ
1	安○万○郎	♂	54	胆道癌	試験開腹	70	20%	(-)	dir (H) ind (H)	R ₄	1.35	(+)
2	○尾○義	♂	54	脾臓癌	剔除	130	30%	(-)	dir (H) ind (H)	R _{4(s)}	0.5	(正)
3	松○豊○郎	♂	66	胆石症	胆嚢剔除	75	40%	(-)	dir (H) ind (H)	R _{5(s)}	2.3	(正)
4	○田○也	♂	62	胆石症	胆嚢剔除	45	20%	(-)	dir (+) ind (H)		2.5	(正)
5	加○建○	♂	14	胆嚢炎	胆嚢剔除	12	30%	(-)	dir (H) ind (H)	R _{4(s)}	1.75	(+)
6	○井○ね	♀	65	胆道癌	試験開腹	80	40%	(-)	dir (-) ind (H)		4	(+)

表 10 腰麻+全麻追加群

病名	胃癌	胃潰瘍	胃下垂	十二指腸腸	胆石症	直腸癌	計
例数	5	1	1	1	1	2	11
術式	胃切	胃切	胃切	胃切	胆嚢切除	人工肛門	

4) 腰麻+全麻追加群

本項の麻酔は予め腰麻，全麻を同時に併用したのではなく腰麻無効例又は手術時間延長のため麻酔がきれ苦痛を訴えたものに全麻を追加したものである。其の麻酔経過は強パンスコ 0.4cc を術前1時間前にエフエドリン 1cc を腰麻 10 分前に皮注 0.3% ペルカミン S 2.5cc~3cc を L₂~L₃ 或は L₁~L₂ に注入した。全麻はマスク或は挿管によるもので麻酔剤はエーテルを使用した。尚全麻導入にはラボナル 300mg~500mg を使用した。

実験成績は表 11，図 5 の如くで腰麻後の成績は前述腰麻群の成績と一致するが本群の全麻追加後成績は前述エーテル全麻群をはるかに上回る陽性率を示し，手術中成績は前述腰麻群より減少しておりエーテル全麻群より増加して居る。之は腰麻は全麻より線溶出現に大なる影響があり腰麻下手術で一度出現した線溶は全麻をかけても急速には消失しない事を意味するものと思われる。

表 11 腰麻+全麻追加群線溶成績及び陽性試験管数 (率)

検査時	成績	例数	(+++)	(++)	(+)	(-)	線溶陽性 (%)	陽性試験管数 (%)
前投薬前		16	0	0	1	15	1 (6.2%)	1 (2.0%)
腰麻後		16	0	0	2	14	2 (12.5%)	2 (4.0%)
ラボナル エーテル全麻	後	16	1	1	0	14	2 (12.5%)	5 (10.0%)
手術中		16	4	2	1	9	7 (43.7%)	17 (35.0%)

5) 人為低血圧麻酔群

実験対照は表 12 の如くである。基礎麻酔及び導入，挿管，麻酔維持は前述笑気全麻群と同様であるが，皮切前にヘキサメソニウム (メトプロミン) 25mg~50mg を静注し逆トレンデンブルグの体位を維持し最高血圧を

図 5 腰麻+全麻追加群線溶陽性率及び陽性試験率

表 12 人為低血圧麻酔群

No.	氏名	年齢	性	病名	手術々式
1	○重○一	22	♂	肺結核	右上葉区切
2	李文○	31	♂	肺結核	左上葉区切
3	○本涼	41	♂	肺結核	右上葉区切
4	立○毅	18	♂	肺結核	左上葉区切
5	○井繁	20	♂	肺結核	右上葉区切
6	吉○稔	18	♂	肺結核	左上葉区切

表 13 人為低血圧麻酔群の線溶成績及び陽性試験管数 (率)

検査時	成績	例数	(+++)	(++)	(+)	(-)	線溶陽性 (%)	陽性試験管数 (%)
挿管後		6	0	0	0	6	0 (0%)	0 (0%)
皮切時		6	0	0	0	6	0 (0%)	0 (0%)
開胸時		6	5	0	0	1	5 (83%)	15 (83%)
手術中		6	2	1	0	3	3 (50%)	8 (44%)
終了時		6	1	0	1	4	2 (33%)	4 (22%)

80mmHg に保った。

実験成績は表 13，図 6 の如くである。挿管後より手術終了時迄順を追って検査したが低圧麻酔に於て他の麻酔の場合と著しく異つた成績を認めた。即ち挿管皮切には 0% なるに反し開胸時には一躍 5 例，83% と上昇し而も全部強陽性である。即ちプラスミン活性度を推定される陽性試験管率も又線溶と同様 83% に上昇し強陽性を示して居る。之は手術の侵襲と云うよりも人為低血圧麻酔そのもの及び開胸と云う非生理的操作による一時的影響と考えられる術中は 50% で他全麻群より稍々多いが，更に手術終了時には 33% に下降して笑気全麻群より少ない。

図6 人為低血圧麻酔群線溶陽性率及び陽性試験管率

2 無選択群線溶成績の検討並に小括

無選択に検査した手術前日及び前投薬前、麻酔後、術中、術後について線維素溶解を検討してみた。

1) 前日又は基礎麻酔（前投薬）前の線溶

表14の如く強陽性(++)は1例もなく中等度陽性(+)1例、陽性(+)4例で検査例数125例中手術前日又は前投薬前に線溶陽性のもの5例平均4.0% (2.7~6.2%)であった。陽性試験管数も125例中6本平均1.5本 (3.5%)で弱陽性である。

即ち手術麻酔の行われない状態に於ても、4.0%に陽性を認める。そのプラスミン活性化の強度は弱陽性であ

表14 前日又は基礎麻酔前の線溶成績及び陽性試験管数 (率)

群	成績	(++)	(+)	(+)	(-)	計	線溶陽性 (%)	陽性試験管数 (%)
局麻		0	1	0	30	31	1 (3.3%)	2 (2.1%)
腰麻		0	0	2	40	42	2 (4.7%)	2 (1.5%)
全麻		0	0	1	35	36	1 (2.7%)	1 (0.9%)
腰+全麻		0	0	1	15	16	1 (6.2%)	1 (2.0%)
計		0	1	4	90	125	5 (平均 4.0%)	6 (平均 3.5%)

図7 手術前日又は基礎麻酔前の線溶陽性及び陽性試験管率

る。各群の陽性比率は局麻の軽症群も腰麻、全麻の重症群も有意の差を認めない。

2) 術前基礎麻酔（前投薬）後の線溶

表15、図8の如く150例中9例 (6.0%)に線溶陽性を認める。之は無処置の前項より2%の増加を認め、又陽性試験管率は8.0%でやはり前項より増加して居る。全麻群がエーテル群2.7%、笑気群が0%で最も少なく、

図8 基礎麻酔後線溶の線溶陽性率及び陽性試験管率

表15 術前基礎麻酔（前投薬）後の線溶成績及び陽性試験管数 (率)

群	前投薬の種類	成績				計	線溶陽性 (%)	陽性試験管数 (%)
		(++)	(+)	(+)	(-)			
局麻	オビアル皮注	0	0	1	30	31	1 (3.3%)	1 (1.0%)
腰麻	パンスコ皮注	0	1	4	37	42	5 (11.1%)	6 (4.7%)
エーテル全麻	ラボナ内服 オビアル皮注 アトロピン	0	0	1	35	36	1 (2.7%)	1 (0.9%)
笑気全麻	ラボナ内服 塩モヒ皮注 アトロピン	0	0	0	25	25	0 (0%)	0 (0%)
腰+全麻	エフエドリン皮注 パンスコ	0	0	2	14	16	2 (12.5%)	2 (4.0%)
計		0	1	8	141	150	9 (平均 6.0%)	10 (平均 8.0%)

腰麻群が11.1%，腰麻＋全麻追加群が12.5%で腰麻群と腰麻＋全麻追加群は大差がない。之は腰麻群と腰麻＋全麻追加群が同じ前投薬の条件の下に検査されて居るからであると思われる。腰麻，腰麻＋全麻追加及び全麻は大体同程度の疾患と考えられるが，その線溶にかなりの差を認めるのは表15の如く各々の前投薬の差によるものと思われる。

3) 麻酔下手術直前の線溶

表16，図9に示す如く最高笑気全麻の10%は挿管時失敗例を含んで居り挿管失敗は線溶に影響する事大であると考えられるが，これは Vago-Vagal Reflex の外に，O₂ 不足，CO₂ 蓄積等に関係がある様に推察される（後述動物実験参照）。

然し此の16.0%は手術前日の4.0%に比し約4倍の率を示すが後述の手術中の線溶に比しそれほどの増加率ではない陽性試験管率は腰麻＋全麻追加群が最高で8.3%を示し次に笑気全麻群，腰麻群，エーテル全麻群，局麻群の順になつて居る。

表16 麻酔下手術直前の線溶成績及び陽性試験管数（率）

群	成績	(H)	(+)	(+)	(-)	計	線溶陽性 (%)	陽性認驗 管数(%)
局 麻	0	0	1	30	31	1 (3.3%)	1 (1.1%)	
腰 麻	0	1	4	37	42	5 (11.1%)	6 (4.4%)	
エーテル 全 麻	0	0	2	34	36	2 (5.5%)	2 (1.8%)	
笑気全 麻	2	0	1	22	25	3 (16.0%)	5 (6.6%)	
腰 + 全 麻	1	1	0	14	16	2 (12.5%)	4 (8.3%)	
計	3	2	8	137	150	13(平均 9.3%)	18(平均 4.4%)

図9 麻酔下手術直前の線溶陽性率及び陽性試験管率

4) 術中侵襲最大時の線溶

表17，図10に示す如く局麻が9.6%で最も少なく術前と大差はない。腰麻，全麻，腰＋全麻はいずれも40

図10 術中侵襲最大時の線溶陽性率及び陽性試験管率

表17 術中手術侵襲最大時の線溶成績及び陽性試験管数（率）

群	成績	(H)	(+)	(+)	(-)	計	線溶陽性 (%)	陽性試験 管数(%)
局 麻	2	1	0	28	31	3 (9.6%)	8 (8.6%)	
腰 麻	10	7	2	23	42	19 (44.7%)	46 (36.5%)	
エーテル 全 麻	70	1	7	21	36	15 (41.7%)	30 (27.5%)	
笑気全麻	6	3	3	12	24	12 (48.0%)	27 (36.0%)	
腰 + 全麻	4	2	1	9	16	7 (43.7%)	17 (35.0%)	
計	29	14	13	93	149	56(平均 37.5%)	128(平均 28.6%)	

% 台で麻酔別としては大差はないが前項各時期に比し極度の増加を認めて居る。笑気全麻は48%で最高を示して居るが之は表17，図10の如く肺切除術，胃全剝術等の大手術が多く含まれて居る為と思われる。陽性試験管率をみると，腰麻，笑気全麻，腰＋全麻の順であるが何れも30% 台で平均28.6%を上まわりエーテル全麻に至り27.5% 低くなり局麻では極度に低い8.6%を示して居る。

5) 手術終了時の線溶

手術終了時の線溶は表18，図11に示す如く笑気全麻は手術中と同率で変化は認められないが，腰麻は多少増加の傾向にある。

線溶陽性率では両者共に増加して居るが特に腰麻が笑気全麻よりわずかに増加が強い。

6) 小括

各種麻酔別の基礎麻酔前，基礎麻酔後，挿管後腰麻後，全麻後，皮切時，術中，術後の線溶陽性率及び陽性試験率の消長を総括図示すると図12，図13の如くであ

表 18 手術終了時の線溶成績及び陽性試験管数(率)

群	成績	(H)	(H)	(+)	(-)	計	線溶陽性率(%)	陽性試験管数(%)
腰 麻		16	2	2	22	42	20 (47.6%)	54 (43.8%)
笑気全麻		6	4	2	13	25	12 (48.0%)	28 (37.3%)
計		22	2	4	35	67	32(平均 47.7%)	28(平均 40.7%)

図 11 手術終了時の線溶陽性率及び陽性試験管率

る。即ち手術前、基礎麻酔後に著変なく麻酔施行、手術直前に増加の傾向が強いが各麻酔間に有意の差はない。併し術中に至って局麻を除き飛躍的に増加し、手術終了時は術中に近い値を示して居る。

図 12 麻酔別線維素溶解の図

3 特定条件下に於ける線溶

無選択手術群に於ては症状、手術侵襲の差異により各種麻酔下手術時の麻酔の線溶に及ぼす影響を正確に把握し得ないので条件を一定にして検査を行った。又前項実験に依り術中に線溶陽性率の極めて高い事を知つたので術中の線溶について更に詳しく麻酔の影響を調べた。

図 13 麻酔別陽性試験管率の図

1) 麻酔別による胃切除術中の線溶

表 19 の如く胃癌 27 例、胃十二指腸潰瘍 16 例その他 2 例、計 45 例に腰麻、エーテル全麻、笑気全麻、腰+全麻にて胃切除術を施行した。

表 19 麻酔別による胃切除群

疾患別	胃癌	胃十二指腸潰瘍	その他	計	備考
麻酔群					
腰 麻	15	8		23	十二指腸穿孔例を含む
エーテル全麻	4	3		7	
笑気全麻	5	3	1	9	
腰全+麻	3	2	1	6	
計	27	16	2	45	

各麻酔別に術中侵襲最大時の線溶をみると、表 20、図 14 の如くである。即ちエーテル全麻例が 28.5% で最も少なく且強陽性 (H) が 1 例も認められないのは注目に値し、エーテル全麻の線溶抑制効果を考えしめる。笑気全麻之に次ぎ、腰麻はエーテル全麻の約 2 倍、腰+全麻は約 3 倍に出現する。この腰+全麻群は腰麻が無効で

表 20 麻酔別胃切除の線溶成績及び陽性試験管数(率)

成績	例数	(H)	(H)	(+)	(-)	線溶陽性率(%)	陽性試験管数(%)
麻酔群							
腰 麻	23	6	1	6	10	13 (56.5%)	26 (37%)
エーテル全麻	7	0	0	2	5	2 (28.5%)	2 (9%)
笑気全麻	9	3	0	0	6	3 (33.0%)	9 (33%)
腰+全麻	6	3	0	1	2	4 (78.8%)	10 (55%)
計	45	12	1	9	23	22(平均 48.8%)	47(平均 34)

図14 麻酔別胃切除線溶陽性率及び陽性試験管率

疼痛を訴えたために全麻を追加せるもの又は腰麻手術中手術時間延長のため腰麻がきれ疼痛を訴えたため全麻を追加せるものであるため当然線溶の出現が多くなる事は理解出来る。換言すれば腰麻で出現した線溶は全麻をかけてもすぐには消失しない事を示すものと思われる。陽性試験管率はやはり腰+全麻が多く55%を示して居りエーテル全麻の9%に比しはるかに高率を示して居る。

2) 同種麻酔下に於ける胃切除術及び肺切除術中の線溶 (異なる手術侵襲)

表21の如くエーテル及び笑気全麻の下に施行した胃癌及び胃潰瘍16例, 肺葉又は肺区域切除を行った14例, 計30例につき手術侵襲最大時に於ける線溶の現れ方を比較してみた。

表21 胃及び肺切除例

手術	麻酔	エーテル全麻例	笑気全麻例	計
胃切除		8	8	16
肺切除		9	5	14
計		17	13	30

成績は表22, 図15の如くである。肺葉(区域)切除術は表21の如くエーテル全麻例が遙かに多いにもかゝらず, 胃切除術の約2倍の線溶出現を認め陽性試験管率も約2.3倍に認める。之は肺切除術の手術侵襲が胃切除術に比しより大なる事によるものと考えられるが,

表22 胃及び肺切除の線溶成績及び陽性試験管(率)

手術	成績	例数	(H)	(+)	(-)	線溶陽性率 (%)	陽性試験管率 (%)
胃切除		16	3	0	2	11 (31.2%)	11 (22.9%)
肺切除		14	8	0	0	8 (57.1%)	24 (57.1%)
計		30	11	0	2	13 (平均 43.3%)	35 (平均 38.8%)

図15 胃及び肺切除の線溶陽性率及び陽性試験管率

出液には極めて強い線維素溶解作用がある」と云うことも関係があるかと考えられる。いずれにしてもエーテル全麻の線維素溶解抑制作用にも限度がある事が視われる。

3) 試験開腹群 (手術侵襲最小群) の線溶

検査対照は表23の如く12例でその大部分が手術不能の重症に属する疾患であつたため試験開腹に終つたものである。

表23 試験開腹群

病名	胃癌	胆道癌	胃潰瘍?	肝硬変	術後癒着	急性胃拡張	計
例数	6	2	1	1	1	1	12

検査成績は表24の如くで12例中陽性は僅か1例で之は胃癌を腰麻で開腹ルンバーにショックを起したものである。他の11例は全例陰性であつた。従つて重症に於ても試験開腹程度の侵襲では麻酔の別なく, 線溶の出現は少ないものと思われる。その成績も一般手術の皮切時の成績に近い。

4 無麻酔対照群

無麻酔対照群として交通事故, 火傷, ガス中毒等で外来に到着後直ちに検査を試み, 又入院患者中輸血副作用の発現した患者を対照として検査を試みた

表 24 麻酔別試験開腹群線溶成績

麻 酔	成 績	例数	(H)	(+)	(+)	(-)
腰 麻		3	0	0	1	2
エーテル全麻		2	0	0	0	2
笑気全麻		5	0	0	0	5
腰 + 全麻		1	0	0	0	1
サイクロプロ ペイン全麻		1	0	0	0	1
計		12	0	0	1	11

1) 外傷患者の線溶 (無麻酔侵襲最大群)

検査例数は表 25 の如く 6 例でその成績は 6 例中 5 例 (83.3%) に線溶の出現を認める。外傷即ち無麻酔侵襲最大群は麻酔下手術群の如何なる場合よりも線維素溶解の出現が高度であり陽性試験管率も極めて高い。なおガス中毒の意識濁濁せる 1 例に中等度陽性を認めたのは興味あることと思われる。酸素不足、炭酸ガス蓄積によるものか (後述動物実験) と思われる。

表 25 外傷患者の線溶成績及び陽性試験管数 (率)

No.	病 名	受傷後検査までの 時間	線 溶	陽性試験 管	備 考
1	顔面打撲傷	12時間	(H)	3	
2	上肢、胸部 打 撲 傷	1 時間	(-)	0	
3	左鎖骨々折	30分	(H)	3	
4	顔 面 火 傷 (Ⅲ)	30分	(+)	2	24時間後(-) 48時間後(-)
5	顔 面 火 傷 (Ⅱ)	30分	(H)	3	24時間後(H) 48時間後(-)
6	ガ ス 中 毒	?	(+)	2	意識濁濁
計			5 (83.3%)	13 (72%)	

2) 輸血副作用発現群の線溶

手術中以外の無麻酔時に於ける輸血中又は輸血直後の副作用発現時に於ける外科疾患患者の線溶を調べた。又輸血副作用時にルチン C を静注すると悪感等が消失するがルチン C 静注後に於ても線溶を検査してみた。

実験成績は表 26 の如くで輸血終了後に於て 蕁麻疹、悪感等の副作用の現れた際に於ける線溶の発現は著明で 6 例中 5 例 83.3% に陽性を認め副作用発現に抑制的に働くと思われるルチン C 100mg を静注し症状消褪後においても 6 例中 4 例 66.6% に陽性を認め陽性試験管率も 61.1% に認められる。本群は疼痛もなく、又、不安も極めて少ないと思われる。かゝる場合に於ても高率に陽性が示されて居るのは疼痛必ずしも線溶発現の要因ではないと

表 26 輸血副作用発現及びルチン静注後の線溶成績

No.	輸血前	輸血中又は直後	副作用発現に依りルチン静注後	副作用の種類
1	(+)	(+)	(-)	悪 感
2	(+)	(H)	(H)	悪 感
3	(-)	(H)	(H)	蕁麻疹
4	(-)	(+)	(H)	蕁麻疹
5	(-)	(+)	(H)	悪感、蕁麻疹
6	(-)	(-)	(-)	悪 感
陽性	2本(33.3%) 2本(11.1%)	5(83.3%) 7本(83.8%)	4(66.6%) 11本(61.1%)	

云える。

3) 小 括 (無麻酔対照群)

外傷患者は人が経験しうる最大の侵襲を生体に受けた場合であるが、かゝる場合には疼痛も激しく、出血も多く、心理的恐怖感も強く線溶の陽性度の高い事は想像しうるが、実際に測定した成績に於ても 6 例中 5 例 83.3% の高率に陽性を認め、又輸血の副作用は、アレルギー性、血清学的侵襲、その他肝機能障害不適合輸血を生体内に受けた場合等であるが、外傷時と同様 6 例中 5 例 83.3% の高率に之を認め麻酔下手術の如何なる場合よりも高率である事は注目に値する。尙この際ルチン C の静注が線溶にあまり影響を及ぼさないと云う事はすでに発現した輸血副反応に注射した場合、副反応症状は消失するが、線溶は発現する事を意味する所見である。又無麻酔群の線溶は陽性度のみならず陽性試験率の大である事はプラスミン活性化の強い事を意味し幾多の示唆を含み麻酔の効用について興味ある所見である。

動 物 実 験

成犬を用い次の実験を試みた。

- 1) 実験用固定台への緊縛に依る線溶
- 2) 無処置犬群ヒスタミン注射による線溶
- 3) ラボナール静脈麻酔犬群のヒスタミン注射による線溶
- 4) クロールプロマジン C₆ (メトプロミン) 使用による線溶
- 5) Anoxia 犬の線溶

線溶試験方法は臨床例と同様に Macfarlane の変法を使用した。

1) 実験用固定台への緊縛に依る線溶

無処置犬を固定台に緊縛固定する事は犬に相当な苦痛恐怖を与える筈である。人は恐怖心配驚愕等の精神的動揺により自律神経系の失調を来し線溶を出現すると云わ

表 27 固定台緊縛に依る線溶成績

No.	犬 No.	線溶成績	No.	犬 No.	線溶成績
1	3	(-)	9	10	(-)
2	2	(-)	10	11	(-)
3	5	(-)	11	14	(-)
4	4	(-)	12	13	(-)
5	1	(±)	13	15	(-)
6	7	(-)	14	16	(-)
7	8	(-)	15	17	(-)
8	6	(-)	16	12	(-)

れて居る。成犬 16 頭の固定台緊縛に依る線溶成績は表 27 の如くで全例に陽性は認められなかつた。之は人間と犬との差異にもとづくものであろう。豊田⁴⁾も動物(犬)に線溶の出にくい事をのべて居る。

2) 無処置犬ヒスタミン注射による線溶

無処置にて実験台に固定した犬に 0.1% ヒスタミン溶液 1mg/kg を静注しヒスタミンショックを起さしめ之により線溶の出現を検索した。実験成績は表 28 の如くである。即ち陽性は 21 例中 18 例に認め 85.7% であり

表 28 無処置犬ヒスタミン注射による線溶成績

No.	犬 No.	線溶成績	陽性試験管数	No.	犬 No.	線溶成績	陽性試験管数
1	4	(+)	1	14	15	(++)	2
2	3	(+)	1	15	14	(++)	2
3	5	(-)	0	16	13	(++)	2
4	2	(-)	0	17	17	(++)	2
5	6	(+)	2	18	20	(+)	2
6	1	(++)	3	19	19	(-)	0
7	16	(++)	3	20	18	(+)	2
8	7	(++)	3	21	21	(+)	2
9	8	(++)	3	22	22	(+)	2
10	10	溶血	3	計 22 例中不明 1 例、陰性 3 例、陽性 18 例、陽性試験管 38 (85.7%) (60.3%)			
11	9	(+)	1				
12	11	(+)	2				
13	12	(++)	3				

陽性試験管率は 60.3% を示しヒスタミン静注による線溶出現は非常な高率を示して居る。即ち人よりも線溶の出にくい犬に於て 85.7% の線溶陽性率を来たすヒスタミンのプラスミン活性化作用は極めて大なるものがあり線溶発現機序の解明に 1 つの示唆を与えるものと思われる。

3) ラボナール静脈麻酔犬群のヒスタミン静注による線溶

上述ヒスタミン静注による線溶出現がラボナール静脈

麻酔により如何に変化するかを調査した。実験方法とて犬を固定台に緊縛ラボナール 10cc (200mg) を静注したる後 0.1% ヒスタミン溶液の 1mg/kg を投与(静注)しラボナール静注後及びヒスタミン静注後に線溶を検査した。

実験成績は表 29 の如くで 6 例中 ラボナール静注後には全例陰性(-)を示して居るが、ヒスタミン注射後は 3 例に陽性を認める。即ち線溶陽性率は 50% に出現して居るが陽性試験管数(率)は 3 本(16.6%)である。之は前述単独ヒスタミン静注例に比しはるかに低い陽性率でありプラスミン活性化の極めて弱い事を示して居る。換言すればラボナール静脈麻酔は線溶出現に対しかなり抑制的に働くことがわかる。

表 29 ラボナール静脈麻酔犬群のヒスタミン静注による線溶成績

No.	犬 No.	成績		
		Ravonal 後	ヒスタミン静注後	陽性試験管数
1	16	(-)	(-)	0
2	14	(-)	(-)	0
3	11	(-)	(+)	1
4	18	(-)	(+)	1
5	12	(-)	(-)	0
6	10	(-)	(+)	1
計	6	0	3(50%)	3(16.6%)

4) メトプロミン (C₆) 使用による線溶

実験方法は犬を固定台に緊縛し 1.0% ノボカイン局麻にて頸動脈を露出し之にカニューレを挿入し水銀マノメーターに連結して動脈圧を測定したる後線溶(1)を検しメトプロミンを静注し血圧の下降を確め、線溶を検査したる後、ヒスタミン 1mg/kg を静注し線溶(3)を検査、更に血圧上昇過程に於て線溶(4)を検査した。之は図 16 に示す如くである。

検査は表 30 に示す如くであるが、ヒスタミン静注後の線溶、線溶(3)及び線溶(4)は同一成績を示したのでまとめて表にした。

カニューレ挿入及びメトプロミン静注後の血圧の著明なる下降にもかかわらず共に線溶に変化を認めず全例 0% であるがヒスタミン静注により 9 例中 2 例 22.2% に陽性を示し陽性試験管数(率)は 3 本(11.1%)を示す。之は前項の単独ヒスタミン静注実験に比し遙かに低率を示し血圧の急速なる下降にもかかわらず自律神経遮断剤たるメトプロミンが線溶出現をかなり抑制する事を示し

図16 C₆ ヒスタミン静注による血圧下降及び線溶検査時期 (F₁ は線溶検査時期)

表30 C₆ ヒスタミン静注犬群の線溶

No.	犬No.	カニューレ挿入後	メトプロロミ静注後	ヒスタミン静注後
1	23	(-)	(-)	(-)
2	24	(-)	(-)	(+)
3	28	(-)	(-)	(-)
4	26	(-)	(-)	(-)
5	25	(-)	(-)	(+)
6	27	(-)	(-)	(-)
7	29	(-)	(-)	(-)
8	30	(-)	(-)	(-)
9	31	(-)	(-)	(-)
計	9	陽性 0	陽性 0	陽性 2例 (3本) (22.2%) (11.1%)

て居る。

5) Anoxia 犬の線溶

本実験は犬を固定台に緊縛, 1% ノボカイン局麻にて気管切開を行い気管 カニューレを挿入したる後 Oxy-

表31 動物(犬)実験群の線溶成績及び陽性試験管数(率)

No.	群	例数	線溶成績 (%)	陽性試験管数 (%)
1	実験台緊縛固定群	16	0	0
2	ヒスタミン静注群	22	18(85.7%)	38(60.3%)
3	ラボナールヒスタミン静注群	6	3(50.0%)	3(16.6%)
4	C ₆ ヒスタミン静注群	9	2(22.2%)	3(11.1%)
5	アノキシア犬群	5	4(80.0%)	4(26.6%)

図17 Anoxia 犬の血圧下降及び線溶検査時期 (犬No. 38)

meter にて血中酸素飽和度を測定しつつ気管 カニューレ腔を縮小しその経過に従い線溶を検索した此の1例を図示すれば図17の如くである。

実験成績は表32の如くであり気管 カニューレ挿入後及び管腔半閉鎖では殆んど酸素量に変化もなく線溶にも変化を認めず全例陰性を認めたが管を更に閉鎖し酸素量70%を示して来ると5例中3例(60%)に陽性を示し、殆んど管を閉鎖して更に酸素量が低下すると5例中4例(80%)に増加して来る。本実験に於ては Anoxia 或は

表32 Anoxia 犬の線溶成績

No.	犬No.	気管カニューレ挿入後	管半閉鎖	管更に閉鎖	殆んど閉鎖
1	37	(-)	(-)	(+)	(+)
2	38	(-)	(-)	(+)	(+)
3	39	(-)	(-)	(-)	(-)
4	36	(-)	(-)	(+)	(+)
5	40	(-)	(-)	(-)	(+)
計	5	0	0	3(60%) 3本(20%)	4 (60%) 4本(26.6%)

Hypoxia の状態では線溶陽性出現をみる事が証明せられる。

6) 小 括

以上の動物実験から私は次の知見を得た。

1) 動物(犬)の固定台緊縛に依る心理的不安試験では線維素溶解に何の変化も認められない。

2) 無処置犬ヒスタミン静注試験では85.7%に線溶陽性を認めヒスタミンショックは線溶出現に極めて大なる影響を与える。

3) ラボナール静脈麻酔犬へのヒスタミン静注では線溶陽性50%陽性試験管率は16.6%に過ぎない。即ちラボナール静脈麻酔はヒスタミン静注による線維素溶解出現をかなり抑制する。

4) メトプロミン静注後のヒスタミン静注試験ではメトプロミン静注後急速なる血圧下降にもかかわらず線溶は全例陰性であり、ヒスタミン静注に依る線溶は単独ヒスタミン静注による線溶出現に比し遙かに低率を示す。即ち線溶22.2%陽性試験管率11.1%で自律神経遮断剤たるメトプロミンは線溶出現をかなり抑制する。

5) 相当高度のAnoxia或はHypoxiaは線溶出現をみる。

総括並に考按

線維素溶解の生理的意義については未だ不明の点が少ないが生体に侵襲が加わった際に生ずるSelyeの所詮警告反応の一つである事は一般に認められて居る。又手術中及び術後の異常出血の原因の一つに線維素溶解があげられて居り、又血栓症に関係ありとも云われ外科医にとって重要な点が多々ある。

線溶に関する報告はかなり多くいろいろの場合に認められて居るが、著者は主として外科領域に於ける本現象について検索した。即ち本現象が外科手術時に於て発現する事は多数の報告があるが異型又は不適合輸血の副反応が全身麻酔の際にあまり現れない事実に注目し、手術と表裏一体をなす麻酔が線溶に何如なる影響を及ぼすかについて精細に追求し前投薬(基礎麻酔)、バルビツレート静脈麻酔、自律神経遮断剤及びAnoxiaにも及んだ。

麻酔と線溶との関係については2,3の報告があるが、いずれも麻酔類の注射による線溶の現れ方に関するもので局麻、腰麻、全麻類の影響、又それらのもとに於ける各種手術の際の現れ方については報告をみない。

著者の実験成績を総合すると、

手術前日又は当日の前投薬(基礎麻酔)を行う以前の症例125例中に5例の線溶陽性を認め4.1%であり(陽

性試験管数(率)は6本(35%))豊田の報告せる術前の12.5%と多少の開きがあるが術前に於ても既に少数の線溶の出現を認め、且つ後述する他の何れの過程より低率を示す事は一致せる所見である。

前投薬(基礎麻酔)後の線溶陽性は150例中9例6.4%で前投薬前に比しわずかに増加し、陽性試験管率も10本8.0%に増加して居るが特に前投薬に依る影響と考えられる程の有意の差は認められない。Macfarlane & Biggsや豊田の報告は麻酔投与前の3~4倍に増加を示して居り、著者の実験とはかなり相違して居る。之は前投薬の種類、投与方法の相違、進歩等によるものとも考えられるがむしろ心理的不安を除くため前投薬は線溶出現に対して抑制的に作用するものと考えられる。

アレルギー性疾患に於ては線維素溶解の出現率が高いとされ、又岡本³⁹⁾³⁷⁾等は活性化されたプラスミンに依る蛋白分解の中間産物多糖類がアレルギーを引おこす原因であるとのべて居るが、著者は気管支喘息29例の術前検査に於て1例の中等度陽性(++)を認めたに過ぎない。即ち線溶陽性率3.4%、陽性試験管率6.8%で他疾患とは同率を示して居る。之は畔柳、柴田、林¹⁰⁾の報告せる成績と一致して居ないが、喘息発作時に於ける採血ではないので今後の研究に待ち度い。

無選択検査群麻酔下手術直前の成績は笑気全麻が16%で麻酔前に比しやや増加して居るが、他群では増加は僅少で有意の差を認めない笑気全麻のやや高率なのは挿管の失敗例を含む為と考えられる。事実円滑に行われた挿管笑気全麻例に於ては挿管後の線溶に殆んど影響を認めない。局麻に於て低率を示すのは疾患が軽症で然も心理的恐怖等の少ない為であろう。尙局麻を除いてエーテル全麻が最低であるのは注目し得るものでエーテル全麻の線溶抑制作用の大なる事を意味して居る。いづれにしても後述の術中線溶に比し遙かに少なく、従つて麻酔に依る線溶増加はMacfarlane、豊田等の報告と異なり極めて少ないと云い得る。

無選択検査群術中侵襲最大時の線溶は局麻は論外としてその他の麻酔群はいづれも飛躍的に増加し40%をこえる高率を示した。この高度の線溶が如何なる因子によるかを究るために更に麻酔別による影響を胃切除術例について検査した結果エーテル全麻28.5%で最少、笑気全麻33.3%、腰麻56.5%、腰麻+全麻78.8%となつて居る。こゝでも全麻殊に麻酔深度の深いエーテル全麻が低率を示して居る。麻酔深度の稍々浅い笑気全麻が之に次ぎ意識明瞭な腰麻は更に高く、腰麻無効で全麻を追加した群が最高の線溶出現を示して居るのは容易に理解す

る事が出来る。

又同種麻酔下でも手術侵襲の大なる程高率に線溶陽性を示す事は胃切16例、肺切14例の成績に明瞭で肺切に於ては約2倍の増加を示して居る。併し肺、脾、前立腺等の手術時はそれ等の組織中にプラスミン活性化酵素を多く含むため線溶出現率が高い (Macfarlane & Pilling³³⁾, 柴崎²⁵⁾と云う報告もあるが、いづれにしろ著者の試験開腹群の線溶成績は12例中陽性は僅かに1例で之は胃癌を腰麻で開腹、ルンバールショックを起した時のもので他は全例陰性であり、従つて重症で手術不能の状態でも試験開腹程度の小侵襲では麻酔の如何に不拘線溶があまり出現しない事がわかる。即ち手術侵襲の増大は線溶陽性率増加に大なる因子となることを裏書きする。

次に対照として無麻酔にて侵襲大なる場合、即ち外傷群の線溶をみるに実に9例中7例83.3%に陽性で陽性試験管率も72%でプラスミンの活性化が強大である。外傷は大なる疼痛、出血、不安、意識明瞭なる事が相重なつて陽性率高度となるものと考えられるが、意識不明のガス中毒の1例に於ても中等度陽性(++)に出現した事は興味ある1例でAnoxia, Hypercapneaによるものと思われ、著者の犬に於けるAnoxiaの実験で66%の線溶陽性率を認めた事から了解出来る。

疼痛、出血、不安等のない生体侵襲の一つとして術前又は術後の輸血(保存血)副症状のあつた場合に検査した例では6例中5例83.3%に陽性を示し陽性試験管率は66%であつた。之は前記外傷時に近い値を示す。之は麻酔下大量輸血と大手術を施行する際の出現率を遙かに引離す高率でこゝでも麻酔の線溶抑制効果を知る事が出来る。

動物実験に於ては不安、疼痛では陽性を示さないが、ヒスタミン静注により85.7%と云う高率に線溶の出現を示すが、之がラボナール、メトプロミンに依りかなり抑制減少する事は臨床全麻例の成績を裏書きすると共に、自律神経遮断と云う意味で興味深い。

大脳皮質麻酔剤(Pick)と云われたエーテルは最近の報告(山村、卜部)³⁸⁾³⁹⁾によれば視床、視床下、脳幹、脊髄にも作用すると云われ、又ラボナールもエーテルと同様の作用点を有するとの報告(卜部等)³⁹⁾がある。之等を綜合して麻酔殊に全麻の線溶抑制効果の機序について考えると、大脳皮質の麻酔によるのは勿論、自律神経系の中樞と云われる視床、視床下部以下の麻酔が自律神経系の麻酔効果を招来し線溶抑制的に作用するものと推定する事が出来る。

結 論

各種麻酔と手術の線溶に及ぼす影響を時を追つて追求し次の結果を得た。

1) 手術前日又は当日の前投薬(基礎麻酔)前に於ては4%に線溶陽性を認めた。

2) 前投薬(基礎麻酔)及び円滑に行われた挿管は線溶には殆んど影響しない。

3) 麻酔下手術直前に於ては全般に極く軽度の陽性増加を認めるが局麻を除き各麻酔間の差異は認められない。

4) 手術侵襲最大時に於ては局麻を除き飛躍的増加を示し同一手術侵襲に対する麻酔別線溶出現率はエーテル全麻が最小で笑気全麻、腰麻、腰麻+全麻の順に増加して居る。

5) 全麻による胃切除例と肺(区域)切除例の比較では手術侵襲の大なる肺切除例に約2倍に出現する。

6) 無麻酔対照群たる外傷群及び術前術後の輸血副作用発現群に於ては麻酔下手術群より遙かに大で共に83.3%の高率に出現する。

7) 動物実験に於てラボナール麻酔群は非麻酔群に比しヒスタミン静注に依る線溶出現が遙かに少なくラボナールの抑性作用がうかがわれる。

8) 以上の実験により麻酔殊にエーテル全麻は手術侵襲による線溶出現をかなり高度に抑制する事を知つた。

拙筆にあたり御懇篤な御指導御高聞を賜つた恩師福田保教授に深甚な謝意を表し、終始直接御指導下さつた赤沢喜三郎講師に深謝する。

(本論文の要旨は第1,2,3,4,5,6回日本麻酔学会及び第4,5,6,7,8回文部省科学研究費麻酔班協議会に発表した。)

文 献

- 1) Green J.R.: J. Physiol. 8, 372, (1887).
- 2) Dastre A: Arch. d. physiol. norm et path 6, 464, (1894).
- 3) Dastre A: ibid 7, 408, (1895).
- 4) 豊田健一: 外科侵襲並びに自律神経刺激と線維素溶解, 東京医学雑誌, 60, 1, (1952).
- 5) Morawitz, P: Beitrz. Chem. Physiol in Path 8, 1, (1906).
- 6) Yudin, S.S.: Lancet 2, 360, (1936).
- 7) Macfarlane, R.G. & Biggs R.: Lancet 2, 862, (1946).
- 8) Coon W.W.Z. et al: Surg. Gyn. & Obst., 95,

- 717, (1952).
- 9) Scoot, E.W. et al: Surg. Gyn. & Obst. 99: 679, (1954).
 - 10) Hodgkinson, C.P. et al: J. A.M. A. 154, 557, (1954).
 - 11) Phillips L.L. et al: Surg. Gyn. & Obst. 103: 4, 433, (1956).
 - 12) Macfarlane, R.G. & Biggs, R: "Spontaneous" Activity Associated with Surgical Operations, Trauma, & C. Lancet. Dec. 14, 862, (1946.)
 - 13) Macfarlane, R.G.: Lancet 1, 10, (1937).
 - 14) Latner, A.L.: Lancet 1, 194, (1947).
 - 15) Macfarlane, R.G. & Biggs, R.: Lancet 1, 402, (1947).
 - 16) Goodpasture, E.W.: Bull. Johns Hopkins Hosp. 25, 330, (1914).
 - 17) 古島芳男: 線維素溶解の研究, 日本外科学会雑誌 Vol. 56, No. 2.
 - 18) Tognon, H.J. et al: Am. J.M. Sc, 211, 88, (1946).
 - 19) 畔柳武雄, 林圭雄, 柴田整一: 日新医学, 38, 684, 昭和26.
 - 20) Smith, H.P. & Smith, G.V.: Science 102, 253, (1945).
 - 21) Willson, J.R. & Munnell, E.R.: Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 62, 277, (1946).
 - 22) Smith, O.W.: Am. J. Obst. & Gyne., 54: 201, (1947).
 - 23) 豊田健一, 白石勝美, 越川宏一: 体の部分的冷却による不快現象: 日新医学 39 (11), 昭和27.
 - 24) 渋沢喜守雄, 他: 日本外科学会雑誌, 54: 234, (1953).
 - 25) 柴崎 晃: 肺切除に於ける線維素溶解現象を中心とした術後血胸の検討: 日本胸部外科学会雑誌 Vol. 7, No. 1, Jan. (1959).
 - 26) 栗津三郎: 手術及び実験的ショックに依る Plasmin, Plasmin inhibitor, Proplasmin, Activator, Fibrinolysis の変動について, 日本外科学会雑誌 Vol. 59, No. 12, march (1959).
 - 27) 豊田健一: 線維素溶解に関する研究(第1報) 手術に伴う線維素溶解: 臨床外科, Vol. 4, No. 6, 37 (1949).
 - 28) Ungar, G. & Mist, S.H.: J. Exp. Med. 90, 39, 194.
 - 29) Loomis, E.C., George, C.J. & Ryder, A.: Arch Biochem 12, 1, (1947).
 - 30) Lewis, J.H. & Fergusson, J.H.: J. Clin. Invest. 29, 286, (1950).
 - 31) 畔柳武雄: 線維素溶解酵素, 医学書院.
 - 32) E.A. ローベンスタイン: サイクロプロペイン 麻酔: 麻酔, Vol. 4, No. 4, (1955).
 - 33) Macfarlane, R.G. & Pilling, J.: Blood 3: 1167, (1948).
 - 34) Tognon, H.J. et al: J. Clin Invest 28: 814, (1949).
 - 35) Milwidsky, H.: J. Thor. Surg., 29: 604, (1955).
 - 36) 岡本彰裕: 抗原抗体反応をめぐるシンポジウム, (1949). 結核性炎症の成り立ちについてのシンポジウム, (1949).
 - 37) 五島雄一郎: プラスミン及び抗プラスミン物質について, 日本医師会雑誌, Vol. 42, No. 5, (1959).
 - 38) 山村秀夫: 臨床麻酔学, 医歯薬出版.
 - 39) 卜部美代志, 他: 麻酔, Vol. 9, No. 1, (1960).

Summary

The influence of several methods of anaesthesia on the fibrinolysis was observed. Results obtained were summarized as follows: The rate of fibrinolysis was parallel to the degree of the surgical invasion, and in animal experiments, fibrinolysis was inhibited by the administration of rabonal. In human cases Anaesthesia, especially general anesthesia by ether inhibited remarkably the rate of fibrinolysis at the surgical operation.

(Lest Department of Surgery, Juntendo University, School of Medicine.)