音ト微弱ナル第二音ヲ聞ク但前日ニ比スレハ顯著ナリ左乳線下ニ於テ粗糙ニシテ延長ナル第一音ト高調ナル第二音ノ分裂スルヲ認ム右側第二肋間(大動脈瓣膜部)ヲ聽診スルニ微弱ナル短キ音ヲ聞ク(第二音乎)左側ノ第二肋間(即肺動脈瓣膜部)ニ於テハ右ニ比スレハ稍ヤ高調ナル分裂音ヲ聞ク(但シ第二音ハ分裂ス)先キニ本病ヲ以テ心臟性喘息ト爲セシヤ爾來專ラ心力ヲ恢復セシメンヲ策リシニ幸ヒナルカナ今ヤ其力大ニ恢復シ從テ面色ノ蒼白全ク去リ脈搏稍ヤ増力シ心音著シク聽取スルヲ得加之患者ノ自覺スル所ノ症モ大ニ輕快シ步行運動共ニ容易トナリ心悸亢進呼吸困難等ノ障害殆ント消失スルニ至レリ且入院后ハ一回ノ發作ナク夜間安眠ヲ得タリ斯ク患者ハ平時ト異ルヲナキヲ以テ切ニ退院ヲ乞フ玆ニ於テ乎葡萄酒三〇、〇重曹二、〇苦味丁幾二、〇單舍利別四、〇淨水一〇〇、〇一日三回分服ノ處方書ヲ與ヘ退院ヲ許セシニ患者ハ欣然手足ノ措ク處ヲ知ラス千謝萬禮揚々乎トシテ院ヲ辭セリ

(完)

中外醫事新說

○癡鈍性潰瘍トルビテノ新療法

「ドクトル、エフ、スペート」(Dr. F. spaeth)氏報

在京會員

管野 徹 三抄譯

予ノ茲ニ報告スル所ノ癰鈍性潰瘍ノ新療法ハ恩師「ドクトル、ア、ハールホルト」(Dr. A. Harbord)君ノ考案ニ出テ既ニ君カ七年以來病院ニ自家ニ實驗セラレ確著タル効驗ヲ収メ加之六年以前「フランクフルト」醫事協會ニ於テ演述セラレタル法ニシテ其法タル原因療法ノ名義ヲ付スルモ敢テ過言ニアラサルナリ予ハ茲ニ君カ予ノ請ヲ許シ世ニ公ニスルヲ得ルヲ謝シ併セテ江湖諸君ト有益ナル一新法ヲ共ニスルヲ悅フ者ナリ

夫レ癰鈍性潰瘍ハ容易ニ治スヘカラサル難症ニシテ縱令一旦癰痕ヲ結フモ容易ニ崩潰シテ新潰瘍面ヲ造リ經久ニシテ癒サルモノナリ而ノ是等ノ原因ハ一ニシテ足ラスト雖モ其主因トナルヘキ者ハ其組織ノ營養不給ト局部ノ血行不滿ニ在ルヤ明ナリ何トナレハ如斯キ潰瘍ノ緣部ハ主トシテ硬固ナル血管ニ乏シキ結締組織維ヨリ成リ或ハ潰瘍底ハ臃様ノ結締組織ヨリ成リテ組織細胞ノ分裂蕃殖及再生作用ニ必ス障害ヲ與フルモノタレハナリ此結締組織ノ治癒ヲ妨害スヘキ組織ノ肥厚ハ時トシテ潰瘍ノ慢性刺戟ノ爲ニ續發スルヲアリ(殊ニ脉靜怒張症ニ因スル

フロリヘラーチタン

下肢ノ潰瘍ニ於テ然リ或ハ予ノ實驗スヘキ好機會ヲ得タルカ如ク皮膚先ツ壞死
 シ次テ潰瘍ヲ生シ其底面ハ硬ク緊張セル筋膜ノ存スルカ如キヲアリ此場合ニ於
 テハ血管ニ乏シキカ爲ニ充分ナル肉芽ヲ發生スルヲ得(縱令刺戟藥ヲ久時連用
 ザスチシガ)スルモサルノミナラス此際ニハ「オウヘベル」[O. Weber]氏ノ側部切開法及「フホン、スス
 バウム」[V. Nussbaum]氏輪狀周擁切斷法モ無効ニ屬シ「レウヘルゲン」[Reverdin]氏並ニ「チ
 エルシ」[Thiersch]氏ノ植皮法モ徒勞ニ歸スルモノナリ何トナレハ是等ノ療法ハ唯
 潰瘍底ノ營養充分ナル際ノミ適應スルモノダレハナリ
 今茲ニ報スル所ノ一新法ハ短簡ニ記スル時ハ下條ノ如シ即チ初メ全潰瘍面ヲ健
 康組織ニ至ルマテ縱切シ之ニ大約二セシメ「チメーテル」ノ距離アル無數ノ横切ヲ爲
 ス此横切モ亦均シク硬固ナル潰瘍縁ヲ過キ健康組織ニ達スヘシ而シテ此切開ハ決
 シテ淺クシテ皮膚ノミニ止ルヘカラス必ス深ク筋膜ヲモ合セテ切開シ是レ此手
 術ニ於テ貴要ナル事件ナリ各切開片ヲ互ニ哆開セシムヘシ斯ノ如クスルキハ應
 分ノ出血アリト雖モ這ハ「タンボナーデ」ヲ以テ止血スルヲ得ヘシ若シ其部ノ肉
 質ニ富ムカ如キ觀アルキハ沃度「ホルム」[繃帶ヲ貼スヘシ然ルキハ次回ノ繃帶交換
 ニ際シ(八日乃至十四日)全潰瘍ハ盡ク一變セル外觀ヲ呈シ哆開セル切開部ヨリ充

分ニ健康肉芽組織ヲ發生シ久シカラスシテ全潰瘍面ヲ蓋フニ至リ遂ニ周圍ノ皮膚面ト相接シ此レヨリ活潑ナル上皮發生ヲ促スニ至ルモノナリ若シ皮膚欠損部尙ホ未ダ甚タシキハ皮瓣ヲ造リ良性ノ肉芽面ニ植皮法ヲ行フヘシ其効利固ヨリ論ヲ俟タズ

然レモ此法ヲ行ハント欲セハ宜シク時期ヲ選ハサル可カラス即チ多數ノ亂切法ムルチン、レイン、スバル、セリンヲ執行スルニハ潰瘍面全ク清潔トナリ壞死部分悉ク除却スルニ至ルマテ待タサル可ラス否ラスンハ深部ノ組織ニ傳染シ深入スルノ惧アルモノトス

此法ノ利益ハ主トシテ富血器關ヨリ潰瘍ノ治癒ニ必要ナル肉芽組織ノ發生ヲ誘促スルト斯ノ如クスルキハ創傷ノ營養ノミナラス癰痕ノ營養モ亦永ク適宜ノ位置ニ在ラシムルトコアリ故ニ此法ニ因リテ結ヘル癰痕ハ之ヲ他ノ偶然ニ藥物ニ因テ結ヘル癰痕ニ比シ外力ニ對シテ抵抗ノ強キヲ言チ俟タスシテ明ナリ見ヨ彼ノ藥物的療法ノ如キハ種々ナル有効藥ヲ以テシ剩ヘ注意ニ注意ヲ加フルモ潰瘍容易ニ治セス其得ル處ハ僅ニ缺損部ヲ被覆スル薄膜ニ過キササルニアラスヤ斯ノ如キ癰痕ハ(患者性來ノ強弱ハアレ)僅微ノ器械的若クハ化學的ノ刺戟例之衣服ノ摩擦、搔破、分泌物ノ侵蝕等ニ因ルモ容易ニ破潰スルノ恐レアリテ再三療法ヲ反復

スヘキ繁勞ヲ免カレサルモノナリ

此法ノ最モ適應スルモノハ潰瘍ノ關節上部ニ在リテ其癰痕ハ不斷牽引伸張ニ遇
ヒ膏ニ癰痕ノ破潰シ易キノミナラス遂ニ其關節ノ屈伸ヲ全ク廢止セシメサル
ヲ得サルノ場合ニ在リ「ハールボルト」氏ノ法ハ能ク此二危險症ヲ防ク「下ノ第一
例」ニ於テ証スルカ如シ此患者ハ上膊及前膊ノ全屈折面ニ於テ第三期火傷ニ罹レ
ルモノニシテ初メ僅ニ亂切法ヲ行ヒ后ヲ頻回之ヲ亂切シタルニ治癒ノ經過ハ甚
タ長キモ結果非常ニ佳良ニシテ只伸展作用ニ於テ僅ニ制限セラレ其他ノ運動ハ
全ク健全ニ復シタリ次テ此法ノ利アル處ハ治癒ノ經過ノ如何ナル場合ヲ問ハズ
短縮スルニアリ特ニ潰瘍ノ或種類即チ所謂過敏性潰瘍ニシテ疼痛甚シキ頑固症
ニ在リテハ速ニ之ヲ治スルヲ得ルノミナラス全ク疼痛ナクシテ治スルヲ得
ヘシ之ヲ要スルニ此法ノ卓絶スル所以ノモノハ癰痕ノ性質ト再發ノ悞ナキトニ
在リテ一度此法ヲ行フモノハ其効ノ僞ナラサルヲ知ルヘシ
以上ノ如ク論シタリト雖モ此法亦一定ノ區域内ニ在ルモノニシテ充分ナル結果
ハ此境界ニ於テノミ希望スルヲ得ルモノナリ境界トハ他ニ非ス強テ全身ノ營
養障害ヲ排除スル是ナリ即チ梅毒結核「スコルブート」「アテローム」等ニ在リテハ局

處療法ト共ニ適當ノ原病療法ヲ行ハサルヘカラス唯予ノ茲ニ報スル處ノモノハ
癡鈍性潰瘍就中深部ノ火傷后或ハ挫傷后ニ生スルモノ並ニ靜脈怒張症ニ因スル
下肢潰瘍ニ於テハ最モ卓効アルカ故ニ獨リ之ヲ利スルヲ遺憾トシ汎ク實驗アラ
ンヲ希望スルニ過キス予ハ尙ホ附録トシテ左ニ二患者ノ病床經過ヲ簡單ニ記
ス其他多數ノ患者ハ主トシテ下肢ノ潰瘍ナリキ

第一患者女子廿四才昨年六月廿四日左上膊及前膊ノ屈側ニ於テ第三期火傷ニ
罹リ「ヨードホルム」繃帶ヲ施シ后「硼酸軟膏」ヲ與フ○九月二日潰瘍面僅ニ縮小
スルカ如シト雖モ青白海綿狀ノ肉芽ヲ被ムリ其緣厚硬、毫モ上皮ノ發生ナク潰
瘍底固ク臍狀ヲ呈シ血管發生不長ナリ即チ上式ノ如ク麻醉中ニ亂切シ「ヨード
ホルム」繃帶ヲ施ス○同月三十日盡ク健全ノ肉芽ヲ發生シ上皮ノ發育頗ル佳長
ナリ他動的并ニ自動的運動ヲ命ス○十二月二十日殆ト十「ペン」ニヒ「貨幣」ノ名大
ノ部分ヲ膊肘屈折部ニ殘スノミ然レモ此潰瘍ハ頑固ナルヲ以テ再ヒ亂切シ「ヨ
ードホルム」繃帶ヲ施ス○本年一月三十日全治ス前膊ノ伸展百六十度ノ角度ニ
至ルマテ行フベク屈曲回轉ノ兩作用健全ナリ

第二患者石工四十一年昨年十月十七日高處ヨリ落チ腦震盪症肋骨々切ノ外ニ

殆ト十[セ]ンチメートル[許]ノ挫傷ヲ左大腿外側ニ受ケ股鞘張筋膜縱裂シ裂間ニハ筋ヲ見ルベシ是ヲ以テ可及的挫傷部ヲ切除シ不潔ノ創縁ヲ除キ縫合シテ治ヲ待ツト雖荏苒遂ニ壞屍片ヲ出スニ至リ一大潰瘍ニ變セリ此潰瘍ノ縁ハ厚固ニシテ其底ハ股鞘張筋膜ヨリ成リ通常藥物ヲ用フルモ毫モ減セス○十一月廿五日亂切法及ヒ繃帶○十二月八日佳良ノ肉芽ヲ發生ス「ヨードホルムガーゼ」○爾後硝酸銀軟膏ヲ用ヒタルニ本年一月三十一日全治シ良瘢痕ヲ結ブ (Centralb für Chirurgie No 14. 1888)

◎卵巢囊腫ノ自潰

此一篇ハ過日横井軍醫監來院ノ折談話セラレシ所ノ梗概ナリ
府内麴町區一番町農木村ツヤ齡正ニ廿有六稟賦强健十六歲肇メテ月花ヲ見ル爾來順調タリ曾テ疾病ニ罹リシヲナシ明治十八年十二月即チ去今二年五ヶ月前左腸骨窩ニ細長ノ腫瘤アルヲ覺フ然レモ發熱疼痛等ノ症ナシ但シ瘤腫漸々増大シ廿一年四月廿二日ニ至テ腫瘍ノ最大横徑廿三仙迷最大縱徑十八仙迷ニ至ル茲ニ於テ赤十字社病院ニ入り治療ヲ乞フ偶々月經時ナルヲ以テ時日ヲ延期ス五月十一日午前九時半ヨリ他人ノ室ニ至リ談話スルヲ一時間斗談中思ハス大笑セシニ即