◎赤痢、窒扶斯及虎列刺ニ於ケル下利ノ療法

此篇ハ「マグテブルヒ」府醫會ニ於テ「アウフレヒト」氏 Dr, Aufrecht ガ演說セシモノナリトテ

本年七月刊行ノ治療月報ニ載スル所ナリ今其大体ヲ意譯シテ聊カ紙面ヲ填ム T. K. 誌

今ヤ醫學上ノ最モ高尚ナル問題ハ疾病ノ症候ヲ療スルニアラズシテ其之ヲ起ス所ノ疾病其モノヲ治スルニアリ然ルニ今本題ノ如キ一徵候ノ治法ヲ掲ケテ一場ノ演說ヲ試ミント欲スルガ如キハ聊カ今日ノ醫學ニ反スルノ誣ヲ免カレズト雖モ余ノ之ヲ提出スルヤ抑モ亦故ナキニアラズ夫レ今日原因の療法ヲ行ヒ得ベキ疾病ハ果シテ幾何カアル余ハ遺憾ナガラ其甚タ少ナキヲ告ケザルヲ得ズ余輩モ亦原病的「バクテリア」及其代謝產物ニ就テ研究セハ後來多數ノ疾病ニ於テ其「バクテリア」ヲ殺シ其產物ヲ中和シ以テ該有害作用ヲ驅除センヲ希ハザルニアラズト雖モ如何セン現今吾人ノ職務ニ由テ病者ヲ救ハント欲セハ全ク該對症療法ナルモノヲ廢棄スルヲ能ハズ是故ニ吾人ハ病原ニ對シテ戰フヲ能ハザル間ハ其有害ナル症候ノ驅除法ヲ務メザルヲ得ズ若シ此見解ヲ以テ對症療法ヲ行ハバ恐クハ尙ホ道理ニ適ヒタルモノト看做スヲ得ン凡ソ對症療法ニ用ユル法方ニシテ身体ヲ弱メ或ハ疾病ノ存スル各器關ニ過度ノ働作ヲ強ユルモノハ皆ナ悉ク道理ニ適セザルモノトセザルヲ得ズ今少量ノ尿ヲ分泌スル所ノ疾患腎臟ヲ刺戟シテ其活潑ナル分泌ヲ促サント欲スルモノ之アラシカ尿分泌ノ減少トイヘル一徵ヲ排除シ得ベシト雖モ腎臟自個ヲ害スルノ甚タシキヲ思

◎赤痢、窒扶斯及虎列刺ニ於ケル下利ノ療法

十四

ハザル可カラズ又心臟病ヲ強健ナラシメンガ爲ニ之ニ身体ノ運動ヲ強ユルヲアランカ却テ反對ノ成績ヲ得ルヲアルヲ思ハザル可カラズ

斯ノ如キ見解ヨリ程ヲ發シツ、余ハ余ガ經驗ニ基キテ二三ノ疾病ニ於ケル下利ノ療法ニ説キ移ラント欲ス此疾病ニ於テハ下利ハ著シク全症候ヲ支配スルノミナラズ其轉歸ヲモ左右スルノ勢力ヲ有スルモノニシテ即チ赤痢、腸窒扶斯及虎列刺ニ於テハ余ハ其下利ヲ治シ或ハ少クモ之ヲ減セシムルヲ以テ有効療法ノ最要問題ノ一トナサント欲ス

然レモ今日ニアリテハ此ノ如キ主義ヲ直チニ實行スルヲ能ハザルモノアルガ如シ何トナレバ赤痢患者ノ治チ乞フモノアルヤ之ニ「リチチ」油ヲ與ヘズンバ其發病以來幾日ヲ經シヤナモ問ハズ一概ニ之ヲ目シテ無責任ナル不適療法ヲ行ヒタルモノトナスノ醫師ニ乏シカラザレバナリ余輩試ミニ此輩ニ向テ斯ル處方ハ果シテ積極的ノ成績ヲ得ルヤ否ヲ問ハバ恐クハ之ニ答フニ辭ナカラントス余モ亦曾テ與フルニ「リチチ」油ヲ以テセシヲアリト雖モ余ガ得ント欲シタル成績ハ遂ニ之ヲ得ルヲ能ハザリキ余當時以爲ラク是ニ由テ腸中ノ糞便ヲ排除スルヲ得ント然レモ其糞便ハ曾テ之ヲ見ルヲ能ハズシテ血性粘液便ヲ利セシ「リチチ」油ヲ與ヘザリシ以前ト異ナラザリキ故ニ余輩ハ今ヤ赤痢ニ下劑ヲ與フルヲ以テ陳腐ナル説ト看做シ敢テ之ニ注意セザルニ至レリ「チムメルマン」氏ハ千七百六十七年説ヲ爲シテ曰ク赤痢ナルモノハ食物ノ殘片及分泌物ノ停滯シテ分解スルガ爲

ニ發スルモノニシテ加之腸蟲モ亦之ガ原因タルコアリ故ニ宜シク下劑ヲ與フベシト然ルニ今ヤ赤痢ハ其「バクテリア」學上ニ於テコソ不明ナレ其解剖上ノ變化ニ至リテハ腸ノ實扶帝里性疾患ヲ以テ目セラル、ニ至リシヲ以テ之ニ下劑ヲ投スルガ如キハ理ニ於テ之アルベカラサルヤ明ケシ然レモ吾人ハ悲哉其因ヲ治スルコト能ハズシテ只其果ヲ治療セザルヲ得ズ此果中ノ最モ緊要ナル現象ハ即チ下利ニシテ數多ノ危險症ハ之ト關係ヲ有シ就中裏急後重、不眠症及衰弱ノ三ハ最モ恐ルベキ症候ナリ若シ下利ト共ニ此等ノ症狀ヲ治スルコトヲ得バ吾人ハ則チ吾人ノ療法ニ由テ佳良ノ轉歸ヲ得セシメタルモノト謂テ可ナリ然ルニ此ノ如キハ尙ホ吾人ノ力ノ能ク及ブベキコトニ屬シ腸ヲノ安靜ナラシムルヲ要スルガ故ニ此目的ニ「モルヒチ」ヲ用ヰバ大ニ良効ヲ収ムベシ此ノ如キ療法ハ只理論上ヨリ之ヲ稱揚スルニアラズシテ實ニ久シク經驗セラレタル治療法方ニグアル余ハ數年來赤痢ノ初期ヨリ「モルヒチ」ヲ用ヰテ良効ヲ得タリ若シ患者幼少ナルキハ毎日二乃至三回十五乃至二十密瓦ヲ與フ此ノ如クニシテ余ハ患者ニ與フルニ淡泊ナル食餌ヲ以テシ總テノ場合ニ於テ良効ヲ得タリ

他ノ療法ハ余之ヲ施サバリキ殊ニ余ハ急性期ニ灌腸ヲ施スハ縱令如何ナル藥物ヲ混スルモ其不可ナルヲ警戒セント欲ス其得ル所ナキヲ以テナリ見ヨ咽頭實扶帝里ニ種々ナル藥物ヲ塗布スルモ毫モ良効ヲ得ザルニアラズヤ赤痢ニ於テモ亦然リ此ノ如キ腸ノ灌注法ハ決シテ益スル所ナキノミナ

◎赤痢、室扶斯及虎列刺ニ於ケル下利ノ療法

十六

ラズ却テ害アルヲ見シ「一二回ニ及ベリ

然レハ急性期既ニ去リ實扶帝里部既ニ剝脫セシキハ上記ト全ク其關係ヲ異ニス此場合ニ於テハ糜爛セル粘膜部ヲ治スレバ尙ホ持續スル所ノ下利ヲ制止スルヲ得ベシ此目的ニハ収斂性藥物ヲ注入シテ良効ヲ収ムベシ余ハ千倍ノ一半格魯兒鐵液或ハ一萬倍ノ硝酸銀液各半「リーテル」ヲ用井タ

リ

腸室扶斯ニ於ケル下利ハ赤痢ノ下利ニ比スレバ其病機ノ全經過ニ對スル關係稍ヤ薄シ室扶斯ノ下

利ハ一小症候ニ過キスシテ重症必死ノ場合ニ於テモ殆ント全ク之ヲ欠如シ加之全ク下利ナクシテ經過シ而カモ其屍体ヲ解剖スルキハ小腸ニ於テ廣大ナル潰瘍ヲ見ルヲアリ是ニ由テ之ヲ觀レバ「パイエル」氏腺及孤腺ノ潰瘍ハ直接ニ下利ノ原因ヲナスニアラズシテ其強弱ハ潰瘍周圍ノ粘膜ノ充血及癒衝ノ強弱ニ關スルヤ明ナリ或ハ下利ヲ中止スルヲ恐ル、モノアリト雖モ該二腺ノ潰瘍ニノ既ニ原因の關係ヲ有セザルヲ知ラバ何ゾ之ヲ恐ル、ニ足ランヤ少クモ余ハ下利ノ減退スルヲ以テ佳候ト看做スモノナリ是レ下利ハ身体ヲ疲勞セシメ全經過ヲノ不良ナラシムルノ恐レアレバナリ故ニ余ハ腸室扶斯ノ下利ニ對シテハ常ニ阿片及「モルヒチ」ヲ用井テ良効ヲ収メタリ若シ便通一晝夜間ニ五六回以上ニ至ルキハ余ハ必要ニ應シテ毎日二乃至三回各〇、〇三ノ阿片ヲ與ヒ然ルモ尙ホ下利増進スルキハ「モルヒチ」ヲ與フ余ハ「モルヒチ」ヲ與ヒタルニモ拘ハラズ一晝夜ニ二

十乃至三十行ノ下利アリシモノニ〇、〇一ノ「モルヒチ」ヲ皮下ニ注射シ加之二三回ハ一日二回ツ、之ヲ注射シ而シテ數日間持長セシヲアリ

此止利療法ノ結果ハ亦他ノ一方ニ於テモ大ナル價值ヲ有ス即チ余ハ此方法ヲ取リシ以來腸出血ヲ實驗スルコト非常少ナキニ至リ腸穿孔ノ如キハ一回モ之ヲ實驗セザルニ至レリ腸蠕動機ノ亢進ハ腸ノ出血及穿孔ニ對シテ大ナル關係ヲ有スルコトハ既ニ吾人ノ知悉スル所ナルガ故ニ此ノ如ク下利ヲ止メ腸ヲ安靜ナラシムルノ利ナルヤ明ナリ但シ此療法ヲ行フヤ他ノ腸窒扶斯症狀ニ注意スルヲ要スルコト勿論ニシテ苟モ他ニ禁忌症候ヲ存スルキハ之ヲ施ス可カラザルヤ言ヲ俟タズ彼ノ精神昏迷セル窒扶斯患者ニシテ不知不識大便ヲ漏スガ如キモノニ麻醉劑ヲ與フルノ不可ナルハ皆ナ人ノ知ル所ニシテ亦實際スル考慮ノ浮ビ出ツルモノニアラズ

疾患ノ全盛期ニ於テハ流動食餌ヲ與フベシトハ一般ニ唱道セラル、所ナリ夫レ然リ余モ亦之ヲ贊スルモノナリ然リト雖モ唯ダ牛乳ハ健康体ニ於テモ尙ホ且ツ徐々下利ヲ來スコアルヲ以テ強劇ナル窒扶斯下利ニ於テハ宜シク牛乳ヲ廢スベシ

(未完)

◎枋木縣地方病續報(前號續)

在枋本縣 遠隔會員 德 木 有 鄰 述

◎赤痢、窒扶斯及虎列刺ニ於ケル下利ノ療法