Vol. 25 (2013) No. 1

PLANT MORPHOLOGY

The Japanese Society of Plant Morphology

<http://square.umin.ac.jp/pl-morph/>

学会賞受賞者ミニレビュー

受精回復システムの発見

笠原 竜四郎 (平瀬賞) 83

アスパラガス属植物に見られる新奇葉状器官の獲得とその形態の多様化

中山 北斗, 山口 貴大, 塚谷 裕一 (平瀬賞) 89

花びら作りの分子メカニズム

武田 征士 (奨励賞) 95

原著論文

Variation in shoot organization of *Cynodon dactylon*: is it the grass with an opposite phyllotaxy?

Akitoshi Iwamoto, Tomohiko Inoue 101

日本植物形態学会第24回大会(姫路)発表要旨 105

植物形態学会情報

会長挨拶(野口 哲子) 117

日本植物形態学会3賞受賞理由(今市 涼子) 118

事務報告(酒井 敦) 120

お知らせ 122

日本植物形態学会会則(平成24年1月1日改正) 125

会計報告 127

会員異動 128

入会申込書 130

投稿規程 131

2013年度役員 133

《表紙》

広義サクラ属植物 *Prunus spinosa* の腋芽

広義サクラ属 (*Prunus* s.l.) に属する植物のうち、スモモ、モモ、アンズ亜属の植物ではしばしば腋芽において最初に形成される2枚の鱗片葉 (= 前出葉) の下に腋芽が発達する (ex. Figure 2, Iwamoto and Mochizuki, *Plant Morphol* 21: 93-95). そのため、1つの葉腋に発達する腋芽が最大で3個となる場合がある。西アジアからヨーロッパにかけて分布するスモモ亜属の *Prunus spinosa* L. では、2枚の前出葉に続いて形成される鱗片葉の下にもさらに腋芽が発達することがある。写真はこの植物の腋芽で、元々の腋芽 (= 主芽) 以外発達していない (= 腋芽が1個) ものから、主芽の鱗片葉の腋芽が次々と発達し、1つの葉腋に8個もの腋芽をつけるものまで、発達した腋芽の総数の順に並べてある(1段目左, 1個; 1段目右, 2個; 2段目左, 3個; 2段目右, 4個; 3段目左, 5個; 3段目右, 6個; 4段目左, 7個; 4段目右, 8個)。

荒川悠, 岩元明敏 (東京学芸大学) 撮影