^{99m}Tc 標識化合物の腫瘍親和性に関する研究

—^{99m}Tc-Sn-Concanavaleine A—

伊藤和夫, 小林 真, 久田欣一, 利波紀久, 安東 醇*

金沢大学医学部核医学教室 920 金沢市宝町13-1

金沢大学医療技術短期大学部 920 金沢市小立野5-11-80

1976年10月20日受理

細胞凝集作用を有するレクチン, コンカナバリン A の ^{99m}Tc 標識を試み, エールリッヒ担がんマウスの体内分布および経時的イメージについて検討した。

標識は塩化第一スズを用い, 標識率は Bio Gel P-10 で, 約60%であった。

腫瘍組織集積率は, 1時間が最高値で, ゲルクロマト分離および membrane ろ過によってのみ調製されたそれぞれの ^{99m}Tc-Con A の体内分布には大きな差を認めなかった。しかし, 肝臓, 腎臓および肺などに比較的多い分布があったことは, ^{99m}Tc-Con A の腫瘍スキャン用剤としての応用に問題があると考えられた。

1. 緒 言

^{99m}Tc-labeled tumor seeking radiopharmaceuticals の開発と臨床的応用を目標に, われわれは, これまでに10種類の ^{99m}Tc 標識放射性薬剤^{1)~4)} の腫瘍親和性に関して報告してきた。本論文は, その一連の研究課題として行った ^{99m}Tc 標識 concanavaleine A (^{99m}Tc-Con A) のエールリッヒ担がんマウスの体内分布について報告する。

Con A は jack bean より抽出された cell agglutination 作用を有する lectin として早くから注目されていたが, 近年になって, リンパ球幼若化作用, とりわけ悪性細胞の細胞膜に結合して, 悪性細胞の contact-inhibition of growth に作用する効果が報告されて以来, その重要性が認識されるようになった^{5), 6)}。^{99m}Tc-Con A の腫瘍細胞への取込みの有無に関する報告はないが, Con A の薬理学的効果からして, 十分実験腫瘍への ^{99m}Tc-Con A の集積が考えられた。

2. 材料および方法

^{99m}Tc 標識 concanavaleine A の調製: ^{99m}Tc 標識用 Con A は, Boehringer Mannheim 社製の液体試料を用いた。この試料は, 4 M 食塩水 10ml 中に Con A 250mg を溶解しており, 1 回の標識には, 1 ml (25mg) を用いた。

^{99m}Tc-pertechnetate は ⁹⁹Mo-^{99m}Tc ジェネレーター(ウルトラテクネカウ, 第一 RI 研究所)よりミルキングして得られた Na^{99m}TcO₄ 溶液を使用し, ^{99m}Tc

O₄⁻ の還元は塩化第一スズ(SnCl₂ · 2H₂O)を使用した。具体的な調製過程は Fig. 1 に示したが, ^{99m}Tc-Con A の gel chromatography 分離 (procedure A) による

Fig. 1 Preparation of ^{99m}Tc-labeled concanavaleine A by Bio Gel P-10 gel chromatography (procedure A) and only by 0.20μ membrane filtration (procedure B).

性質上の変化を考慮して、 0.2μ membrane filter によるろ過分離 (procedure B) の2通りの方法で調製した。 ^{99m}Tc -Con A の標識過程でとくに注意したのは、塩化第一スズ還元過程での Con A の変性をできるかぎり防ぐということで、そのためにスズ溶液混入後、30~50秒後に認められる反応溶液の軽度な白濁化の認められる直後に pH をふたたび中性にもどした。

動物実験：ddY系マウスの大腿部皮下にエールリッヒ腹水がんを移植し、直径約1cm程度の結節を形成した時期に実験を行った。使用したマウスの注射時体重は、 ^{99m}Tc -Con A*用および ^{99m}Tc -Con A**用でそれぞれ、 26.9 ± 1.3 (20匹) および 22.0 ± 2.7 (20匹) であった。投与方法は、エーテル麻酔下マウス尾静脈より、前記調製法にて得られた ^{99m}Tc -Con A* および ^{99m}Tc -Con A** 0.1ml (約50 μCi , 約0.4mg 相当) を正確に投与した。投与後1時間、3時間、5時間および24時間におおの5匹ずつを頸静脈より脱血したのち屠殺し、各組織標本を摘出した。摘出標本はすみやかに重量を測定し、ウェル型NaI(Tl)シンチレーション自動測定器で標本中に含まれている ^{99m}Tc の放射能を測定した (測定値はすべて減衰補正した)。これらの値から、全投与量を100%とした場合に各組織標本1g中に含まれている ^{99m}Tc 放射能 (% administered dose/g of tissue weight) を算出した。

さらに、同じ担がんマウスの ^{99m}Tc -Con A** 静注後の経時的イメージについても検討した。方法は Searle 社 Pho/Gamma HP にピンホールコリメーターを装着し、 ^{99m}Tc -Con A** 250 μCi をネブタール麻酔下マウス尾静脈より投与し、投与後30分、60分、120分および180分の全身像ならびに腫瘍移植部拡大像を、それぞれ膀胱部の ^{99m}Tc 放射能を鉛板で遮へいして、幾何学的条件を一定にし100,000カウントで撮影した。

3. 結 果

^{99m}Tc -標識 concanavaline A の標識率と化学的安定性：Con A は25,500の subunits から成り、pH=6以下では dimer の形をとり、pH=7.0では tetramer の形をとると報告されているため⁷⁾、Bio Gel P-10 100~200 mesh ($0.9 \times 25\text{cm}$ column) gel chromatography では、 ^{99m}Tc -Con A はすべて void volume 中に出現する。従って、 ^{99m}Tc -Con A の標識率は約60%と考えられた (Fig. 2A)。 ^{99m}Tc -Con A の pH 調整後の薄層クロマトグラム (TLC) で、 $R_f=0.66$ 付近にも ^{99m}Tc のピークを認めたが、gel chromatography 分離前および分離後の TLC 上で、ニンヒドリン反応を

Fig. 2 Gel chromatography of ^{99m}Tc -Sn-Concanavaline A by Bio Gel P-10 100~200 mesh ($0.9 \times 25\text{cm}$ column) in 0.9% NaCl eluant and silica gel plate thin layer chromatography (TLC) developed in 0.9% NaCl solvent are presented (A) and (1)-(3) respectively. The aliquots were collected at the elution speed of 2ml per twelve minutes. TLC developed in 0.9% NaCl solution was examined at the end of the reduction (1), just after the pH adjusting (2) and with the solution eluted within the fraction No. 3 by Bio Gel P-10 gel chromatography (3). The ninhydrin reaction of amino groups was positive at the origin on all of TLCs but was negative near $R_f=0.66$ on TLC of the post-adjusting of pH.

みたところ、反応はいずれも原点にのみ陽性に認められたところから、 ^{99m}Tc -Con A は 0.9% 食塩水溶媒液の展開では、hydrized technetium と同様に原点にとどまり、 $R_f=0.66$ の小ピークは ^{99m}Tc -Con A ではないことが判明した。反応後、5時間の同様の TLC でも、 ^{99m}Tc -pertechnetate の存在はほとんど認められず、従って ^{99m}Tc -Con A の *in vitro* の化学的結合状態が比較的安定であることが推測できた。

^{99m}Tc -Con A の担がんマウスの体内分布ならびに経時的イメージの検討：procedure A にて調製された ^{99m}Tc -Con A* ならびに procedure B によって調製された ^{99m}Tc -Con A** の担がんマウス体内分布について

Table 1 Comparison between biologic distribution of ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared by gel filtration (procedure A*) and prepared by membrane filtration (procedure B**) in tumor bearing mice at various times following intravenous administration***

		Time after administration			
		1 h	3 h	5 h	24 h
Tumor	^{99m}Tc -Con A*	1.43±0.22	1.13±0.10	1.28±0.12	0.83±0.17
	^{99m}Tc -Con A**	1.65±0.48	1.57±0.22	1.56±0.24	1.19±0.33
Blood	^{99m}Tc -Con A*	3.30±0.22	1.17±0.06	0.90±0.11	0.16±0.04
	^{99m}Tc -Con A**	4.34±0.84	1.75±0.42	1.30±0.36	0.33±0.11
Muscle	^{99m}Tc -Con A*	0.32±0.04	0.27±0.03	0.23±0.02	0.14±0.03
	^{99m}Tc -Con A**	0.44±0.06	0.29±0.10	0.32±0.05	0.18±0.05
Liver	^{99m}Tc -Con A*	6.39±0.44	5.69±0.47	5.42±0.66	2.60±0.32
	^{99m}Tc -Con A**	11.49±2.77	9.62±1.86	8.76±1.72	5.60±2.08
Spleen	^{99m}Tc -Con A*	3.17±0.96	2.23±0.24	2.15±0.08	1.16±0.20
	^{99m}Tc -Con A**	4.51±0.98	3.69±0.79	3.58±1.13	2.48±0.69
Kidney	^{99m}Tc -Con A*	22.01±2.13	17.17±1.23	17.02±0.94	6.90±0.67
	^{99m}Tc -Con A**	23.57±6.21	14.39±2.46	16.52±1.21	7.13±1.48
Lung	^{99m}Tc -Con A*	4.22±0.55	3.47±0.44	3.05±0.30	1.53±0.07
	^{99m}Tc -Con A**	5.08±0.97	3.15±0.42	3.29±0.62	2.02±0.50
Stomach	^{99m}Tc -Con A*	0.94±0.20	0.73±0.10	0.79±0.09	0.36±0.05
	^{99m}Tc -Con A**	0.84±0.10	0.73±0.10	0.82±0.17	0.47±0.12
Pancreas	^{99m}Tc -Con A*	0.44±0.06	0.34±0.03	0.32±0.03	0.19±0.03
	^{99m}Tc -Con A**	0.59±0.10	0.47±0.09	0.47±0.11	0.32±0.11
Ad. gland	^{99m}Tc -Con A*	4.10±0.43	4.05±0.72	3.59±0.63	2.26±0.74
	^{99m}Tc -Con A**	9.77±4.72	6.67±2.65	5.58±1.66	2.97±0.28
Bone (skull)	^{99m}Tc -Con A*	0.33±0.04	0.26±0.04	0.18±0.02	0.14±0.02
	^{99m}Tc -Con A**	0.42±0.10	0.35±0.07	0.34±0.06	0.24±0.06
Heart	^{99m}Tc -Con A*	0.95±0.10	0.66±0.04	0.60±0.07	0.31±0.03
	^{99m}Tc -Con A**	1.39±0.33	0.78±0.14	0.82±0.20	0.50±0.15
Brain	^{99m}Tc -Con A*	0.11±0.01	0.07±0.01	0.06±0.01	0.05±0.00
	^{99m}Tc -Con A**	0.15±0.04	0.08±0.03	0.09±0.01	0.07±0.02
Thymus	^{99m}Tc -Con A*	0.38±0.05	0.29±0.06	0.31±0.05	0.24±0.05
	^{99m}Tc -Con A**	0.64±0.30	0.39±0.09	0.51±0.19	0.38±0.13

*: ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared by Bio Gel P-10 gel chromatography in 0.9% NaCl solution.

** : ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared only by membrane filtration without gel chromatography.

***: mean concentration (% administered dose/g of tissue wt.)±s.e.m in five mice at each time.

は、Table 1 および Fig. 3 に示したとおりである。腫瘍組織および臓器組織集積率に関しては、肝臓を除き2通りの調製法で得られた ^{99m}Tc -Con A に大きな相違は認めなかった。全体的に、 ^{99m}Tc -Con A**のほうが血液濃度が高く、臓器組織濃度が高かったが、腫瘍/臓器濃度比では、むしろ ^{99m}Tc -Con A*のほうが若干良い値を示した (Table 2)。体内分布でとくに注目されたのは、 ^{99m}Tc -Con Aの肺濃度が高かったことで、この点 ^{99m}Tc -trasyololの肺分布と類似していた¹⁾。

担がんマウスの経時的イメージもほぼ体内分布を反映するものであった (Fig. 3)。 ^{99m}Tc -Con Aの腫瘍組織への集積像は明らかであったが、他の臓器組織への ^{99m}Tc -Con Aの分布と比較してより明瞭な集積像としては得られなかった。

4. 考 案

Concanavaline A (Con A) は cell-agglutination 作用を有する lectin として早くから注目され、最近、とくに悪性腫瘍の発育抑制作用を有する物質として非常に大きな注目をあびるようになった^{5)~7)}。とくにその発育抑制効果が、悪性細胞の細胞膜表面の polysaccharide に結合し、artificial cover layer⁵⁾を形成することによって説明されているが、直接的に腫瘍細胞に集積する性質は Con A の腫瘍親和性放射性薬剤としての可能性を示唆するものと考えられた。

しかしながら、 ^{99m}Tc -Con A が ^{99m}Tc labeled tumor seeking radiopharmaceutical として用いられるには不適当な結果であった。とくに、血液の少なくな

Table 2 Comparison between tumor to organ concentration ratio of ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared by gel filtration (procedure A*) and prepared only by membrane filtration (procedure B**) in tumor-bearing mice

		Time after administration			
		1 h	3 h	5 h	24 h
Tu/Bl	^{99m}Tc -Con A*	0.43 ± 0.04	0.97 ± 0.13	1.45 ± 0.24	5.29 ± 0.86
	^{99m}Tc -Con A**	0.38 ± 0.09	0.94 ± 0.23	1.23 ± 0.36	3.68 ± 0.87
Tu/Mu	^{99m}Tc -Con A*	4.5 ± 0.3	3.7 ± 0.4	5.6 ± 0.6	6.2 ± 0.9
	^{99m}Tc -Con A**	3.6 ± 0.7	5.5 ± 0.7	5.5 ± 0.7	5.0 ± 1.2
Tu/Li	^{99m}Tc -Con A*	0.2 ± 0.0	0.2 ± 0.0	0.2 ± 0.0	0.3 ± 0.1
	^{99m}Tc -Con A**	0.1 ± 0.1	0.2 ± 0.0	0.2 ± 0.0	0.2 ± 0.1
Tu/Kd	^{99m}Tc -Con A*	0.06 ± 0.07	0.07 ± 0.01	0.07 ± 0.01	0.12 ± 0.02
	^{99m}Tc -Con A**	0.07 ± 0.02	0.11 ± 0.02	0.09 ± 0.01	0.16 ± 0.03
Tu/Lg	^{99m}Tc -Con A*	0.3 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.0	0.6 ± 0.2
	^{99m}Tc -Con A**	0.3 ± 0.1	0.5 ± 0.1	0.5 ± 0.0	0.6 ± 0.1
Tu/Br	^{99m}Tc -Con A*	13.4 ± 2.4	16.7 ± 1.7	20.1 ± 1.8	17.3 ± 2.9
	^{99m}Tc -Con A**	11.1 ± 3.7	17.6 ± 4.0	18.1 ± 4.5	17.2 ± 4.3

*: mean ratio $\pm$ s.e.m. derived from % administered dose/g of tissue wt. of ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared by gel filtration (procedure A) in each mouse at each time.

**: mean ratio $\pm$ s.e.m. derived from % administered dose/g of tissue wt. of ^{99m}Tc -Sn-concanavaline A prepared only by membrane filtration (procedure B) in each mouse at each time.

Abbreviation: Tu: Tumor, Bl: Blood, Mu: Muscle, Li: Liver, Kd: Kidney, Lg: Lung, Br: Brain

Fig. 3 Organ concentration and clearance of ^{99m}Tc -labeled concanavaline A prepared by procedure A(left side) and by procedure B(right side).

い四肢および頭部以外は、 ^{99m}Tc -Con Aの分布濃度が高く、とりわけ肺集積率が高かったことは ^{99m}Tc -Con Aの腫瘍親和性放射性薬剤としての応用をいっそう困難なものとしている。ただこの点に関しては、Con Aが赤血球を凝集する作用を有している⁵⁾ことから、静注された ^{99m}Tc -Con Aがマウス赤血球を凝集し、肺栓塞

を起こしたためとも考えられる。もちろん、Con Aは人赤血球に対する凝集作用はないと報告されている⁹⁾ので、人に応用した場合には、肺への集積が認められないかも知れない。

Con Aの作用は、溶解状態および結晶状態で異なり、さらに dimers の Con A (succinyl-Con A) と

Fig. 4 Sequential images of tumor bearing mouse with ^{99m}Tc -labeled concanavaline A were demonstrated here. The bladder radioactivity in whole body images (left side and in magnified tumor images (right side) were shielded with lead respectively. The implanted solid tumor was positively delineated with ^{99m}Tc -Con A but its biologic distribution for different organs was higher than for the tumor tissue, except for the brain and extremities.

tetramer の Con A (native Con A) では作用効果が異なり⁷⁾, とくにその作用および状態がイオン濃度⁸⁾および pH⁷⁾によって影響を受けるということは, ^{99m}Tc -Con A の調製を考える場合に重要な要因であろう。今回, 標識に使用した Con A (Boehringer Mannheim Co. Ltd.) は溶液状態にあり, イオン強度の変化を防止するために非常に高張な食塩水に溶解されていた。 ^{99m}Tc -Con A の調製過程で出現した不明な ^{99m}Tc 標識物質は, ニンヒドリン反応が陰性で, なおかつ, gel chromatography にて chelating fraction 中に出現する物質であることから, Con A の分解産物であるよりは, むしろ分子量の小さな溶液中に混じっている不純物と考えることができよう。今後, ^{99m}Tc -Con A の調製過程を含め, 結晶を用いた Con A の ^{99m}Tc 標識を試み検討することが必要と考えられる。

Con A の薬理学的効果発現量からみた場合, エールリッヒ固型がんへの集積率(約 $4\ \mu\text{g}$ ~ $7\ \mu\text{g}$ 相当)で十

分なのかも知れない。もちろん, Con A の組織培養人繊維芽球の凝集抑制は, dose-dependent な関係にあると報告⁹⁾されているところから, ^{99m}Tc -Con A の投与量を増すことによってそれだけ多く tumor cell にも集積する可能性が考えられよう。しかしながら, ^{99m}Tc -labeled tumor seeking radiopharmaceuticals の条件として, 絶対的な腫瘍集積率が高いのと同時に, 血液濃度の減少がすみやかで, 腫瘍/臓器濃度比が高いことが必要であるとすれば, ^{99m}Tc -Con A の臨床的応用に対しては大きな期待は望めないかも知れない。

5. 結 語

Concanavaline A (Con A) の悪性細胞に対する発育抑制機序に注目し, ^{99m}Tc -Con A の ^{99m}Tc -labeled tumor seeking radiopharmaceutical としての性質について, エールリッヒ担がんマウスを用い検討した。

^{99m}Tc -Con A の標識は塩化第一スズ還元法によって行い, 調製は, Bio Gel P-10 gel chromatography による ^{99m}Tc -Con A の性質変化を考慮して $0.20\ \mu$ membrane filter による ^{99m}Tc -Con A の調製(procedure B)の 2通りの方法を用いた。両者の担がんマウスの体内分布は, 肝を除き著しい差は認められず, 腎, 肝および肺に多く分布し, 腫瘍組織への最大集積率は 1 時間にあり, それぞれ 1.43 ± 0.22 および 1.65 ± 0.48 であった。血液濃度の低下も遅く, 従って腫瘍/臓器濃度比は腫瘍/脳比以外に著しく高い値を示したものはなかった。

^{99m}Tc -labeled tumor seeking radiopharmaceutical の条件として, 高い絶対的腫瘍組織集積率はもちろんのこと, すみやかな血液濃度の低下と, 腫瘍/臓器濃度が良いことが必要であるとするならば, ^{99m}Tc -Con A の臨床的応用に対しては大きな期待をもつことはできなかった。

本稿を終えるにさいし担がんマウスのイメージングにご協力いただきました金沢大学附属病院アイソトープ部, 松平正道技師に心より感謝します。

なお本研究の一部は, 厚生省がん研究助成費(算班)によるもので, 本論文の要旨は, 昭和51年6月19日, 高岡で開催された日本核医学会第18回東海, 第25回北陸合同地方会にて発表した。

文 献

- 1) 伊藤和夫, 他: ^{99m}Tc 標識化合物の腫瘍親和性に関する研究, 第 I 報, ^{99m}Tc -pertechnetate, ^{99m}Tc -

- human serum albumin, ^{99m}Tc -trasytol, *Radioisotopes*, **25**, (10) 18~25 (1976)
- 2) 同上 : 同上, 第Ⅱ報, ^{99m}Tc -diphosphonate, ^{99m}Tc -dimercaptosuccinic acid, ^{99m}Tc -diethyl stilbestrol diphosphate, *ibid.*, **25**, (10) 26~33 (1976)
 - 3) 同上 : 同上, 第Ⅱ報, ^{99m}Tc -asparaginase, ^{99m}Tc -bleomycin, *ibid.*, **25**, (12) 24~31 (1976)
 - 4) 同上 : 同上, 第Ⅳ報, ^{99m}Tc -urokinase, ^{99m}Tc -mannitol, *ibid.*, **26**, (1) 6~12 (1977)
 - 5) Burger, M.M. & Noonan, K.D.: Restoration of normal growth by covering of agglutinin sites on tumor cell surface. *Nature*, **228**, 512~15 (1970)
 - 6) Chowdhury, T.K.: Concanavaline A: an introduction: *Adv. Exp. Med. Biol.*, **55**, 1~12 (1975)
 - 7) Reeke, G.N., Jr., et al.: Structure and function of concanavaline A. *ibid.*, 13~33 (1975)
 - 8) Sharon, N. & Lis, H.: Lectins: Cell-agglutinating and sugar-specific proteins. *Science*, **177**, (4503) 949~59 (1972)
 - 9) Zacharski, L.R., Rosenstein, R., & Phillips, P.G.: Concanavaline A inhibition of tissue factor (thromboplastin) activity. *Blood*, **44**, (6), 783~89 (1974)

Abstract

Study on Tumor Affinity of ^{99m}Tc -labeled Radiopharmaceuticals —— ^{99m}Tc -Sn-Concanavaline A——

Kazuo ITOH, Shin KOBAYASHI, Kinichi HISADA,
Norihsa TONAMI and Atsushi ANDO*

Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Kanazawa University
13-1, Takara-machi, Kanazawa-shi 920

* School of Paramedicine, Kanazawa University
5-11-80, Kotatsuno, Kanazawa-shi 920

Biologic distribution of ^{99m}Tc -labeled concanavaline A, lectin with cell-agglutination, in Ehrlich's tumor-bearing mice has been studied to get a promising indicator for the positive delineation of solid malignant tumors. The preparation of ^{99m}Tc -Con A was made by two procedure, by Bio Gel P-10 100-200 mesh (0.9×25 cm column) gel chromatography in 0.9% NaCl eluant (procedure A) and only by 0.20 μm membrane filtration (procedure B). The reducing agent for ^{99m}Tc -pertechnetate was used with freshly prepared stannous chloride. Labeling yields of ^{99m}Tc -Con A by Bio Gel P-10 was 60% within void volume and 20% within chelating fractions. ^{99m}Tc -labeled substance eluted within chelating fraction was developed to $R_f=0.66$ by silica gel plate chromatography in 0.9% NaCl solvent and the ninhydrin reaction for it was negative. Though a higher uptake to the implanted solid tumor tissue in mice was found in ^{99m}Tc -Con A prepared by procedure B than prepared by procedure A, biologic distribution of ^{99m}Tc -Con A by both procedures were not different, except the liver and high uptakes for liver, kidney and lung were found. Therefore, if ^{99m}Tc -labeled tumor seeking radiopharmaceuticals would be needed to a high absolute tumor concentration as well as to a fast blood disappearance with a low uptake for different organs as preferable biologic characteristics, ^{99m}Tc -Con A might not be expected merely to be used as a useful ^{99m}Tc -labeled tumor localizing radiopharmaceuticals in clinics. (Received October 20, 1976)