放射性ヨウ素の土壌から水稻への移行に関する基礎的研究

内田滋夫, 村松康行, 住谷みさ子, 大桃洋一郎, 山口秀甫*

放射線医学総合研究所環境放射生態学研究所

311-12 茨城県那珂湊市磯崎3609

*東京農業大学アイソトープセンター

156 東京都世田谷区桜丘1-1-1

1988年8月3日 受理

出穂期以降の水稻について、田面水に添加した ^{131}I の水稻各部位への移行および土壌垂直分布などを検討した。水稻地上部への移行については、下位葉の方が濃度が高く、いったん葉に移行した ^{131}I の米への再転流は少なかった。玄米と止め葉の ^{131}I 濃度比は約 10^{-3} であり、玄米とモミガラ粒当たりの分配比は約 1:4 であった。収穫期に近い黄熟期でも ^{131}I の米への移行が認められた。

Key Words: iodine-129, rice plant, root uptake, soil culture, contamination of flooded water

1. はじめに

放射性ヨウ素の農作物への移行に関する研究は、これまで ^{131}I がその主な対象核種であった。 ^{131}I の場合、短半減期核種であるため、葉面への直接沈着経路が最も重要であり、経根吸収経路からの移行は、研究の対象としての重要度は低いと考えられ、したがって、この経路に関する報告はきわめて少ない。しかし、 ^{129}I の場合は、半減期が1600万年と非常に長く土壌への蓄積の可能性もあるため、経根吸収経路からの移行も重要となる。とくに、湛水条件下において土壌に吸着しているヨウ素が土壌溶液中に溶出してくる^{1),2)} という点から、水稻(米)が、最も重要な農作物³⁾ となる。

^{129}I の経根吸収経路から米への移行には、さまざまな要因が関与している。土壌中における ^{129}I の分布もその一つである。水田では、田植え前の耕うんによって、表層土と下層土が機械的に混合され、巨視的に見れば、 ^{129}I は均一分布の状態となる。しかし、田植え後には、ガス状および粒子状の ^{129}I が直接、あるいは雨水に溶けた形で田面水に降下することになる。さらに ^{129}I を含む河川水を灌漑水として利用する場合もあり、このような状況下では、水田土壌中の ^{129}I 濃度は、表層土壌で高く、下層では低いという不均一分布になっているものと予想される。

本研究は、ポット栽培法により、田面水に放射性ヨウ素を投与した場合の土壌中ヨウ素の垂直分布と土壌

からの溶出、ならびに水稻諸器官、とくにモミおよび玄米への移行について検討したものである。施設の RI 使用上の制約から、比較的半減期が長い ^{125}I (半減期: 60日) を使用することができず、 ^{131}I (半減期: 8日) を使用せざるを得なかった。したがって、実験は、全生育期間をカバーするような長期間にわたる実験を実施することができないため、出穂期以後の水稻について検討した。

2. 実験方法

2.1 水稻の栽培

水田土壌の入手が困難であったため、水田土壌の代わりに畑土壌を用いた。茨城県東海村で採取した畑土壌(黒ボク土)を風乾したあとふるい(5mm)で小石や植物根を取り除いた。供試土壌の土性は砂壤土であり、pH: 5.4, 腐植含量: 7.6%, および陽イオン交換容量(CEC): 20 me/100g(乾土)である。この畑土壌中のヨウ素濃度は測定していないが、村松ら⁴⁾ は東海村ならびにその周辺の畑土壌および未耕地土壌中のヨウ素濃度を測定し、20-60 ppm の値を報告している。本実験に使用した畑土壌のヨウ素濃度もこの程度であると推定される。この畑土壌をワグネルポット(5千分の1アール)に肥料と一緒に入れ、良く混合した。肥料は、N-P-K の配合率が 12-16-14 (くみあい苦土)のものをを用い、ポット当たり 5g を加えた。さらに、井戸水を加えてから、5月25日に水稻苗(日本晴)を1本植えとしてポットに移植した。

これらの作業および栽培は東海村にある放射線医学総合研究所東海圃場で行った。

2・2 経根吸収実験

東海圃場で栽培していた水稻のポットを、8月中旬(穂ばらみ期)に東海施設内の植物栽培装置内に移し、栽培を続け、後述する三つの生育時期に ^{131}I を投与した。栽培条件は、温度 $28\pm 2^\circ\text{C}$ 、湿度 $60\pm 10\%$ 、照度 $30\,000\text{ lx}$ である。植物栽培装置内の日照時間は、1日13-11時間とし、収穫期に近づくに従い、徐々に短くした。

^{131}I は、キャリアフリーの Na^{131}I 溶液を用いた。3.7-7.4 MBq(100-200 μCi)の ^{131}I (液量 2.5-5 ml)を、田面水にピペットで数箇所に滴下した。滴下後、ただちに田面水を静かにかきまぜ、なるべく ^{131}I が田面水中で均一になるようにした。これらの作業は、生育中の水稻に ^{131}I が付着しないように行った。投与時期は、開花直前(8月21日)、糊熟期(9月10日)および黄熟期(9月25日)の3期である。 ^{131}I を投与後、収穫期(10月1日)まで湛水状態で栽培を続け、収穫期に水稻の各部位をサンプリングし、その ^{131}I 濃度を測定した。開花直前に投与した実験では、収穫期だけでなく糊熟期にもサンプリングした。投与時期および吸収実験期間などをTable 1に示す。

Table 1 The experimental conditions

No.	Date of ^{131}I added to the pot	Period for uptake experiments
S-1	August 21	18 days
S-2	" "	40 days
S-3	September 10	20 days
S-4	" 25	6 days

Date of flowering: during the period August 23 - September 1

2・3 ^{131}I の土壤中垂直分布

黄熟期に投与したポットは、収穫後解体し ^{131}I の土壤中垂直分布を求めた。土壌をポットの中心から三つの扇形に等分し、それぞれについて垂直分布を測定した。すなわち、表層0-3cmまでは1cmごとに、それより深いところでは中央部(表層下、約8cm)と底部(表層下、約16cm)から、それぞれ約5gずつサンプリングし、 ^{131}I 濃度を測定した。

2・4 ^{131}I の土壌からの溶出実験

土壌に吸着した ^{131}I の土壌溶液への溶出を検討する

ため、収穫後、ポットを解体して得られた土壌試料(風乾土:表層0-1cm)を用いて溶出実験を行った。ポリビンに上記の土壌試料5.0gと純水、または1000 ppmの I^- 溶液(KI) 50 mlを入れ、 23°C で24時間振とう後、水溶液中の ^{131}I 濃度を測定し、分配係数(K_d)と溶出率を求めた。 K_d は、吸着平衡後における土壌1g当たりの目的元素濃度と溶液1ml当たりのそれとの比として定義されており、本研究では、溶出実験開始前に測定した土壌中の ^{131}I 濃度と24時間振とう後に求めた溶液中の ^{131}I 濃度から算出した。なお、溶出率は、土壌に含まれる総 ^{131}I 量に対する水溶液中に溶出してきた ^{131}I の総量との比として定義⁵⁾されているので、それに従った。

3. 実験結果および考察

3・1 ^{131}I の土壌垂直分布

ポット内の ^{131}I の垂直分布をFig. 1に示す。前述したように、黄熟期(9月25日)に田面水に ^{131}I を添加し、10月1日に収穫したポット土壌中の垂直分布である。Fig. 1には、得られた三つの値の平均値を示した。土壌中に存在する総量の約80%が表層1cm以内にあった。この実験が行われた時期は、生育後期に当たり、水稻の水分吸収量が少なく、水分吸収に伴う田面水の垂直方向への移動があまりない時期である。さらに、本実験は、RI廃液を少なくするために、ポット下部からの水の流出がないという条件下で行った。実験の水田における ^{129}I の垂直分布や垂直方向の ^{129}I の移動と比較・検討するためには、灌漑水の流出のある条件下で実験を行う必要がある。

Fig. 1 Vertical distribution of ^{131}I in the soil.

3・2 ^{131}I の土壌からの溶出および分配係数

^{131}I 濃度の高い表層0-1cmの土壌を用いて行った

溶出実験の結果を Table 2 に示す。溶出率は、純水の場合は約 6%, 1000 ppm の I⁻ 溶液 (KI) を用いた場合は約 15% である。この実験結果から求めた分配係数 (K_d) も、あわせて Table 2 に示した。純水の場合の K_d は約 180 である。

高城ら⁹⁾ は、水田土壌の安定ヨウ素を用いて純水による抽出実験を行い、土壌中の水溶性ヨウ素を定量している。彼らの結果から分配係数を求めると、数百〜千の範囲となり、本研究で得られた値よりも数倍大きい。この二つの結果から、田面水に供給された ¹²⁹I は、土壌に吸着しても土壌中に存在する安定ヨウ素よりも脱離しやすく、水田土壌中を移動しやすいと考えられる。しかし、分配係数は、土壌の種類によるほか、天然に存在する安定ヨウ素と新たに添加した ¹³¹I との化学形態の違いに基づく挙動の違い、および抽出実験条件等の違いなどが考えられるため、さらに実験を進める必要がある。また、いったん土壌に吸着されたヨウ素も植物の根の生理作用や微生物の作用などにより水

田土壌中の還元状態が促進されるため、土壌から脱離されやすくなるという報告⁷⁾ もある。その報告に従えば、田面水により水田表層土壌に供給された ¹²⁹I のうち、土壌に保持されたものも、その後、徐々に脱離し、一部は水稻に吸収され、残りは灌漑水とともに下方へ移動すると考えられる。水田土壌中の安定ヨウ素濃度は、畑土壌中のそれよりも低い⁵⁾ ため、いったん土壌に吸着したヨウ素がどのように溶出してゆくかを究明する必要がある。

3.3 水稻体内の分布

水稻の各部位への ¹³¹I の移行を Table 3 に、また、サンプリングを行った各部位を Fig. 2 に示した。表には、生体重 1 g 当たりの ¹³¹I 濃度を記載した。¹³¹I の添加時期や吸収実験期間が異なるので、すべて、各実験における n 葉身 (止め葉: 最上部に位置し穂のつけねの葉身) の濃度を 1.0 とした場合の相対値で示した。表から、実験 {S-4} の結果を除き、 n 葉身より

Table 2 Solubility and distribution coefficient (K_d) of ¹³¹I
(Average of duplicate determination)

No.	Solution		Solubility(%)*	K_d **
1	Pure water	Supernatant liquid	5.7	183
2	Pure water	Filtrate	5.7	185
3	1000 ppm I ⁻ (KI)	Supernatant liquid	15.5	68
4	1000 ppm I ⁻ (KI)	Filtrate	15.3	69

*Solubility: Percentage of dissolved ¹³¹I into the solution from the soil

**Distribution coefficient (K_d): The ratio of ¹³¹I per unit weight of dried soil to ¹³¹I per unit volume of the solution

Table 3 The ratio of ¹³¹I in each organ of rice plant to that in flag leaf (n -th leaf blade), on a fresh weight basis

Organ	S-1	S-2	S-3	S-4
n -th leaf blade	1.0	1.0	1.0	1.0
($n-1$)-th leaf blade*	2.3	1.9	2.4	0.43
($n-2$)-th leaf blade	—	1.3	1.4	5.3
n -th leaf sheath	—	0.47	0.73	1.2
($n-1$)-th leaf sheath	—	0.87	1.4	2.4
($n-2$)-th leaf sheath	—	0.76	2.4	4.5
Rachis-branch**	1.2	0.70	0.8	0.52
Unhulled rice	—	0.019	0.022	0.008
Brown rice	0.024	0.005	0.003	0.001
Hull	0.14	0.074	0.10	0.028

*($n-1$)-th leaf blade: the leaf blade just under the flag leaf (n -th leaf blade)

**Rachis-branch: including rachis

Fig. 2 Names of organs of rice plant.

も $n-1$ 葉身（止め葉よりも一つ下の葉身）の方が、 ^{131}I の濃度が高いことが分かる。葉鞘についても、 ^{131}I 濃度は下位になるほど高い傾向がある。Zn や P などは、活動が盛んな部位へ移動してゆく^{8),9)}が、 ^{131}I ではそれが観察されていない。このヨウ素の体内分布から、ヨウ素の水稻内における再転流の程度は小さいと想像される。

枝梗（穂軸も含む）の ^{131}I 濃度は、 n 葉身と同程度ないしはその半分であるが、モミの ^{131}I 濃度は、枝梗よりも約 2 桁低い。モミガラと玄米の ^{131}I 濃度を比較するとモミガラの方が高いが、それでも枝梗の 1/10 程度である。これは、枝梗からモミへヨウ素が移行しにくい、あるいは、モミガラから蒸散などによりヨウ素が水とともに大気中へ放出されるのではないかとと思われる。この点に関しては、葉身からの蒸散による放出の可能性も含めて、ヨウ素の水稻体内での挙動およびその化学形の問題⁷⁾と合わせて研究を進める必要がある。

玄米と n 葉身との ^{131}I 濃度比は、実験 {S-1} を除いて約 10^{-3} のオーダーである。結田¹⁰⁾は、白米と茎葉部との比が約 3×10^{-4} と報告している。その報告の中

で、玄米/白米比が約 3 であることを考慮すると玄米/茎葉部の比は 9×10^{-4} ($\approx 1 \times 10^{-3}$) となり、本実験で得られた玄米/ n 葉身の値とほぼ同じになる。この比は、 ^{131}I を投与した時期が出穂期に近いほど高い傾向がある。その理由は、 ^{131}I は光合成産物を玄米へ運ぶ篩管流中の水とともに移行し、その移行量は光合成産物の供給量に依存するためと考えられる。すなわち、光合成産物を運ぶ水とともに玄米に供給される ^{131}I は、玄米の生長が著しい出穂期では多く移行するが、その生長速度の低下とともに移行量は次第に少なくなっていく。しかし、表から、黄熟期でもなお若干は移行していくことが分かる。

Table 4 には、それぞれの実験で得られた玄米とモミガラとの ^{131}I の分配比を示した。これは、モミ 100 粒当たりの、玄米中の ^{131}I 濃度を 1.0 とした場合の、モミガラ中の ^{131}I の相対濃度である。4 回の実験の平均値は、玄米：モミガラ = 1 : 4 である。前述したように、 ^{131}I は、葉身などからの光合成産物を玄米へ運ぶ篩管流中の水とともに移行するが、水分は主としてモミガラへ移行していくため、玄米よりもモミガラの方へ多く移行すると思われる。また、収穫期に近づくに

Table 4 The ratio of ^{131}I of hull to that of brown rice
(on a 100 grains basis)

	S-1	S-2	S-3	S-4
Brown rice	1.0	1.0	1.0	1.0
Hull	1.3±0.23	3.4±0.73	7.9±1.8	4.8±1.9

つれて、モミガラへの分配が次第に多くなる傾向が見られる。この点については、玄米およびモミガラへの生育段階による移行量の変化は、モミガラよりも玄米の方が少ない。その結果、収穫期に近づくにつれて、相対的に、玄米よりもモミガラへ ^{131}I が多く移行するようになると考えられる。

結田¹⁰⁾は、糊熟期後期（出穂期より23日後）に添加した場合でも、白米中に ^{129}I が移行することを報告している。本研究においても、出穂期より約30日後（黄熟期）でも、玄米中に ^{131}I が移行していることが確認された。

3.4 ^{131}I の移行比および移行係数

本実験において、土壌中の ^{131}I 濃度を求めたのは実験{S-4}だけである。前述したように、田面水に添加した ^{131}I は、土壌の垂直分布において、土壌表層(0-1cm)に多く、下層では少ないという不均一分布をしている。また、短期間の吸収実験であるため、米への移行量を定量的に求めることは難しい。しかし、土壌中の ^{131}I 濃度として、その平均濃度を用い、さらに、村松ら¹¹⁾が提案した移行率 (AR: activity ratio) [本研究の場合、6日間の吸収実験における玄米中の ^{131}I 濃度と土壌中の ^{131}I 平均濃度との比] を用いれば、

$$AR=4-5 \times 10^{-4}$$

程度である。水田土壌と白米中の安定ヨウ素の濃度測定から求められた、圃場におけるヨウ素の白米への移行係数 (TF: transfer factor)^{6), 12)}は、

$$TF=1-2 \times 10^{-3}$$

である。本研究で得られた AR 値は、出穂期の約30日後から収穫までの6日間の吸収実験である。 ^{131}I の米への移行が出穂期以後に行われると仮定し、さらに土壌から米への移行速度（1日当たりの移行量）がほぼ一定であると仮定すれば、出穂期から収穫期までの36日間の AR 値は、

$$AR=4-5 \times 10^{-4} \times (36/6)$$

$$\approx 2.4-3 \times 10^{-3}$$

となり、上述の TF 値と比較的似た値を示す。しかし、前述したように、玄米への移行量は水稻の生育段階により異なる。AR の計算に用いた値は、玄米への

移行量が少ない黄熟期のものであり、出穂期から糊熟期では、この AR 値はもっと大きくなる可能性もあると考えられる。今後、田面水から供給される放射性ヨウ素、とくに ^{129}I の移行係数 (TF) を求めるために、全生育期間にわたる吸収実験を行う予定である。

4. 結 語

水稻への ^{129}I の経根吸収による移行を考えた場合、非湛水期間中に水田土壌に蓄積された ^{129}I が移行する場合と、生育期間中に、大気、降水、さらに灌漑水等に含まれる ^{129}I が田面水に混入し、それが水稻に移行する場合とが考えられる。本研究は、後者の問題に関して、ポット実験により基礎的な検討を行ったものである。その結果、つぎのことが明らかとなった。

(1) 水稻内の ^{131}I 濃度分布において、葉身および葉鞘とも下位の方が濃度が高い。枝梗は n 葉身（止め葉）の1.0-0.5、モミでは n 葉身の1/10以下となる。さらに、玄米は、 $1-5 \times 10^{-3}$ であり、玄米へは非常に移行し難い。

(2) 玄米とモミガラの ^{131}I の分配比（粒当たり）は約1:4であるが、収穫期に近づくにつれてモミガラへの分配が多くなる傾向がある。

(3) 黄熟期においても、 ^{131}I の米への移行が認められた。

(4) 土壌中での ^{131}I の不均一分布を考慮し、黄熟期の6日間の吸収実験から、吸収速度を一定と仮定して出穂期から収穫期までの土壌から玄米への移行比を求めたところ、

$$2-3 \times 10^{-3}$$

であった。

生育後期に添加しても、玄米への ^{131}I の移行が観察されたことから、圃場での栽培条件下で長期間栽培実験を行い、田面水から流入した ^{129}I の土壌中での濃度分布について研究するとともに、米への移行係数を得る必要がある。

本研究を遂行するにあたり、水稻の栽培やデータ整理に関して貴重な御助言をいただきました、三重大学生物資源学部の梅林正直教授および小畑 仁助教授に

厚く感謝の意を表します。

文 献

- 1) Tensho, K. and Yeh, K.L.: *Radioisotopes*, **19**, 26-31 (1970)
- 2) Tensho, K. and Yeh, K.L.: *Soil Sci. Plant Nutr.*, **16**, 30-37 (1970)
- 3) 大桃洋一郎, 内田滋夫, 住谷みさ子: 日本原子力学会誌, **27**, 388-394 (1985)
- 4) Muramatsu, Y. and Ohmomo, Y.: *Sci. Total Environ.*, **48**, 33-43 (1986)
- 5) 結田康一: 第13回放射医研環境セミナー「放射性物質の農作物への移行」(NIRS-M-65), pp.97-108 (1987)
- 6) 高城裕之, 木村敏正, 小林宏信, 他: 保健物理, **20**, 251-257 (1985)
- 7) 村松康行, 内田滋夫, 住谷みさ子, 他: 日本放射線影響学会第31回大会要旨集, p. 82 (1988)
- 8) 小畑 仁 (日本土壌肥科学会編): 「植物と金属元素」, pp.123-166, 博友社, 東京 (1982)
- 9) 小林宏信, 他: 農業技術研究所化学部 昭和38年度成績の概要, pp.138-147 (1964)
- 10) 結田康一: 第18回「原子力施設と沿岸海洋シンポジウム」要旨集, pp.49-57 (1987)
- 11) Muramatsu, Y., Christoffers, D. and Ohmomo, Y.: *J. Radiat. Res.*, **24**, 326-338 (1983)
- 12) 並木 篤, 片桐裕美, 成田 脩: 日本保健物理学会第23回研究発表会要旨集, p. 43 (1988)

Abstract

A Preliminary Study on the Uptake of Radioiodine by Rice Plants from Soil

Shigeo UCHIDA, Yasuyuki MURAMATSU, Misako SUMIYA,
Yoichiro OHMOMO and Shuho YAMAGUCHI*

Division of Radioecology, National Institute of Radiological Sciences
3609 Isozaki, Nakaminato-shi, Ibaraki-Pref. 311-12, Japan

*Tokyo University of Agriculture, 1-1 Sakuragaoka, Setagaya-ku, Tokyo 154, Japan

In an atmospheric discharge of radioiodines, direct deposition of the nuclides onto leaf surface must be the most significant pathway from the environment to man. However, ^{129}I reaches man through several pathways because of its long half life of 1.6×10^7 years. Root uptake of ^{129}I is one of the most important pathways of this nuclide. In Japan, rice is thought to be the most critical crop on the pathway.

In this paper, uptake of radioiodine from irrigation water by rice plant was investigated. Rice plants, *Oryza sativa* cv. Nihonbare, were grown under flooded condition in Wagner pots containing soil collected in Tokai-mura. Iodine-131 was added as a tracer into the surface water in the pots at three different growing stages, heading, dough-ripe and yellow-ripe stages, respectively, and the plants were cultivated until the harvest time in a plant growth chamber.

At the harvest time, concentration of ^{131}I in each organ of rice plant was measured with a NaI scintillation counter. The profile of ^{131}I in the soil was also investigated. The results obtained are as follows;

(1) Activities of ^{131}I in leaf blade and sheath of lower part were generally higher than those of upper part. Compared to the ^{131}I activity of the flag leaf, the ratios of the activity in rachis-branch, hull and brown rice were 1.0-0.5, 0.1 and $1-5 \times 10^{-3}$, respectively. These may suggest that iodine taken up by the roots scarcely re-translocated into rice.

(2) Ratio of ^{131}I in brown rice and hull was about 1:4.

(3) Activity ratio ("concentration of ^{131}I in brown rice"/"average concentration of that in the soil" during 6 days uptake experiment.) was $4-5 \times 10^{-4}$.

(Received August 3, 1988)