補 冊

FDG-PET 検査の臨床的有用性と医療経済効果に関する 全国調査報告[†]

(社)日本アイソトープ協会医学・薬学部会サイクロトロン核医学利用専門委員会
FDG-PET ワーキンググループ^{††}

113-8941 東京都文京区本駒込 2-28-45

Key Words : positron emission tomography, medical use, fluorine-18-2-fluoro-D-glucose, cost effectiveness analysis, multi-center survey, intractable epilepsy, myocardial viability, lung cancer, breast cancer, liver tumor, pancreatic tumor, colorectal cancer, recurrence, head and neck tumor, brain tumor, whole-body scanner

はじめに

(社)日本アイソトープ協会医学・薬学部会、サイクロトロン核医学利用専門委員会、FDG-PET ワーキンググループは、本邦における

FDG-PET 検査の臨床的有用性と医療経済効果を明らかにするため、平成9年7月、全国の25 PET 施設に平成10年7月までに各施設において実施した FDG-PET 検査の臨床上的有用性についてのアンケート調査を行った。

調査対象は難治性てんかんの焦点検出、心臓疾患の心筋のバイアビリティ診断、および腫瘍疾患（頭頸部腫瘍、肺腫瘍、乳腺腫瘍、肝腫瘍、膵腫瘍、結腸・大腸癌再発症例）の診断のために FDG-PET 検査を実施した症例である。

下記の 20 施設より、2461 例の報告が得られた。

[†]Multi-center Survey of FDG-PET Studies for Clinical Use and Their Cost Effectiveness Analysis in Japan. Working Group on FDG-PET, Sub-committee of Medical Application of Cyclotron-Produced Radionuclides, Medical Science and Pharmaceutical Committee, Japan Radioisotope Association, 2-28-45, Honkomagome Bunkyo-ku, Tokyo 113-8941, Japan.

^{††}FDG-PET ワーキンググループ

主査 鳥塚 莞爾 京都大学名誉教授

委員 井戸 達雄 東北大学サイクロトロン・RI センター

伊藤 健吾 国立療養所中部病院

岩田 鍊 東北大学サイクロトロン・RI センター

宇野 公一 医療法人清志会 西台クリニック画像診断センター

越智 宏暢 大阪市立大学医学部

窪田 和雄 東北大学加齢医学研究所

古賀 佑彦 藤田保健衛生大学医学部

小西 淳二 京都大学大学院医学研究科

佐治 英郎 京都大学大学院薬学研究科

西村 恒彦 大阪大学医学部バイオメディカル教育研究センター

前田 稔 九州大学大学院薬学研究科

米倉 義晴 福井医科大学

秋田県立脳血管研究センター 放射線科

岩手医科大学 第一内科

東北大学加齢医学研究所 機能画像医学科

群馬大学 核医学科

千葉大学 放射線科、第一内科、第二外科

(千葉県立がんセンター乳腺外科)

東京都立老人総合研究所

ポジトロン医学研究部門

国立国際医療センター 放射線科

国立精神・神経センター 放射線診療部

ハイメディック山中湖クリニック

県西部浜松医療センター

先端医療技術研究センター

名古屋大学 放射線科
 名古屋市総合リハビリテーションセンター
 放射線診断科
 国立中部病院長寿医療研究センター
 生体機能研究部
 福井医科大学 高エネルギー医学
 研究センター，放射線科
 金沢循環器病院 放射線科
 京都大学 核医学科，脳病態生理学講座
 大阪大学 トレーサ情報解析学研究部
 大阪市立大学 核医学科，第一内科
 国立循環器病センター 放射線診療部
 九州大学 放射線科

各疾患ごとの責任者が分担して，FDG-PETの臨床の有用性と医療経済効果の解析を行ったので，その成績を報告する。

また，最近全身 PET スキャナを設置する施設が増えてきており，平成11年7月，腫瘍のFDG-PET 検査における全身撮影の有用性に関するアンケート調査を行ったので，その結果をも報告する。

最後に，本調査にご協力いただいた全国のPET 施設の各位に深甚の謝意を表します。

第1章 難治性てんかんの焦点検出における FDG-PET の医療経済効果

米倉義晴，池田昭夫*

福井医科大学
 高エネルギー医学研究センター
 *京都大学大学院
 医学研究科臨床脳生理

1. はじめに

てんかんは，全人口の約0.6%を占める頻度の多い疾患である。最近，薬剤治療によるコントロールの不良な難治性てんかんに対する外科

的治療が行われるようになり，てんかんの焦点部位の同定が重要な課題となってきた¹⁾。フッ素 18 標識フルオロデオキシグルコース (FDG) を用いたポジトロン断層撮影 (PET) 検査は，てんかんの焦点を高い感度で検出できることが報告されており，臨床検査法として導入されることによって，焦点部位の同定と手術適応の決定に貢献し，侵襲的な深部電極や硬膜下電極による記録を減少させることが期待される^{2),3)}。そこで，全国の PET 施設に対して調査を依頼して，難治性てんかんの診断における FDG-PET の医療経済効果について調べた。

2. 調査対象および方法

難治性てんかん患者で，発作焦点の切除術を受けるための術前検査として FDG による PET 検査を施行した例を対象としてアンケート調査を実施した。アンケート調査の項目を表1に示す。

表1 アンケート調査項目

- 1) 患者情報 (ID, 年齢, 性別)
- 2) 発作の種類と期間
- 3) 頭皮上脳波記録による発作焦点の推定
- 4) MRI 検査所見
- 5) 長時間ビデオモニタリング (発作焦点の推定，手術適応決定の有無)
- 6) 頭蓋内脳波記録 (方法，結果)
- 7) 焦点切除手術 (様式，結果)
- 8) FDG-PET 検査 (方法，結果)

3. アンケート調査協力機関と担当者

全国の5施設からアンケート調査の協力が得られた。これらの協力機関と担当者を表2に示す。

表2 アンケート調査協力機関と担当者

協力機関	担当者
京都大学医学部附属病院	池田昭夫
九州大学医学部附属病院	桑原康雄
国立精神・神経センター	松田博史
東京都老人総合研究所	千田道雄
名古屋市総合リハビリテーションセンター	飯田昭彦

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

(1) 集計症例

全国の五つの施設から 82 症例の調査データを集めることができた。このうちで、明らかに部分てんかんとは考えられない 2 例を除く 80 例を解析対象とした。なお、このうちで実際に手術が施行されたのは 65 症例であった。

(2) 画像診断によるてんかん原性焦点の検出

部分てんかんの焦点を検出するための画像診断法としては、形態異常をとらえる MRI が普及している。FDG-PET は、焦点およびその周囲における代謝の低下を鋭敏に検出できる特徴があり、特に側頭葉てんかんにおける焦点の検出率に優れていると報告されている^{4),5)}。今回のアンケート調査でもこれを支持する結果が得られた。表 3 に MRI と FDG-PET による異常の検出率を示す。FDG-PET により、診断の確定できた側頭葉てんかん 44 例のうち 38 例 (86%) で焦点が代謝の低下した領域として検出できた。これは、MRI よりも優れており、従来の報告と一致する結果である⁴⁾。

てんかんの焦点検出には、MRI や FDG-PET 以外にも、脳血流 SPECT 検査の有用性が報告されている。しかし、安静状態で施行する脳血流 SPECT の検出率は FDG-PET ほど高くない。また、てんかん発作による脳血流増加をとらえる発作時脳血流 SPECT 検査は、放射性医薬品を投与するタイミングによって、さまざまな脳血流のパターンを示すことから、その診断は必ずしも容易でない⁶⁾。FDG-PET は、焦点を中心とする広い領域で著明な代謝の低下を示すことが多く、現時点で臨床的に利用できる

る最も優れた診断法と考えられる。

4.2 医療経済効果について

(1) 調査前の仮定

FDG-PET は、側頭葉てんかんにおける病変側の決定には優れた検出能を有することが報告されており、今回のアンケート調査でもこれを支持する結果が得られた。内側側頭葉てんかんでは、焦点を含む広い領域が代謝の低下を示すことが多い。側頭葉以外に発作の起源があるてんかん焦点の検出能は必ずしも十分ではないが、手術によるてんかん焦点の切除を目的として行う術前検査法としての有用性が高いと考えられている⁴⁾。

難治性部分てんかんの外科的治療では、焦点部位の同定と手術適応の決定に画像診断が重要な役割を果たしている。最終的には、深部電極や硬膜下電極を用いる頭蓋内脳波記録によって、発作の焦点を同定し切除範囲を決定するが、画像診断の所見が臨床所見や脳波所見と一致する場合には、侵襲的な頭蓋内脳波記録を省略して手術を施行できる場合がある。図 1 に、難治性側頭葉てんかんの焦点切除術にいたる診断過程を示すフローチャートを提示する。非侵襲的長時間ビデオ脳波モニタリングで発作時脳波をとらえて、側頭葉前内側からの発作開始が確認された場合に、その結果が MRI による海馬の萎縮や硬化と一致すれば、頭蓋内脳波記録を行わなくても切除手術を施行できる⁴⁾。この際に、FDG-PET 検査を加えることによって、頭蓋内脳波記録検査を省略できる例が増加すれば、医療費の軽減に結びつくと考えられる。

長時間ビデオ脳波モニタリング、画像所見、神経心理学的検査などで、手術適応から除外される例を除いて、長時間ビデオ脳波モニタリングにより側頭葉内側起源の発作発射が観察される割合を 60% と仮定する。MRI の診断精度を 60%^{4),5)} とすると、MRI による画像診断所見が一致する例 (36%) で頭蓋内脳波記録が省略できると推定される。この際に、FDG-PET 検

表 3 MRI と FDG-PET によるてんかん焦点の検出

検査	解析対象例	側頭葉てんかん*
MRI	44/80(55%)	31/44(70%)
FDG-PET	51/80(64%)	38/44(86%)

*診断確定例のみを対象とした

図 1 難治性側頭葉てんかん患者の外科的切除術にいたる flow chart

査を行うことによって診断精度が 80% まで向上すると仮定すると⁴⁾、頭蓋内脳波記録を省略できる例が 48% になり、MRI 単独の場合と比べて比べて 12% 増加することになる。

(2) アンケート調査による結果と考察

難治性てんかんで手術を目的として PET 検査を受けた 80 例のうちで、術前検査により手術適応の除外された症例が 11 例あった。脳波所見と MRI 所見が一致し手術が施行されたのは 15 例 (19%) で、これらの症例では侵襲的な頭蓋内脳波記録が省略されていた。これに FDG-PET 検査を加えることによって、頭蓋内脳波記録なしに手術ができると考えられた例が 6 例 (7.5%) あった。この結果に基づいて、FDG-PET による医療経済効果を計算した。

頭蓋内脳波記録は、1-2 週間の入院を必要とし、記録の前後に 2 回の手術が行われる。深部電極 (8-14 万円×2-6 本) または硬膜下電極 (6-21 万円×2 枚) の費用を含めると、1 例あたり平均して 180 万円程度の経費がかかっていると推定される。FDG-PET 検査を追加することによって、7.5% で頭蓋内脳波記録を省略できると仮定すると、表 4 に示すように 1 人あたり 6 千円の医療費を節約できることにな

る。この場合の FDG-PET による医療費の軽減はわずかであったが、これは PET 検査を実施することによって、頭蓋内脳波記録を行わなくても焦点の切除術施行できると答えた結果が、80 例中で 6 例 (7.5%) にとどまったためと考えられる。アンケート調査を行う前には、FDG-PET を施行することによって診断精度の向上が期待できるので、頭蓋内脳波記録を行わなくてもすむ症例が 12% 程度増加するのではないかと予測した。今回の調査結果でこの割合が低かったのは、調査対象に側頭葉てんかん以外の例がかなり含まれていたためと考えられる。そこで、アンケート調査の結果から側頭葉てんかんと考えられる 44 例のみを抽出して考察すると、5 例 (11.4%) で頭蓋内脳波記録を省略できる結果となり、1 例あたり 7 万 6 千円の医療経費削減効果が得られると推測された。この値は、アンケート調査を実施する前の予測とほぼ一致する結果であり、アンケート調査の母集団は小さいものの、調査結果には大きな偏りが無いことがうかがえる。

難治性部分てんかんの手術例は最近増加しつつある。米国では年間に 15 万人の患者が新たに発症し、そのうちで 10-20% が難治性と推

表 4 FDG-PET による医療費の軽減

全例を対象としたとき			
必要な経費	PET 検査		12万 9 千円
節約できる経費	頭蓋内脳波記録	180万円×7.5%	13万 5 千円
差し引き			6 千円
側頭葉てんかんを対象としたとき			
必要な経費	PET 検査		12万 9 千円
節約できる経費	頭蓋内脳波記録	180万円×11.4%	20万 5 千円
差し引き			7万 6 千円

測されている。年間の手術件数も、1985年の500例から1990年には1500例に増加し、年間に2000例から5000例の潜在的な患者が存在すると推定されている⁷⁾。わが国では1995年までに約1000例の手術例が報告されているが、今後この数はますます増加すると考えられる。

難治性部分てんかんの外科的手術では、焦点の同定とともに切除範囲の決定が重要な問題となる。FDG-PET 検査が焦点の検出に優れていることはすでに多くの報告があるが、焦点を含むかなり広い領域で代謝が低下するという特徴がある。この点では、MRI による形態異常の診断と組み合わせた診断が必要になると考えられる。

5. ま と め

全国の PET 施設にアンケート調査を実施して、難治性てんかんの診断における FDG-PET の医療経済効果について調べた。FDG-PET は、部分てんかんの焦点検出に優れており、特に側頭葉てんかんでは焦点部位の同定と手術適応の決定に貢献し、侵襲的な頭蓋内脳波記録を減少させて医療費の軽減に役立つことが明らかになった。

文 献

- 1) Engel, J., Jr. : *Neurology*, **43**, 1612-1617 (1993)
- 2) Engel, J., Jr. : *Current Concepts*, **334**, 647-652 (1996)
- 3) Lesser, R. P., Fisher, R. S. and Kaplan, P. : *Electroenceph. Clin. Neurophysiol.*, **73**, 381-388 (1989)

- 4) 加藤元博, 荒木武尚 : 神経研究の進歩, **38**, 738-746 (1994)
- 5) Engel, J. Jr., Henry, T. R., Risinger, M. W., Mazziotta, J. C., Sutherling, W. W., Levesque, M. F. and Phelps, M. E. : *Neurology*, **40**, 1670-1677 (1990)
- 6) Ramsay, S. C., McLaughlin, A. F., Greenough, R., Walsh, J. and Morris, J. C. : *J. Nucl. Med.*, **33**, 438-440 (1992)
- 7) NIH Consensus Panel : *JAMA*, **264**, 729-733 (1990)

第 2 章 FDG-PET 検査 (心臓) の臨床的有用性と医療経済効果に関する報告

西村恒彦

大阪大学大学院医学系研究科
トレーサ情報解析学研究室

1. はじめに

急性心筋梗塞において、左室駆出率 35% 以下で心不全を有する症例は梗塞症例の約半数以上にみられ、米国では 2% の頻度で心不全死を認めている。このような患者において、内科的療法、冠血行再建術 (バイパス術)、心移植などの治療法の選択が考えられるが、わが国では前 2 者が中心となる。内科的療法は強心薬や新しい心不全治療剤が開発されている現在でもなお十分な治療効果はなく、本症の予後は不良で

ある。一方、バイパス手術は正確に心筋 viability の評価が行われる症例では、心機能が改善することからその有用性が認められるが、米国では 5 - 30% 前後の死亡率、10 - 15% の合併症が報告されており、その適応決定は大切である。

現在の術前検査では安静時 ^{201}Tl 心筋 SPECT が心筋 viability の評価法として優れた検査法であるが、accuracy は 70% 前後であり十分とはいえない。一方、 ^{18}F -FDG (FDG) の導入により、壊死心筋と viable な心筋をより正確に鑑別できることになる。したがって、バイパス手術の適応患者を正確に選択でき、不必要なバイパス手術が減らせ、患者の負担や入院に要する費用を削減することができる。本報告では FDG 心筋 PET の有用性に関する全国実態調査の一環として行われた心臓疾患における FDG 心筋 PET の役割について、さらに FDG 心筋 PET の医療経済効果に果たす役割について米国 ICP (Institute for Clinical PET) の報告に基づいて作成した案を示す。

2. 調査対象

下記に示す全国 6 施設から集計した 227 例を対象とした。

3. アンケート調査機関と担当者 (敬称略)

京都大学医学部附属病院	核医学
	多田村栄二
大阪市立大学医学部附属病院	第一内科
	山岸 広幸
国立循環器病センター	放射線診療部
	石田 良雄
名古屋市総合リハビリテーションセンター	
放射線診断科	飯田 昭彦
医療法人社団松窓会	金沢循環器病院
	関 宏恭
大阪大学大学院医学系研究科	
トレーサ情報解析	長谷川新治

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

FDG-PET の検査目的は、心筋 viability 評価 (59%)、治療効果の判定 (24%)、心筋虚血の検出 (17%)、治療方針の決定 (13%)、重症心不全の評価 (12%) の順であった。投与量は 370 MBq 以上を約半数の施設 (51%) で用いていた。大部分 (96%) は static study であった。静注後 40 分前後から 10 - 15 分間の撮像が一般的であった。全例空腹時絶食状態で、85% の症例でトレラン G による糖負荷法を併用していた。86% の症例で血糖値の測定を行っていた。FDG の集積の評価は 90% が視覚的評価、10% がパトロック定量法であった。

FDG 心筋 PET の有用性に関しては、「極めて有用」21%、「有用」67% で、両者あわせて 88% であった。有用性に関しては、その検査目的は心筋 viability 評価、治療効果の判定、方針決定および重症心不全の順であった。しかし、今回の調査はあくまでも各施設独自の判断に基づく集計であり、各施設間での有用性に関しては、「極めて有用」9 - 83%、「有用」17 - 76%、「有用性なし」0 - 15%、と幅広く分布しており、統一したプロトコールでの多施設共同研究が今後望まれる。

4.2 PET による医療経済効果について

FDG 心筋 PET の経済性に関する検討は本邦では進んでいないが、米国 ICP により試算されている。急性心筋梗塞後の心不全症例におけるバイパス手術の適応決定に関する ICP の試算によると、FDG 心筋 PET の導入により冠動脈造影が 114075 件から 81767 件に、バイパス手術が 58178 件から 51004 件に、外科合併症が 6981 件から 6120 件に減少させられることが、全体として約 3 億ドルの医療費 (患者当たり約 2600 ドル) を削減できることが報告されている。

わが国において、これらに関する統計資料が

表 1 FDG 心筋 PET の導入による医療経済効果（急性心筋梗塞における心不全合併症）

	冠動脈造影	バイパス手術	PET 検査	計
従来の診断手順による件数	5 500件	2 750件		
患者 1 人当たり（平均）	20万円	300万円		[170万円]
	110 000万円	825 000万円		935 000万円
FDG 心筋 PET を用いた場合の件数	3 850件	2 475件	5 500件	
患者 1 人当たり（平均）	20万円	300万円	[13万円]	[162万円]
	77 000万円	742 500万円	71 500万円	891 000万円
FDG 心筋 PET による回避できた件数	1 650件	275件		
患者 1 人当たり（平均）	20万円	300万円		[21万円]
FDG 心筋 PET により削減された費用	33 000万円	82 500万円		115 500万円
	1 人当たり			[8 万円]

米国ほど明らかにされていないが、米国の基準を参照しながら FDG 心筋 PET の医療経済効果について算出すると以下になる。わが国において年間 110 000 人の急性心筋梗塞患者が発症し、このうち 5 % が心不全を合併するものと推測される。FDG 心筋 PET を用いた場合、米国で約 30 % で冠動脈造影が減少されると報告されている。したがって、わが国においても同様の比率で冠動脈造影を減少させるものと仮定すると、 $110\,000 \times 0.05 \times 0.70 = 3\,850$ 件となる。また、FDG 心筋 PET の導入により、バイパス手術の患者数が 5 % 減少させられると試算されている。したがって、同様にこの基準を当てはめることとする。さらに、冠動脈造影の費用は手技料、使用薬剤、手術機材、入院費用等も考慮して約 20 万円、バイパス手術の費用は手技料、麻酔科、入院費用等も考慮して約 300 万円要するものとする。これらの数値を用いることにより、表 1 のごとく FDG 心筋 PET の急性心筋梗塞の心不全症例における医療経済効果を算出することができる。全体で 11 億 5 500 万円（1 人当たり 21 万円：ただし PET 検査が 13 万円とすると 8 万円）の削減をもたらすものと期待される。

なお、梗塞後狭心症の PTCA の適応決定における FDG 心筋 PET の有用性については、正確な統計がないため推定に過ぎないが、 ^{201}Tl 心筋 SPECT に加え、FDG 心筋 PET 検査によ

り無用な冠動脈造影とともに不必要な PTCA を減少することが可能であること、また、PTCA では再狭窄が約 30 % 出現するため PTCA 施行数が増加することになり、その医療経済効果は大きいものと推定される。とりわけ、PTCA において、最近ステントなどの改良とともに再狭窄率は多少減少しているが、PTCA に要する費用が爆発的に増加していることを考えれば、FDG 心筋 PET 検査で PTCA の適応決定を正確に決定でき、不必要な PTCA を減少させることができれば、医療経済効果はきわめて大きいものと推定される。

5. ま と め

FDG 心筋 PET は心筋 viability 評価に有用であり、これに基づき医療経済効果上からもきわめて有意義な検査法である。

文 献

- 1) Maddahi, J. et al. : Role of thallium-201 and PET imaging in evaluation of myocardial viability and management of patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction, *J. Nucl. Med.*, **35**, 707-715 (1994)
- 2) Kron, I. L. et al. : Coronary revascularization rather than cardiac transplantation for chronic ischemic cardiomyopathy, *Ann. Surg.*, **210**, 343-352 (1989)

- 3) Gropler, R. J. et al. : Dependence of recovery of contractile function on maintenance of oxidative metabolism after myocardial infarction, *J. Am. Coll. Cardiol.*, **19**, 989-997 (1992)
- 4) Wittels, E. H. et al. : Medical costs of coronary artery disease in the United States, *Am. J. Cardiol.*, **65**, 432-440 (1990)
- 5) Besozzi, M. C. et al. : Retrospective post-therapy evaluation of cardiac function in 208 coronary artery disease patients evaluated by positron emission tomography, *J. Nucl. Med.*, **33**, 865 (1992)
- 6) Tamaki, N. et al. : Metabolic activity in the area of new fill-in after thallium-201 reinjection : Comparison with positron emission tomography using fluorine 18-deoxyglucoses, *ibid.*, **32**, 673-678 (1991)
- 7) Bonow, R. O. et al. : Identification of viable myocardium in patients with chronic coronary artery diseases and left ventricular dysfunction. Comparison of thallium scintigraphy with reinjection and PET imaging with F-18 fluorodeoxyglucose, *Circulation*, **83**, 26-37 (1991)
- 8) Perrone-Filardi, P. et al. : Regional left ventricular wall thickening. Relation to regional uptake of F-18 FDG and Tl-201 in patients with chronic coronary artery disease and left ventricular dysfunction. *ibid.*, **86**, 1125-1137 (1992)
- 9) Ragosta, M. et al. : Quantitative planar redistribution Tl-201 imaging in detection of myocardial viability and prediction of improvement in left ventricular function after coronary bypass surgery in patients with severely depressed left ventricular function, *ibid.*, **86**, 1630-1641 (1993)
- 10) Louie, H. W. et al. : Ischemic cardiomyopathy : Criteria for coronary revascularization and cardiac transplantation, *ibid.*, **84**(supple III), 290-295 (1991)
- 11) Eitzman, D. et al. : Clinical outcome of patients with advanced coronary artery disease after viability studies with positron emission tomography, *J. Am. Coll. Cardiol.*, **20**, 559-565 (1992)
- 12) Di Carli, M. et al. : Value of metabolic imaging with positron emission tomography for evaluating prognosis in patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction, *Am. J. Cardiol.*, **73**, 527-533 (1994)
- 13) Tamaki, N. et al. : Prognostic value of an increase in fluorine-18 deoxyglucose uptake in patients with myocardial infarction : Comparison with stress thallium imaging, *J. Am. Coll. Cardiol.*, **22**, 1621-1627 (1993)
- 14) Schelbert, H. et al. : Position statement : Clinical use of cardiac positron emission tomography, *J. Nucl. Med.*, **343**, 1385-1389 (1993)
- 15) Dilsizian, V. et al. : Regional thallium uptake in irreversible defects. Magnitude of change in thallium activity after reinjection distinguishes viable from non-viable myocardium, *Circulation*, **85**, 627-634 (1992)
- 16) Hochberg, M. S. et al. : Coronary artery bypass grafting in patients with ejection fractions below forty percent, *Thorac Cardiovasc. Surg.*, **86**, 519-527 (1983)

第3章 肺腫瘍 FDG-PET 診断の多施設アンケート調査および病期診断における医療経済効果の検討[†]

窪田和雄^{*1,*}, 福田 寛^{*1}, 伊藤正敏^{*2}, 井上登美夫^{*3}, 遠藤啓吾^{*3}, 田所匡典^{*4}, 石垣武男^{*4}, 中本裕士^{*5}, 小西淳二^{*5}, 桑原康雄^{*6}, 佐々木雅之^{*6}, 河邊譲治^{*7}, 越智宏暢^{*7}, 米倉義晴^{*8}, 石田良雄^{*9}, 福地一樹^{*9}, 飯田昭彦^{*10}, 東 光太郎^{*11}, 山本 達^{*11}, 井出 満^{*12}, 安田聖栄^{*12}, 巽 光朗^{*13}, 西村恒彦^{*13}, 小坂 昇^{*14}, 原 敏彦^{*14}, 伊藤健吾^{*15}, 鳥塚達郎^{*16}, 尾内康臣^{*16}, 鳥塚莞爾^{*17}

^{*1} 東北大学加齢医学研究所

^{*2} 東北大学

サイクロトロン RI センター

^{*3} 群馬大学医学部

^{*4} 名古屋大学医学部

^{*5} 京都大学大学院医学研究科

^{*6} 九州大学大学院医学研究科

^{*7} 大阪市立大学医学部

^{*8} 福井医科大学

^{*9} 国立循環器病センター

^{*10} 名古屋市総合リハビリ

テーションセンター

^{*11} 金沢循環器病院

^{*12} 山中湖クリニック

^{*13} 大阪大学大学院医学研究科

^{*14} 国立国際医療センター

^{*15} 国立中部病院長寿医療研究センター

^{*16} 県西部浜松医療センター

^{*17} 京都大学・福井医科大学名誉教授

1. はじめに

¹⁸F フルオロデオキシグルコース (FDG) を用いたポジトロン断層 (PET) は腫瘍診断に高い臨床的有用性が認められているが、1999年12月現在未だ日本では保険診療には認められてい

ない。今後の診療への活用と普及を推進させ、保険承認を促進するために、FDG-PET による肺腫瘍診断の日本における実態調査を行った。また、この結果に基づく医療経済効果の分析を行ったのであわせて報告する。

2. 調査方法

1997年8月から98年7月までの1年間に、国内の PET 施設で FDG を用いて PET 検査が行われたすべての肺腫瘍症例の診断について後ろ向きアンケート調査を計画した。全国の 25 PET 施設にアンケートを送り、15 施設から肺腫瘍症例の回答が得られた。実際には、施設の事情によりこの期間が前後したり、またこの期間よりさかのぼって、複数年のより多くのデータを提供していただいた施設がいくつもあった。アンケート調査協力 15 施設と担当者を Table 1 に示す。

3. 各施設の検査方法、評価方法、副作用

Table 2 に各施設の検査方法、評価方法、症例数を示す。ほとんどの施設では FDG を投与後、40 分から 60 分に撮像を行っている。胸部を中心にスタティックな撮像を行う施設と、全身撮像を行う施設がほぼ半々で、少数の施設で動態撮像を行っていた。ほとんどの施設で吸収補正が行われていた。前処置として、数時間の絶食が行われていた。これは、心筋などへの FDG 集積を低下させ、肺癌への FDG 集積を増加させることを考慮しているものと思われる。評価法としては視覚評価と SUV^{**} を併用しているものが大半であった。臨床目的では、視覚的評価で十分であるが、データとして残すために SUV も測定しているという施設や、

^{**} SUV: standardized uptake value, SUR または DUR など同義語。

$$SUV = \frac{\text{関心領域の放射能 (cpm)} / \text{関心領域の体積 (cm}^3 = \text{g)}}{\text{投与放射能 (mCi)} / \text{患者体重} \times \text{キャリブレーションファクター (cpm/mCi)}}$$

(比重 1 と仮定)。

* 集計執筆責任者窪田和雄 (連絡先: 980-8575 仙台市青葉区星陵町 4-1 東北大学加齢医学研究所機能画像医学研究分野 電話 022-717-8559 Fax: 022-717-8560)

[†] 本誌 Vol. 49, No. 3「原著」を再掲。

Table 1 List of institutions and name of participants for the survey of FDG-PET for lung cancer

1	東北大学加齢医学研究所 東北大学サイクロترون RIセンター	窪田和雄, 福田 寛 伊藤正敏	Tohoku University	Kubota K, Fukuda H, Ito M
2	群馬大学医学部	井上登美夫, 遠藤啓吾	Gumma Univ.	Inoue T, Endo K
3	名古屋大学医学部	田所匡典, 石垣武男	Nagoya Univ.	Tadokoro Y, Ishigaki T
4	京都大学医学部	中本裕士, 小西淳二	Kyoto Univ.	Nakamoto H, Konishi J
5	九州大学医学部	佐々木雅之, 桑原康雄	Kyushu Univ.	Sasaki M, Kuwabara Y
6	大阪市立大学医学部	河邊譲治, 越智宏暢	Osaka City Univ.	Kawabe J, Ochi Y
7	福井医科大学	米倉義晴	Fukui Med. Univ.	Yonekura Y
8	国立循環器病センター	福地一樹, 石田良雄	National cardiovascular center	Fukuchi K, Ishida Y
9	名古屋総合リハビリ センター	飯田昭彦	Nagoya city rehabilita- tion center	Iida A
10	金沢循環器病院	東 光太郎, 山本 達	Kanazawa cardiovascular hospital	Higashi K, Yamamoto T
11	山中湖クリニック	井出 満, 安田聖栄	HIMEDIC imaging center at lake Yamanaka	Ide M, Yasuda S
12	大阪大学医学部	巽 光朗, 西村恒彦	Osaka Univ.	Tatsumi M, Nishimura T
13	国立国際医療センター	小坂 昇, 原 敏彦	International Medical Center	Kosaka N, Hara T
14	国立中部病院長寿医療 研究センター	伊藤健吾	Nat. Inst. for longevity sciences	Ito K
15	県西部浜松医療センター	鳥塚達郎, 尾内康臣	Hamamatsu medical center	Torizuka T, Ouchi Y

注) 調査時の担当者

SUV で判定するという施設もあり統一は取れていない。後ろ向きアンケート調査ではコントロールが難しいところでもある。すべての施設で(合計 600 例)副作用の経験は一例もなく、FDG の安全性はきわめて高いと考えられる。また検査のトラブルとしては、FDG の合成失敗、上肢を挙上して胸部の撮影を行ったための肩の痛み、患者の撮影中の体動の3件が報告された。

4. 臨床的有用性についての調査結果 および考察

(1) 15 施設すべてより有効なデータの提供があった。記載方法に少しばらつきがあったが、可能な限りのデータの抽出を試みた。期間は 97-98 の 1 年間で 8 施設で最も多かったが、最長 87-98 の 12 年でもかなりばらつきがあった。平均は 2.8 年。症例の合計は 600 例に達した。

(2) 鑑別診断の見地から悪性腫瘍は各組織型の sensitivity (FDG 陽性/陽性+陰性)を、良性腫瘍は疾患別の specificity (FDG 陰性/陽性+陰性)を求め、ついで全体の診断成績を求めた。

Table 3 に結果を示す。肺腫瘍の良性悪性の鑑別診断の結果は、sensitivity 81.1% (322/397), specificity 63.5% (54/85), accuracy 78.0% (376/482) であった。

これまでの、単独施設からの報告¹⁾⁻³⁾に比べてこの成績はよくない。最近、金沢循環器病院で東らは、肺胞上皮癌の FDG 集積が低く偽陰性となることを報告している⁴⁾。このような高分化腺癌の FDG 陰性症例が金沢循環器病院、九州大、大阪市立大の 3 施設から集中して報告されており、これが成績を悪くしている原因の一つと思われる。これまで一般には扁平上皮癌の頻度が高かったと言われてきた。しかし最近の、ヘリカル CT などを用いた肺癌検診で

Table 2 Methods of examination, evaluation, and number of patients of each institution

No of inst.	PET camera	Dose	Methods	Imaging time pst i.v.	Att. corr.	Pre treat.	Blood	Evaluation	Side effect	Trouble	Period	Pts. No
1	Shimadzu Set 2400 W	10	WB	40-60 min	post inj	fast. 5 h, void.	BS	Vis., SUV, T/M	no	no	95/5-98/3	36
2	Shimadzu Set 2400 W	8	WB	45-80	post inj	fast. 5 h, void.	BS	Vis., SUV	no	1.	97/8-98/7	27
3	Headtome 4 and 5	6.5	Dy. St.	50-64	pre inj	fast. 3 h, arm up	no	Vis., SUV = 2.0	no	2.	97/1-98/8	34
4	Hitachi PCT 3600 W	11	St.	55-67	pre inj	fast. 5 h	BS	Vis., SUV	no	no	92/6-98/7	1
5	Headtome 3	5	St.	45-60	pre inj	fast. 6 h	BS	Vis., SUV, T/M	no	3.	87/10-97/7	165
5	ECAT exact HR +	5	St. Dy. WB	60-87	no	fast. 6 h, void.	BS	Vis.	no	no	97/8-98/7	5
6	Headtome 4	6.5	St.	40-55	pre inj	fast. 5 h	BS	Vis., SUV	no	no	93/11-98/7	61
7	GE advance	10	Dy. WB	40-60	pre inj	fast. 4 h, void.	RI, BS	Vis., SUV, Pt	no	no	97/9-98/7	30
8	ECAT exact 47	5	St. WB	40-50	pre inj	fast., void.	no	Vis., SUV	no	no	97/8-98/7	8
9	Hitachi PCT 3600 W	8	St.	55-85	pre inj	fast. 6 h, void.	no	Vis.	no	no	94/10-96/2	3
10	Headtome 4	4.6	St.	40-60	pre inj	fast. 4 h	BS	Vis., SUV	no	no	93/10-98/7	112
11	ECAT exact 47	7	WB	45-60	pre inj, Scr. no		BS	Vis.	no	no	94/10-98/8	23
12	Headtome 4	10	St.	40-70	pre inj	fast.	no	Vis., SUV	no	no	97/8-98/7	24
13	ECAT exact HR	10	WB	40-85	pre inj	fast. 4 h, void.	BS	Vis., T/M	no	no	97/8-98/9	10
14		10	St.	60-80	pre inj	fast.	BS	Vis.				41
15			WB	60-100		fast. 5 h	BS	Vis., SUV				20
	Mean dose	7.77									Pts Total	600

Dose : mCi/60kg Methods : WB ; whole body, St. ; static imaging, Dy. ; dynamic imaging

Att. corr. : attenuation correction, Scr. ; screening

Blood : blood sampling, BS ; blood sugar, RI ; radioactivity

Evaluation : Pt ; Patlak methods, Vis. ; visual interpretation

Trouble : 1. failure of FDG synthesis, 2. shoulder pain due to arm up positioning, 3. patient movements

Table 3-1 Results of differential diagnosis

Cancer histology	Positive	Sensitivity	Benign disease	Negative	Specificity
Small cell	25/26	96.2%	granuloma	16/24	66.7%
Non-small cell	236/289	81.7%	pneumonia	9/15	60%
Alveolar cell	5/13	38.5%	tuberculosis	8/12	66.7%
Other (metastasis etc.)	56/69	81.2%	sarcoidosis	2/6	33.3%
			hamartoma	3/3	100%
			other benign	16/25	64%
Total cancer	322/397	81.1%	Total benign	54/85	63.5%

Accuracy : 78.0% (376/482)

Table 3-2 Non-small cell lung cancer

	Positive	Sensitivity
Adenocarcinoma	112/144	77.8%
Alveolar cell ca.	5/13	38.5%
Squamous cell ca.	85/93	91.4%
Large cell ca.	9/11	81.8%

は微少な高分化肺腺癌が多く見つかる傾向があり、PET 診断を依頼される症例の組織型の分布に以前とは異なる偏りがある可能性がある。多数の症例を検査し、積極的に臨床研究を行っている施設ほど、意外性を期待した症例や、より診断困難なチャレンジケースが多いと思われる。後ろ向きアンケート調査の限界でもある。良性疾患でも、サルコイドーシスへの集積はよく知られており⁵⁾、鑑別診断というよりは病変の分布の診断などで FDG 集積を予期して検査した症例があると思われる。理想的には、診断がついていない結節影などの症例に限って、前向き研究として行うべきであり、そのような状況ではもう少し診断成績の向上が期待できるのではないと思われる。

新しい所見として、各組織型ごとに、検出感

度が異なるという結果が得られた。これまでこのような結果は報告されたことがなく、多数の症例を集めて初めて明らかになった重要なデータであると思う。

(3) ステージ (病期) 診断, 治療評価の項目については, FDG-PET と従来の画像診断を比較した有用性を調査した。

Table 4 に結果を示す。PET が従来の画像診断に優るもの 21.3%(35/164), 同等 73.8%(121/164), 劣るもの 4.9%(8/164)で, 95.1%(156/164) で PET は従来の画像診断と同等またはそれ以上と評価された。鑑別診断に比較して, ステージ診断の方が良好な成績という印象を受ける (次項に述べるように sensitivity, specificity, accuracy とともに 88.3% と計算される)。

さらに治療評価についても, FDG-PET と従来の画像診断を比較した有用性を調査した。Table 5 に結果を示す。PET が従来の画像診断に優るのは 45%(18/40) で, 同等が 25%(10/40), 劣るが 30%(12/40) で, 70%(28/40) で PET は従来の画像診断と同等またはそれ以上と評価された。治療評価については, 症例は

Table 4 Staging of lung cancer with PET compared to conventional imaging

PET>Conv.	PET=Conv.	PET<Conv.
35	121	8
35/164=21.3% Superior to conv.	121/164=73.8% Equal to conv.	8/164=4.9% Inferior to conv.
156/164=95.1% Equal or better than conv.		

Sensitivity, specificity, accuracy were calculated as 88.3% each.

Table 5 Therapy evaluation with PET compared to conventional imaging

PET>Conv.	PET=Conv.	PET<Conv.
18	10	12
18/40=45% Superior to conv.	10/40=25% Equal to conv.	12/40=30% Inferior to conv.
28/40=70% Equal or better than conv.		

少ないが多少問題がありそうである。

(4) 各施設からの肺腫瘍診断についてのコメントには次のようなものがあった。

非常に成績がよい。予期せぬ病巣の発見が主治医に強い印象を与えた。ステージ診断に特に有用。CTでの鑑別診断の難しい症例に有用。転移の診断に使用し、治療方針決定に有用だった。診断は形態画像と組み合わせると有用。形態画像、臨床情報との組合せが有用。治療効果は判定基準が不明。良悪性の鑑別、ステージング、再発の監視に有用。サルコイドーシスのリンパ節にも集積した。肉芽腫等炎症との鑑別が難しい。病巣の検出は従来の画像診断も精度が高い。末梢の小病巣には有用。全身検索にはきわめて有用。治療後の残存腫瘍の有無や、再発部位の評価に有用。肺結節の鑑別診断はやや問題。感度は高いが微小肺癌には限界。偽陽性・偽陰性をよく知る必要がある。

全体のまとめとして、特に鑑別診断については、突出して腺癌が多く、かつ偽陰性が特定の施設に集中しているなどの問題点もあるが、はじめて日本の多施設のデータを調査集計した意義は少なくない。またステージ診断の成績は非常に良好で、各施設の評価も高い。

5. 医療経済効果について

今回の調査結果のデータを用いて、核医学、34, 329-336 (1997) に発表した FDG-PET の医療経済効果⁶⁾と同様な計算を行い検討した。以下にその要点をまとめる。

5・1 鑑別診断

全国の病院で一年間に、検診などの結果肺癌の可能性ありとして調べられる 50 万人を母集

団とし、これから 34 800 の肺癌、465 200 の良性疾患を診断する過程を調べる。

使用するデータ：

胸部 CT の診断データ：代表的な論文データの集計で sensitivity 99.7%, specificity 57.9%

PET の診断データ：本調査, sensitivity 81.1%, specificity 63.5%

費用データ：胸部 CT 45 000 円, 気管支鏡・生検 75 000 円, PET 129 000 円

結果：

PET を使用することにより、気管支鏡・生検の患者数を減らすことができるが、PET の費用が、気管支鏡・生検よりも高額なために、ルチーンに PET を使用するプロトコルは割高で医療経済効果はない。

鑑別診断における PET の適応は、1 回の気管支鏡・生検や喀痰細胞診で診断がつかず、確定診断に難渋する場合や、狭心症など合併疾患のために気管支鏡・生検に危険が伴う場合ではないかと思われるが、これについてはさらに検討が必要である。

5・2 ステージ診断

前記の 50 万人から、胸部 CT, 気管支鏡・生検を経て肺癌と確定診断された 34 696 人を対象とし (60.2%, 20 887 がステージ 1-3 A, 早期で手術適応。39.8%, 13 809 がステージ 3 B-4 で進行癌, 手術不適と仮定する), ステージ診断 (リンパ節および遠隔転移診断) を行い、手術適応を診断する。なお、これは非小細胞癌を対象とした診断モデルである。

使用するデータ：

通常のプロトコルでは、頭部 MRI, 腹部

Fig. 1 Staging of lung cancer, conventional protocol.

CT, 骨シンチグラフィ, 胸部 CT による縦隔リンパ節および遠隔転移診断の精度を, 報告されている胸部 CT による縦隔リンパ節転移の診断精度で代用する。sensitivity 67.1%, specificity 75.1%

PET の診断データ: 本調査について。

今回のアンケートでは, 調査しやすさを優先し, ステージ診断については PET と従来の診断 (conventional) の優劣を聞く方式になっていた。PET > conv. 21.3%, PET = conv. 73.8%, PET < conv. 4.9%。このデータから, sensitivity, specificity を次のようにして推定した。

PET が優れていた 21.3% より劣っていた 4.9% を相殺し, 16.4% の患者でコンベンショナルプロトコルよりも診断精度が向上したと考える。発表されている論文データなどを考慮して, sensitivity, specificity の数字は同じであると仮定する。つまり conv. で誤診され PET で正診となる患者が $34696 \times 0.164 = 5690$ 人いたと考える。これにより sensitivity, specificity, accuracy とともに 88.3% と計算される*。

費用データ:

腹部 CT, 頭部 MRI, 骨シンチグラフィ計 164 000 円 (胸部 CT は鑑別診断と重複するのでここでは算定しない), 肺癌手術・入院 1580 000 円, PET 129 000 円。

結果:

上記の診断データに基づき, Fig. 1 にコンベンショナルな診断プロトコルと患者の流れ

* 検査方法の詳細: 肺癌患者 34 696 人の構成を早期癌 20 887 人と進行癌 13 809 人と仮定する。進行癌 13 809 人にコンベンショナルプロトコルの sensitivity 0.671 を掛けて 9 266 人を得る。これが真の手術不能患者となる。

早期癌 20 887 人にコンベンショナルプロトコルの specificity 0.751 を掛けて 15 686 人を得る。これが真の手術適応となる。

残りの患者, つまり $13809 - 9266 = 4543$ 人が誤った手術適応, $20887 - 15686 = 5201$ 人が誤った手術不能となり, $4543 + 5201 = 9744$ 人がコンベンショナルプロトコルによる誤った診断の合計となる (Fig. 1 を参照)。

本文よりコンベンショナルプロトコルで誤診され, PET で正しく診断される患者が $34696 \times 0.164 = 5690$ 人だから, $9744 - 5690 = 4054$ 人, これが PET による誤診患者の総数となる。PET の sensitivity = specificity (= accuracy) を X とすると, $20887(1-X) + 13809(1-X) = 4054$ となる。これを解いて $X = 0.88316$ を得る。

を, Fig. 2 に PET プロトコルの患者の流れを示した。またこれにもとづく医療費の計算を Table 6 に示した。患者ひとり当たりの検査費用の合計は PET プロトコルの方が安く, PET により 3 万 5 千円の節約となる。手術に

関しては, コンベンショナルプロトコルで進行癌なのに手術適応と誤診され, 不適応の手術が行われた 4543 人が PET により 2930 人減少し, 1613 人になる。早期癌なのに進行癌と誤診された患者 5201 人が 2441 人に減少し, 正

Fig. 2 Staging of lung cancer, PET protocol.

Table 6 Comparison of medical cost of PET and conventional protocol for the staging of lung cancer

	Chest CT	BFS & biopsy	MRI, CT, bone scan	PET	Exam. total	Surgery early disease	Surgery advanced	Surgery total	Total med. cost
Conventional protocol									
pts number	500000	230545	34696			15686	4543	20229	
cost¥/pt	45000	75000	164000			1580000	1580000	1580000	
total cost¥	22.5×10 ⁹	17.3×10 ⁹	5.7×10 ⁹			24.8×10 ⁹	7.2×10 ⁹		
					45.5×10 ⁹			32.0×10 ⁹	77.5×10 ⁹
PET protocol									
pts number	500000	230545		34696		18446	1613	20059	
cost¥/pt	45000	75000		129000		1580000	1580000	1580000	
total cost¥	22.5×10 ⁹	17.3×10 ⁹		4.5×10 ⁹		29.1×10 ⁹	2.5×10 ⁹		
					44.3×10 ⁹			31.7×10 ⁹	76.0×10 ⁹
Difference¥						-4.3×10 ⁹	4.8×10 ⁹		
					1.2×10 ⁹			0.3×10 ⁹	1.5×10 ⁹

しい適応の手術が2760人増加する。その結果手術総数が170件減少する。これにより手術の費用2億7千万円が節約できる。診断の節約とあわせて、全体で約15億円(全肺癌の診断・手術医療費の1.9%)の医療費の節約となる。これを34696で割ると患者一人当たりの節約は約4万3千円となる。

5・3 考察

FDG-PETによる肺腫瘍診断の、日本における医療経済効果については、すでに窪田ら⁶⁾、小須田ら⁷⁾による報告がある。しかし、どちらもPETの診断データは、欧米を中心とした論文発表データを用いており、国内の診断成績をもとにした検討はこれが初めてである。しかし、鑑別診断の症例には、偏りがみられ、これが従来の報告よりも低い鑑別診断成績をもたらしている可能性がある。これはアンケート方式による後ろ向き調査の限界ではないかと思われる。理想的には、期間とプロトコルを定めた、多施設による前向き共同研究が望ましいが、現実には各施設の事情が異なり容易ではない。幸いなことに、ステージ診断では、予想以上によい結果が得られ、これが医療経済効果の検討にも反映されることとなった。

医療経済効果の検討は、明快なわかりやすい結果を得るためには、大胆な仮定と単純化が必要になり、現実離れという批判を受けることになる。逆に、より現実に近いければ複雑になり、モデルとしての明快な結論が得られなくなる可能性がある。たとえば、進行癌で手術適応がないのに手術された場合、合併症の危険が高いだけでなく、術後の早期再発や転移が多く、治癒切除の手術に比べ医療費がかさむ。また、手術適応があるにもかかわらず、ないと誤診された場合は、生命予後の短縮が予想され、これをどのように評価するか問題となる。今回の検討では、鑑別診断とステージ診断と言う、二つの目的に絞って単純なモデルでコンベンショナルな画像診断とPETの比較、その結果として

の手術件数と手術費用の比較を試みた。米国などと異なり、気管支鏡検査や生検などの費用がPETよりはるかに安いいため、鑑別診断にPETをルチーンに使うことに医療経済的なメリットはない。ステージ診断では、PETのほうが検査費用も安く、診断精度が高く、正しい診断に基づく手術適応の決定がなされるため、PETによる医療費の節約、医療経済効果を生じている。

5・4 結論

肺癌と診断された患者のステージ診断にPETを行い、手術適応を決定すると、従来の画像診断による場合と比べて患者一人あたり約4万3千円の節約となり、1年間日本全体では約15億円の節約が期待できる。

文 献

- 1) Kubota, K., Matsuzawa, T., Fujiwara, T., Itoh, M., Hatazawa, J., Ishiwata, K., Iwata, R. and Ido, T.: Differential diagnosis of lung tumor with positron emission tomography: a prospective study, *J. Nucl. Med.*, **31**, 1927-1933 (1990)
- 2) 窪田和雄, 福田 寛: 肺・縦隔腫瘍, (鳥塚莞爾監修); “クリニカル PET—臨床応用のためのガイドブック”, pp. 125-134, 先端医療技術研究所 (1997)
- 3) Coleman, R. E.: PET in lung cancer, *J. Nucl. Med.*, **40**, 814-820 (1999)
- 4) Higashi, K., Ueda, Y., Seki, H., Yuasa, K., Oguchi, M., Noguchi, T., Taniguchi, M., Tonami, H., Okimura, T. and Yamamoto, I.: Fluorine-18-FDG PET imaging is negative in bronchioloalveolar lung carcinoma, *ibid.*, **39**, 1016-1020 (1998)
- 5) Lewis, P. J. and Salama, A.: Uptake of fluorine-18-FDG in sarcoidosis, *ibid.*, **35**, 1647-1649 (1994)
- 6) 窪田和雄, 山田 進, 福田 寛, 斉藤泰紀, 谷田達男, 高橋寿太郎, 山田健嗣: FDG-PETの肺癌診療に及ぼす医療経済効果について。核医学, **34**, 329-336 (1997)
- 7) 小須田 茂, 市原清志, 渡辺真純, 小林英夫, 草野正一: 肺腫瘍 (非小細胞癌) における胸部FDG-PETの医療経済効果に関する判断分析, 核医学, **35**, 395-404 (1998)

第4章 乳腺腫瘍における FDG-PET 検査の有用性と医療経済効果——アンケート調査の集計結果による検討——†

宇野公一*¹, 宮内 充*², 内田佳孝*³,
西村恒彦*⁴, 油谷健司*⁴, 安田聖栄*⁵,
井出 満*⁵, 越智宏暢*⁶, 小西淳二*⁷,
鳥塚莞爾*⁸

*¹西台クリニック画像診断
センター準備室

*²千葉県立がんセンター 乳腺外科

*³千葉大学 医学部放射線科

*⁴大阪大学大学院 医学系研究科
トレーサー情報解析学研究部

*⁵山中湖クリニック画像
診断センター

*⁶大阪市立大学医学部核医学研究室

*⁷京都大学医学研究科核医学・
画像診断学

*⁸京都大学・福井医科大学名誉教授

1. はじめに

欧米諸国に比べ乳癌罹患率は低率だが、近年徐々に上昇しつつある。1993年の乳癌罹患数は27563人で、2000年には28115名となり、胃癌を抜いて女性では最も多い癌となっていると推定される¹⁾。したがって、早期乳癌の発見が死亡数を減らし、早期治療によりQOLの高い延命が可能となる。しかし、腫瘍径2cm以下の早期乳癌や触知不能癌を高率に検出するには、マンモグラフィや超音波などの画像診断法を導入する必要性が高まっている。

近年、欧米では^{99m}Tc-MIBIによるマンモシンチグラフィが診断の手遅れによる医療費の発生を防ぐためと無駄な生検を減らすことを目的に盛んに行われている²⁾。[¹⁸F]2-deoxy-2-fluoro-D-glucose (以下FDG)を用いたPETはより解像度が優れており乳癌への臨床応用が試みられてきた³⁾⁻⁶⁾。米国ではPETの有用性と医療経済効果についての報告もなされてい

る⁷⁾。

そこで著者らは、全国のPET施設でFDG-PETが行われた乳腺腫瘍患者を対象にした日本アイソトープ協会医学薬学部サイクロトロン核医学利用専門委員会PETワーキンググループ(鳥塚莞爾主査)によるアンケート調査結果をもとに、本法の有用性とこの検査を乳癌の一次検査に導入した場合の医療経済効果について検討した。

2. 調査対象

乳癌におけるFDG-PETの有用性として、

①ステージ診断, ②良悪性の鑑別診断, ③再発診断, ④全身のスクリーニング, ⑤治療評価, などがあげられるが、これらの項目についてPETワーキンググループは全国のPET施設にアンケート調査を依頼した。

Table 1に集計した対象症例を示した。

3. アンケート調査協力機関と担当者(敬称略)

千葉大学医学部附属病院	内田佳孝
大阪大学医学部附属病院	西村恒彦
	油谷健司
山中湖クリニック	安田聖栄
	井出 満

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

4.1.1 検査方法

装置はHEADTOME-III, ECAT EXACT47, HEADTOME-Vである。吸収補正のためのトランスミッションスキャンは3施設すべて行っており、FDGの投与量は4, 7, 10mCiと各施設で異なっていた。投与後45分から60分後に15-20分のエミッションスキャンをスタティックで施行しており、2施設で全身スキャンも実施していた。全施設で4時間以上の絶食状態が保たれ、2施設では血糖測定も行われた。

4.1.2.1 ステージ診断

† 本誌 Vol. 49, No. 2「原著」を再掲。

Table 1 Number of cases and Institutions involved in the questionnaire

Institution	Chiba Univ.	HIMEDIC	Osaka Univ.
Loco-regional staging	0	16	33
Diagnosis of primary tumors	69	0	6
Diagnosis of recurrent disease	1	6	0
Whole body screening	0	4	0
Therapy-monitoring	10	0	0
No. of cases	80	26	39
Age, Mean $\pm$ SD	50.0 $\pm$ 11.0	52.3 $\pm$ 11.5	52.8 $\pm$ 11.7

評価方法は視覚的判定（1施設は腫瘍／非腫瘍比を参考）によった。

腫瘍の存在診断は2施設合計49例52部位で（確定診断は手術46例，生検2例，経過観察1例）なされ，正診率は94%であった。真陽性の病理組織型内訳は浸潤性乳管癌（乳頭腺管癌24部位，充実腺管癌12部位，硬癌10部位），アポクリン癌1例および不明2例であった。偽陰性はT1の3例にみられ，2例は硬癌（14mm, 18mm）で，もう1例は非浸潤癌で腫瘍径は測定不能であった（Table 2）。初期の報告^{3)-6), 8)-10)}では高い正診率を示したが，多数例の報告¹¹⁾ではT2ステージでは91.2%，T1ステージでは68.2%と低い検出率であった。今回の結果でもT1で3例偽陰性がみられ現在のPET装置の分解能によるものと考えられる。

4.1.2.2 腋窩リンパ節の診断

確定診断のついた47例55部位において偽陰性は8例あり，sensitivity：65%，specificity：

100%，accuracy：85%であった（Table 3）。やはり初期の少数例の報告では^{3), 6), 8), 10)}，90%以上の正診率であったが，Avrilら¹¹⁾はsensitivity：79%，specificity：96%，Crippaら¹²⁾もおおの85%，91%，89%と報告しており，今回の調査に近い値を示している。T1症例では腋窩リンパ節の描出能も落ちることが認められ，micrometastasesは現在の装置で限界がある。

4.1.2.3 転移の診断

3例の骨転移，1例の対側リンパ節転移が発見された。また転移ではないが10mmの甲状腺癌が偶然検出されFDG-PETの有用性が確認された。骨転移の診断にはFDG-PETが有望視される。骨融解像を示す転移には骨シンチグラフィより検出能が高いとされる¹³⁾。

4.1.3 良悪性鑑別診断

評価方法は視覚的判定と半定量的判定（SUV，腫瘍／非腫瘍比を参考）によった。

Table 2 Diagnosis of primary tumors (52 sites in 49 cases)

	T1	T2	T3	Total	
TP	24	21	4	49	
FN	3	0	0	3	Accuracy=94%

Table 3 Diagnosis of axillary lymph nodes (55 sites in 47 cases)

	FDG-PET	+	-	Total	
Metastases	Positive	15 (7mm)	8 (5mm)	23	() : minimal size
	Negative	0	32	32	
	Total	15	40	55	
	Sensitivity : 65%		Specificity : 100%	Accuracy : 85%	

腫瘍の質的診断は2施設合計75例75部位(確定診断は手術71例,生検3例,経過観察1例)でなされ,視覚的判定および半定量的判定でのおおの sensitivity : 81, 80%, specificity : 69, 81%, accuracy : 79, 80% であった。偽陽性の5例の病理組織型内訳は,乳管内乳頭腫2例,良性葉状腫瘍1例(12mm), 50mmと12mmの線維腺腫2例であった。偽陰性は11例で,非浸潤性乳管癌2例,浸潤性乳管癌9例(乳頭腺管癌5例,充実腺管癌1例,硬癌3例)であった。半定量的判定では1例が真陽性から偽陰性に,2例の偽陽例が真陰性になった。偽陽性になるものとして線維腺腫,炎症組織や乳腺症があり,偽陰性の原因としては乳腺症が合併する場合や1cm以下の腫瘍では部分容積効果によることがわかった^{14),15)}。

4・1・4 再発診断

2施設7例中肺転移が診断されたものは5例,リンパ節再発が1例,再発が疑われた部位に集積がみられず,再発が否定されたもの1例であり,FDG-PETの有用性が評価された。Moonら¹⁶⁾も全身FDG-PETの有用性を高く評価しているが,偽陽性として筋肉,炎症巣,大血管の血液プール,腸管や不明の原因などを挙げている。

4・1・5 スクリーニング

1施設4例に全身FDG-PETが施行され,3例に有効で,15mmの浸潤性乳管癌1例を検出できなかった。

4・1・6 治療評価

1施設10症例で,総線量50-60Gyの放射線治療前後でSUVを用いて評価した。判定時期は照射終了直後で,全例SUVは低下した。CR2例,PR3例,NC5例であった。CR2例とPR1例は生存,その他は死亡した。Janssonら¹⁷⁾はPETが他の方法より早期に化学療法の治療効果判定が可能と述べており,放射線治療においてもその可能性が示唆された。

4・2 医療経済効果について

4・2・1 乳癌診療でどこに医療経済効果が 見いだせるか?

(1) 良悪性の鑑別診断においては超音波,MMG,CT,MRI,組織生検すべてにおいて米国と比較して安価であり,FDG-PET検査はdense breastなど適用は限られるかもしれない。

(2) ステージ診断においては,腫瘍の存在診断はやはり他の画像診断に費用的な面で遅れをとるが,腋窩リンパ節や転移の診断は全身スキャンが可能であるので,骨シンチの代替になりうる。

(3) 再発診断,治療評価においては有効性は認められるが,より安価な他の検査法で代用される可能性があり,今後の検討が待たれる。しかし著者らの経験¹⁸⁾からFDGの腫瘍への集積の強さから患者の予後を予測できる可能性が示された。

(4) 米国国立癌研究所はステージIおよびIIで乳房温存療法を推奨してきた¹⁹⁾。その結果早期乳癌患者では腋窩リンパ節転移が減少し,全例に腋窩リンパ節郭清の必要性がなくなってきた²⁰⁾。ICPが提唱する腋窩リンパ節郭清手術の省略は,わが国においても同様のことが望まれる。米国での手術費用はわが国よりはるかに高額であるが,腋窩リンパ節郭清手術省略による入院費用を節約することでわが国でも本法による経済効果がみこまれるので,この点において検討する。

4・2・2 費用軽減のアルゴリズム

「評価における仮定」を次のように定める。

(1) 毎年の新乳癌患者数は2000年時28000人

(2) 腋窩リンパ節陽性率は25%⁷⁾

(3) 乳房温存療法の適応患者は55%⁷⁾とする。ただし,わが国では1997年で平均40%の温存手術

(4) FDG-PETの腋窩リンパ節の検出率は今回の sensitivity : 65%, specificity : 100% を使う。

一般的アルゴリズムとFDG-PETアルゴリ

ズムを Table 4 に示す。一般的アルゴリズムとしては乳房温存手術と腋窩リンパ節郭清手術を仮に 10 日間入院して行うものとし、その費用は約 66 万円 (Table 5) となる。11550 人が不必要な腋窩郭清手術を施行されたことになる。

FDG-PET アルゴリズムでは FDG-PET で腋窩リンパ節陽性のものは一般的アルゴリズムと同じ入院手術になる。腋窩リンパ節陰性例は日帰り手術で腫瘍摘出術と sentinel lymphadenectomy²¹⁾ を施行される。sentinel リンパ

Table 4 Strategy for Breast Cancer Management

ALND : axillary lymph node dissection, LN : lymph node, SN : sentinel node

Table 5 Comparison of the costs of 2 models relevant to the surgical management of axilla in breast cancer

I) Costs of day surgery	
Consultation	590
Surgery : Partial mastectomy (5cm >)	28500
Lymph node dissection (3cm >)	10000
Drug	2560
Histopathology	11400
Total	¥ 53050
II) Costs of conventional surgery	
Hospitalization (10Days)	153800
Food	7600
Drug	111940
Surgery : Partial mastectomy & Axillary Lymph Node Dissection	198000
General Anesthesia	84650
Post-operative Drain Care	30930
Histopathology	73020
Total	¥ 659940

節の転移が30%と仮定すると3330人はやはり一般的アルゴリズムと同じ入院手術になる。前者の経費は66万円×15400人=101億6400万円となる。後者はPET検査12.9万円×15400人=19億8660万円、手術入院費は{66万円×(4302人+3330人)=50億3712万円}+(5.3万円×11098人=5億8819万円)=56億2531万円、経費軽減は101億6400万円-(19億8660万円+56億2531万円)=25億5209万円となる。

今回、sentinelリンパ節の転移例を3330人としたが、FDG-PETで予想される偽陰性となる転移例は2312人で両者には差がみられた。この理由としては、sentinelリンパ節のmicrometastasesやsentinel lymphadenectomyの成績が未だ施設間で差がみられるからであり、今後の課題である。前述のsentinel lymphadenectomy施行時に色素やRIを用いるが、現在では保険未承認である。11098人がこの対象になり、仮に1万円として1億1100万円で少なくとも年間24億円の経費節約になると推定される。これを1患者あたりに換算すると85715円/患者/年の節約になる。

FDG-PETを乳癌の一次検査に用いると、上腕の浮腫などの合併症のおこる腋窩リンパ節郭清手術を乳房温存療法適用患者の約半数で回避することが可能であった。

5. ま と め

全国3施設から提供された症例から検討した結果、FDG-PETは原発乳癌の存在診断、良悪性の鑑別、腋窩リンパ節を含めたステージ診断、全身の転移検索、再発診断や治療効果判定に非侵襲的方法としてその有用性が評価された。またFDG-PETを乳癌の一次検査に用いることにより、合併症の起こりやすい腋窩リンパ節郭清手術を乳房温存療法適用患者の約半数で回避することが可能であり、かつ年間24億円(85715円/患者/年)の医療費節約が期待された。

文 献

- 1) 富永祐民：第2章罹患率、死亡率の国際比較、乳癌図説臨床「癌」シリーズ、メジカルビュー、9-13 (1996)
- 2) Wagner, S. : Scintimammography cuts surgical biopsy costs, *Innervation*, 9, 3-4 (1996)
- 3) Wahl, R. L., Cody, R. L., Hutchins, G. D. and Mudgett, E. E. : Primary and metastatic breast carcinoma : initial clinical evaluation with PET with the radiolabeled glucose analogue 2-[F-18]-fluoro-2-deoxy D-glucose, *Radiology*, 179, 765-770 (1991)
- 4) Tse, N., Hoh, C. and Hawkins, R. : The application of positron emission tomographic imaging with Fluorodeoxy- glucose to the evaluation of breast disease, *Annals of Surgery*, 216, 27-34 (1992)
- 5) Uno, K., Yoshikawa, K., Imazeki, K., Okada, J., Minoshima, S. and Arimizu, N. : FDG-PET evaluation of breast cancer : A diagnostic role for primary or metastatic and recurrent lesions, *Radiology*, 185, 108 (1992)
- 6) Scheidhauer, K., Scharl, A., Pietrzyk, U., Wagner, R., Gohring, U., Schomacker, . and Schicha, H. : Qualitative [F-18] FDG positron emission tomography in primary breast cancer : clinical relevance and practicability, *Eur. J. Nucl. Med.*, 23, 618-623 (1996)
- 7) Clinical Application and Economic Implications of PET in the Assessment of Axillary Lymph Node Involvement in Breast Cancer : A Retrospective Study. Abstract from the 1994 ICP Meeting.
- 8) Adler, L. P., Crowe, U. P., Al-Kaishi, N. K. and Sunshine, J. L. : Evaluation of breast masses and axillary lymph nodes with [F-18]2-deoxy-2-fluoro-D-glucose PET, *Radiology*, 187, 743-750 (1993)
- 9) Hoh, C. K., Hawkins, R. A., Glaspy, J., Dahlbom, M., Tse, N. Y., Hoffman, E. J., Schiepers, C., Choi, Y., Rege, S., Nitzsche, E., Maddahi, J. and Phelps, M. E. : Cancer detection with whole body PET using 2-[F-18]-fluoro-2-deoxy-D-glucose, *J. Comput. Assist. Tomog.*, 17, 582-589 (1993)
- 10) Nieweg, O. E., Kim, E. E., Wong, W. H., Broussard, W. F., Singletary, S. E., Hortobagyi, G. N. and Tilbury, R. S. : Positron emission tomography with fluorine-18-deoxyglucose

- in the detection and staging of breast cancer, *Cancer*, **71**, 3920-3925 (1993)
- 11) Avril, N., Dose, J., Janicke, F., Ziegler, S., Romer, W., Weber, W., Herz, M., Nathrath, W., Graeff, H. and Schwaiger, M.: Assessment of axillary lymph node involvement in breast cancer patients with positron emission tomography using radiolabeled 2-(fluorine-18)-fluoro-2-deoxy-D-glucose, *J. Natl. Cancer Inst.*, **88**, 1204-1209 (1996)
 - 12) Crippa, F., Agresti, R., Seregini, E., Greco, M., Pascali, C., Bogni, A., Chiesa, C., De Sanctis, V., Delledonne, V., Salvadori, B., Leutner, M. and Bombardieri, E.: Prospective evaluation of fluorine-18-FDG PET in presurgical staging of the axilla in breast cancer, *J. Nucl. Med.*, **39**, 4-8 (1998)
 - 13) Gary, J., Houston, S., Rubens, R., Maisey, M. N. and Fogelman, I.: Detection of bone metastases in breast cancer by F-18 FDG PET: Differing metabolic activity in osteoblastic and osteolytic lesions, *J. Clin. Oncol.*, **16**, 3375-3379 (1998)
 - 14) 宇野公一: F-18-FDG PET を用いた乳癌症例の悪性度評価に関する検討, 加速器産生放射性核種を用いたがんの断層画像診断: 生理, 生化学診断の展開, 文部省科学研究費; 平成 6 年度研究成果報告書 (横山 陽班), 35-44 (1996)
 - 15) Avril, N., Dose, J., Jonicke, F., Bense, S., Ziegler, S., Laubenbacher, C., Romer, W., Pache, H., Herz, M., Allgayer, B., Nathrath, W., Graeff, H. and Schwaiger, M.: Metabolic characterization of breast tumors with positron emission tomography using F-18 fluorodeoxyglucose, *J. Clin. Oncol.*, **14**, 1848-1857 (1996)
 - 16) Moon, D. H., Maddahi, J., Silverman, D. H. S., Glaspy, J. A., Phelps, M. E. and Hoh, C. K.: Accuracy of whole-body Fluorine-18-FDG PET for the detection of recurrent or metastatic breast carcinoma, *J. Nucl. Med.*, **39**, 431-435 (1998)
 - 17) Jansson, T., Westlin, J. E., Ahlstrom, H., Lilja, A., Langstrom, B. and Bergh, J.: Positron emission tomography studies in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer: A method for early therapy evaluation? *J. Clin. Oncol.*, **13**, 1470-1477 (1995)
 - 18) Oshida, M., Uno, K., Suzuki, M., Nagashima, T., Hashimoto, H., Yagata, H., Shishikura, T., Imazeki, K. and Nakajima, N.: Predicting the prognoses of breast carcinoma patients with positron emission tomography using 2-deoxy-2-fluoro [F-18]-D-glucose, *Cancer*, **82**, 2227-2234 (1998)
 - 19) National Institutes of Health: NIH consensus conference on the treatment of early-stage breast cancer, *JAMA*, **265**, 391-395 (1991)
 - 20) Silverstein, M. J., Gierson, E. D., Waisman, J. R. et al.: Axillary lymph node dissection for T1a breast carcinoma; Is it indicated? *Cancer*, **73**, 664-667 (1994)
 - 21) Haigh, P. I., Hsueh, E. C. and Giuliano, A. E.: Sentinel lymphadenectomy in breast cancer, *Breast Cancer*, **6**, 139-144 (1999)

第 5 章 肝腫瘍を疑われた症例における FDG-PET 検査成績の全国調査

小西淳二, 中本裕士, 東 達也

京都大学医学研究科
核医学・画像診断学

1. はじめに

肝腫瘍の診断および治療効果の判定のために行われた FDG-PET 検査の結果について全国調査を行い, その有用性について検討した。

2. 調査対象

1998年7月までに各施設にて肝腫瘍を疑われて FDG-PET 検査が施行された症例を対象とした。術前症例が 123 例, TAE, PEIT などによる治療前後の比較のために検査が行われた症例が 24 例, その他は 29 例で, 合計 176 例が報告された。病変の内訳では悪性病変として肝細胞癌 68 病変, 胆管細胞癌 3 病変, 転移性肝腫瘍 64 病変, 良性病変としては肝膿瘍 16 病変と血管腫多数の記載があった。

3. アンケート調査協力機関と担当者 (敬称略)

岩手医科大学	加藤 章信
東北大学加齢医学研究所	吉岡 孝志
群馬大学医学部附属病院	
富吉 勝美, 井上登美夫	
千葉大学医学部附属病院	岡住 慎一
山中湖クリニック	安田 聖栄
京都大学医学部附属病院	中本 裕士
国立循環器病センター	福地 一樹

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

(1) 検査方法と評価基準

FDG を投与して約 40 - 60 分後に 7 - 15 分のエミッションスキャンを行っており、全施設でトランスミッションスキャンによる吸収補正を行っていた。研究目的以外は静態収集にて評価されていた。FDG 投与前の絶食時間は 4 - 6 時間であった。

病変の評価は FDG 集積の視覚的評価により行っているところが多かったが、 k_3 の値や 60 分後の C_i/C_p を用いる施設 (千葉大) もあった。

(2) 診断能の評価

悪性病変では、肝細胞癌について真陽性 55 例に対して偽陰性 13 例で、感度は 80.9% であったが、胆管細胞癌は 3 例中 3 例を検出し感度 100% であり、これらはすでに報告されているデータとほぼ同様であった¹⁾。

肝転移では結腸癌からの転移で真陽性 17 例、偽陰性 2 例、膵癌からの転移で真陽性 36 例、偽陰性 9 例であり、転移性肝腫瘍として合算すると感度は 82.8% であった。

良性では肝膿瘍 16 例について全例で陽性を示した。血管腫については、真陰性多数と報告された。

肝細胞癌における FDG-PET 検査の意義に関する報告は比較的早くからみられる²⁾⁻⁴⁾。原

発性肝腫瘍の検出においてはさまざまな画像診断法を用いた報告がなされており、US 70 - 80%, CT (CTA, CTAP を含む) 65 - 87%, MRI (MRAP を含む) 62 - 94%, DSA 73 - 90% と言われている⁵⁾⁻¹⁰⁾。FDG-PET 検査では周囲の正常肝に生理的な FDG 集積があること、原発性肝癌にて洗出しの早いものが存在すること、小さな腫瘍がしばしば評価の対象となり PET では空間分解能に限界があることなどにより、他の画像診断法に対する PET の優位性は乏しいと考えられた。

一方、転移巣の検出に関しては、すでに 1982 年に肝臓の転移巣が FDG-PET で陽性に描出されうる可能性が示されている¹¹⁾。他の画像診断法による転移巣の検出能は CT (CTAP を含む) で 89 - 93%, MRI 55 - 95% と報告されており¹²⁾⁻¹⁶⁾、特に比較的新しい MRI 用の造影剤であるフェリデックスを投与して撮像した MRI での診断能が高いが¹⁵⁾、PET では他の形態画像で断定的でない病変を肝転移陽性と診断できることもあり¹⁷⁾、一度に全身を検索できるという長所も加わって術前の病期診断に有用と考えられた。

(3) 治療効果判定についての評価

interventional therapy による治療効果の評価における FDG-PET の意義についてはすでに報告がみられるが⁴⁾、今回の調査ではほとんど回答が得られなかった。

4.2 医療経済効果について

FDG-PET 検査は肝転移の検出に有用であり、病変の広がり判定、すなわち病期診断に役立つ。特に全身用 PET 装置による検査では原発巣の評価と同時に転移巣の描出が可能である。これにより的確な治療方針の決定が行われ、不要な手術を減らせることによる医療費の削減効果が大きいと考えられる。

5. ま と め

原発性肝腫瘍の評価に対する FDG-PET 検

査の有用性には限界があると考えられた。しかし転移性肝腫瘍の検出には比較的に優れ、癌の病期診断に有用であることにより、医療経済効果が大きいと考えられた。

文 献

- 1) Delbeke, D., Martin, W. H., Sandler, M. P., Chapman, W. C., Wright, J. K. Jr. and Pinson, C. W. : Evaluation of benign vs. malignant hepatic lesions with positron emission tomography, *Arch. Surg.*, **133**, 510-515 (1998)
- 2) Okazumi, S., Isono, K., Enomoto, K., Kikuchi, T., Ozaki, M., Yamamoto, H., Hayashi, H., Asano, T. and Ryu, M. : Evaluation of liver tumors using fluorine-18-fluorodeoxyglucose PET : characterization of tumor and assessment of effect of treatment, *J. Nucl. Med.*, **33**, 333-339 (1992)
- 3) Torizuka, T., Tamaki, N., Inokuma, T., Magata, Y., Sasayama, S., Yonekura, Y., Tanaka, A., Yamaoka, Y., Yamamoto, K. and Konishi, J. : In vivo assessment of glucose metabolism in hepatocellular carcinoma with FDG-PET, *J. Nucl. Med.*, **36**, 1811-1817 (1995)
- 4) Torizuka, T., Tamaki, N., Inokuma, T., Magata, Y., Yonekura, Y., Tanaka, A., Yamaoka, Y., Yamamoto, K. and Konishi, J. : Value of fluorine-18-FDG-PET to monitor hepatocellular carcinoma after interventional therapy, *ibid.*, **35**, 1965-1969 (1994)
- 5) Rizzi, P.M., Kane, P. A., Ryder, S. D., Ramage, J. K., Gane, E., Tan, K. C., Portmann, B., Karani, J. and Williams, R : Accuracy of radiology in detection of hepatocellular carcinoma before liver transplantation, *Gastroenterology*, **107**, 1425-1429 (1994)
- 6) Soyer, P., Bleumke, D. A., Hruban, R. H., Sitzmann, J. V. and Fishman, E. K. : Primary malignant neoplasms of the liver : detection with helical CT during arterial portography, *Radiology*, **192**, 389-392 (1994)
- 7) Yu, J. S., Kim, K. W., Lee, J. T. and Yoo, H. S. : MR imaging during arterial portography for assessment of hepatocellular carcinoma : comparison with CT during arterial portography, *Am. J. Roentgenol.*, **170**, 1501-1506 (1998)
- 8) Murakami, T., Kim, T., Oi, H., Nakamura, H., Igarashi, H., Matsushita, M., Okamura, J. and Kozuka, T. : Detectability of hypervascular hepatocellular carcinoma by arterial phase images of MR and spiral CT, *Acta Radiol.*, **36**, 372-376 (1995)
- 9) Fortunato, L., Clair, M., Hoffman, J., Sigurdson, E. R., Sauter, E. R., Barber, L. W. and Eisenberg, B. : Is CT portography(CTAP) really useful in patients with liver tumors who undergo intraoperative ultrasonography (IOUS)?, *Am. Surg.*, **61**, 560-565 (1995)
- 10) Bartolozzi, C., Lencioni, R., Caramella, D., Palla, A., Bassi, A. M. and Di-Candio, G. : Small hepatocellular carcinoma. Detection with US, CT, MR imaging, DSA, and Lipiodol-CT, *Acta Radiol.*, **37**, 69-74 (1996)
- 11) Yonekura, Y., Benua, R. S., Brill, A. B., Som, P., Yeh, S. D., Kemeny, N. E., Fowler, J. S., MacGregor R. R., Stamm, R., Christman, D. R. and Wolf, A. P. : Increased accumulation of 2-deoxy-2-¹⁸F]fluoro-D-glucose in liver metastases from colon carcinoma, *J. Nucl. Med.*, **23**, 1133-1137 (1982)
- 12) Soyer, P., Laissy, J. P., Sibert, A., Azencot, M., Vissuzaine, C., Marmuse, J. P., Achour, E., Hercot, O. and Menu, Y. : Hepatic metastases : detection with multisection FLASH MR imaging during gadolinium chelate-enhanced arterial portography, *Radiology*, **189**, 401-405 (1993)
- 13) Soyer, P., Bluemke, D. A., Hruban, R. H., Sitzmann, J. V. and Fishman, E. K : Hepatic metastases from colorectal cancer : detection and false-positive findings with helical CT during arterial portography, *ibid.*, **193**, 71-74 (1994)
- 14) Megibow, A. J., Zhou, X. H., Rotterdam, H., Francis, I. R., Zerhouni, E. A., Balfe, D. M., Weinreb, J. C., Aisen, A., Kuhlman, J., Heiken, J. P., Gatsonis, C. and Mcneil, B. J. : Pancreatic adenocarcinoma : CT versus MR imaging in the evaluation of resectability-report of the radiology diagnostic oncology group, *ibid.*, **195**, 327-332 (1995)
- 15) Seneterre, E., Taourel, P., Bouvier, Y., Pradel, J., Van Beers, B., Daures, J. P., Pringot, J., Mathieu, D. and Bruel, J. M. : Detection of hepatic metastases : ferumoxides-enhanced MR imaging versus unenhanced MR imaging

- ing and CT during arterial portography, *ibid.*, **200**, 785-792 (1996)
- 16) Pijl, M. E., Wasser, M. N., van Persijn van, Meerten, E. L., Gratama, J. W., van de Velde, C. J., Hermans, J., Elevelt, A. and Bloem, J. L. : Comparison of inversion-recovery gradient and spin-echo and fast spin-echo techniques in the detection and characterization of liver lesions, *ibid.*, **209**, 427-434 (1998)
- 17) Nakamoto, Y., Higashi, T., Sakahara, H., Tamaki, N., Kogire, M., Imamura, M. and Konishi, J. : Contribution of PET in the detection of liver metastases from pancreatic tumors, *Clin. Radiol.*, **54**, 248-252 (1999)

第6章 膵腫瘍を疑われた症例における FDG-PET 検査成績の全国調査

小西淳二, 中本裕士, 東 達也

京都大学医学研究科
核医学・画像診断学

1. はじめに

膵癌は悪性度が高く、その予後が現在でもきわめて不良である。その治療成績の向上のためには的確な術前診断が不可欠と考えられる。本調査では膵腫瘍を疑われた患者を対象に行われた FDG-PET 検査のデータを集め、良・悪性の鑑別診断における FDG-PET 検査の有用性を検討した。あわせて、膵癌の治療効果の判定における FDG-PET 検査の役割について検討するため、経過観察の行われた症例についても調査を行った。

2. 調査対象

1998年7月までに各施設にて膵腫瘍を疑われて FDG-PET 検査が施行された症例を対象とした。手術などの治療前に検査が行われた症例が313例、放射線療法、化学療法等による治療後に比較のために検査が行われた症例が24例、

その他26例で、合計363例が報告された。術前症例の内訳は、悪性疾患が199例、良性疾患が78例であった。悪性疾患の内訳は、膵管癌177病変、粘液性嚢胞腺癌12病変、転移性膵腫瘍5病変、その他が12例であり、良性疾患には漿液性嚢胞腺腫7例、粘液性嚢胞腺腫5例、慢性膵炎45例、偽嚢胞5例、胆管炎1例、その他15病変が含まれていた。さらにガストリノーマ、インスリノーマ等のラ氏島腫瘍22病変が評価された。

3. アンケート調査協力機関と担当者 (敬称略)

東北大学加齢医学研究所	吉岡 孝志
千葉大学医学部附属病院	岡住 慎一
山中湖クリニック	安田 聖栄
名古屋大学医学部附属病院	
	田所 匡典, 加藤 隆司
京都大学医学部附属病院	中本 裕士
大阪市立大学医学部附属病院	河辺 譲治

4. 調査結果および考察

4・1 臨床的有用性について

(1) 検査方法と評価基準

FDGを投与して約40-60分後に7-15分のエミッションスキャンを行っており、全施設でトランスミッションスキャンによる吸収補正を行っていた。研究目的の検査以外は静態収集にて評価されていた。FDG投与前の絶食時間は4-6時間であった。

病変の評価はFDGの集積値を体重と投与量で補正した standardized uptake value (SUV) や肝・骨格筋との比を算出して行っていた。SUVでの良悪のカットオフ値は、施設により2.2から2.7であった。

(2) 診断能の評価

術前症例のうち、(旧型機種のために診断に限界があった1施設を除いた5施設の)271例での膵癌の検出能は、感度89.2% (174/195)、特異性71.1% (54/76)、正診率84.1% (228/

271)であった。ただし良悪の鑑別が病理組織上も困難と考えられるラ氏島腫瘍 22 例を除くと、感度 93.6% (162/173), 特異性 71.1% (54/76), 正診率 86.7% (216/249)であった。

サイズ別では 2 cm 以下の TS1 症例で、全 16 例 (2 施設)のうち 11 例が正診され、感度 68.8%であったが、2 cm を超える TS2 - TS4 症例 (113 例, 3 施設)では感度 100%であった。

他の画像診断法との比較については 2 施設より報告されており、まとめた成績を表 1 に示した。PET 検査は CT や、超音波検査などに比べ、特異性に優れているため、種々の検査法の中で最も高い正診率を示している。膵悪性腫瘍に対する FDG-PET 検査の成績に関するこれまでの報告¹⁾⁻⁴⁾を裏づける成績であった。

問題点として、各施設から指摘されているのは、炎症巣にも FDG が取り込まれるために、偽陽性を呈することがある点である⁵⁾。一般に行われている 1 時間後の撮像に加えて、2 - 3 時間後の遅延像を役立てられないかという試みや、検査時の CRP を参考にするという施設が見られた。

一方、空間分解能が他の画像診断法に比べて劣る割には、偽陰性があまり問題となっていないが、これは膵癌の発見が遅れがちで、PET 検査が依頼されるまでにある程度進行してしまっているためと思われる。

(3) 治療効果判定についての評価

治療効果判定を行っている施設では SUV の推移を評価基準に用いているが、評価の時期については 2 週間 - 1 か月と定まっていない。CRP が陰性化してすぐという評価時期を採用している施設も見られた。有効性については、評価に足る症例数が得られなかった。

4・2 医療経済効果について

従来、膵癌の診断には表 1 に示したような多くの診断法が駆使されている。上述のような PET 検査の持つ優れた特異性に基づき、鑑別に迷う際に PET 検査を行う診断フローチャート (図 1) を作成し、京都大学の症例を対象に、医療経済効果を検討した。

診断フローチャート作成にあたっての方針は次のとおりである。

(1) CA19-9, US, CT はスクリーニング的に行う。

(2) なんらかの異常を認めるとき、まず、低侵襲で病期分類を兼ねる意味の検査、EUS を行う。

(3) US, CT, EUS の 3 検査で一致して膵癌と考えられるものでは、他の検査を省略し、血管造影を行う。3 検査で何らかの不一致、疑問点などがあれば、他の検査法を追加していく。

(4) 膵腺癌か腫瘍形成性膵炎かの鑑別では、PET 検査を良悪性鑑別の決め手とする。

表 1 膵癌に対する各種診断法の検出成績

	PET	CT	US	EUS	ERCP	AG	MRI	CA19-9
TP	79	76	62	51	26	39	23	38
FN	4	7	7	5	2	8	5	27
FP	5	8	7	5	8	2	4	4
TN	19	16	11	13	5	4	4	12
感 度 (%)	95	92	90	91	93	83	82	58
特異性 (%)	79	67	61	72	38	67	50	75
正診率 (%)	92	86	84	86	76	81	75	62

US : 超音波検査, EUS : 内視鏡的超音波検査

ERCP : 内視鏡的逆行性胆・膵管造影, AG : 血管造影

TP : true positive, FN : false negative

FP : false positive, TN : true negative

図 1 脾臓腫瘍診断フローチャート (PET 中心に)
数字は症例数。

(5) その他の充実性腫瘍は基本的に手術とする。

(6) ERCP は、できるだけ省略して、無用の侵襲を避ける。主膵管との交通が疑われる嚢胞成分を持つ症例にかぎり検査を施行する。

(7) 嚢胞成分を持つもののうち、neoplastic tumor は良悪性問わず、基本的に手術とする。

(8) 通常の MRI 検査は省略する。

以上をふまえた診断フローチャートに実際の症例 87 例を当てはめて検討すると、図 1 に示すような分布となった。PET で良悪性の鑑別を行うことになるのは、87 例中 18 例で、そのうち真陽性例は 5 例、偽陽性は 1 例（腫瘤形成性膵炎）、真陰性例は 12 例で、偽陰性例はなかった。

これらの対象症例に実際に行われた診療と比較検討すると、PET 検査の実施により腫瘤形成性膵炎 3 例の手術が避けられる結果であった。したがって、膵尾側切除術 1 例、16 800 点、膵頭十二指腸切除術 1 例、45 000 点、試験開腹術 1 例、4 400 点、加えて、切除術の入院検査諸費用を約 100 000 点 $\times$ 2 例 + 開腹術約 30 000 点 $\times$ 1 例 = 230 000 点と考えて、合計 296 200 点が PET 検査を用いた診断フローチャートにより不要となると考えられた。

一方、手術するべきであったのに、経過観察となる症例はなかった。

ERCP 検査が必要だった例は 9 例であった。実際行われていた ERCP 検査 41 例から、省略可能な ERCP 検査数を差し引き、32 例分、1480 点 $\times$ 32 = 47 360 点が減らせる。

MRI 検査は 36 例で行われていた。省略により 1 050 点 (CT と同一月のため 1/2) $\times$ 36 = 37 800 点の減が期待される。

これに対し、PET 検査が必要な症例は 18 例であり、12 900 点 $\times$ 18 = 232 200 点が必要となる。

以上により、PET 検査を用いた診断フローチャートにより、381 360 点 - 232 200 点 =

149 160 点を節約できると考えられる。

今回対象となった 87 例のうち、悪性膵腫瘍は 69 例で、膵腺癌が 50 例であった。膵癌の罹患数は、1996 年版国民衛生の動向から推定すると、1994 年で、約 15 000 人である。膵腺癌／全悪性膵腫瘍の比率は、膵癌全国登録調査 (1994 年度) によると、73.4/100 で、今回の対象症例における比率 72.5/100 にほぼ一致し、京大症例を対象とした診断フローチャートと同様の診断の流れが期待できると考えられた。

よって、約 217 倍の患者数が全国では存在し、同様の頻度で医療費節減が期待できると仮定すると、PET 検査を用いた診断フローチャートで診療を行えば、年間で約 3 億 2 000 万円の医療費節減につながると考えられた。

今回の調査では、膵腫瘍の鑑別診断に焦点を絞ったが、肝腫瘍の項にも述べられているように、PET 検査は膵癌の肝転移の検出能にも優れている。今後、全身用 PET 装置の普及により、病期診断が的確になされることで、より適切な治療法の選択による医療経済効果が期待される。

5. ま と め

FDG-PET 検査は感度および特異性ともに優れ、249 例の膵腫瘍を疑われた患者における正診率は 86.7 % であった。膵腫瘍の評価に FDG-PET 検査を導入することにより、より非侵襲的、かつ高精度な鑑別診断が可能になることが明らかにされた。これにより、不必要な手術が避けられ、医療費削減効果が期待される。

さらに今後、全身撮像が可能な PET 装置の普及により、FDG-PET 検査は病変の鑑別診断に加え、病期診断へと応用が広がっていくものと考えられ、より大きな医療経済効果をもたらすものと考えられる。

文 献

- 1) Bares, R., Klever, P., Hauptmann, S., Hellwig, D., Fass, J., Cremerius, U., Schumpelick, V.,

- Mittermeyer, C. and Buell, U. : F-18 fluorodeoxyglucose PET in vivo evaluation of pancreatic glucose metabolism for detection of pancreatic cancer, *Radiology*, **192**, 79-86 (1994)
- 2) Inokuma, T., Tamaki, N., Torizuka, T., Fujita, T., Magata, Y., Yonekura, Y., Ohshio, G., Imamura, M. and Konishi, J. : Evaluation of pancreatic tumors with positron emission tomography and F-18 fluorodeoxyglucose : Comparison with CT and US, *ibid.*, **195**, 345-352 (1995)
- 3) Kato, T., Fukatsu, H., Ito, K., Tadokoro, M., Ota, T., Ikeda, M., Isomura, T., Ito, S., Nishino, M. and Ishigaki, T. : Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in pancreatic cancer : an unsolved problem, *Eur. J. Nucl. Med.*, **22**, 32-39 (1995)
- 4) Keogan, M. T., Tyler, D., Clark, L., Branch, M. S., McDermott, V. G., DeLong, D. M. and Coleman, R. E. : Diagnosis of pancreatic carcinoma : Role of FDG PET, *Am. J. Roentgenol.*, **171**, 1565-1570 (1998)
- 5) Shreve, P. D. : Focal fluorine-18 fluorodeoxyglucose accumulation in inflammatory pancreatic disease, *Eur. J. Nucl. Med.*, **25**, 259-264 (1998)

第7章 結腸・直腸癌再発の診断における FDG-PET の有用性と医療経済効果——アンケート調査の結果に基づいた検討——†

伊藤健吾^{*1}, 加藤隆司^{*1}, 稲垣 弘^{*1}, 田所匡典^{*2}, 岡住慎一^{*3}, 内田佳孝^{*4}, 中本裕士^{*5}, 小西淳二^{*5}, 安田聖栄^{*6}, 飯田昭彦^{*7}, 鳥塚莞爾^{*8}

^{*1}国立中部病院長寿医療研究センター
生体機能研究部

^{*2}名古屋大学医学部放射線医学講座

^{*3}千葉大学医学部外科学第2講座

^{*4}千葉大学医学部放射線医学講座

^{*5}京都大学大学院医学研究科核医学・
画像診断学

^{*6}山中湖クリニック画像診断センター

^{*7}名古屋市総合リハビリテーション
センター放射線診断科

^{*8}京都大学, 福井医科大学名誉教授

1. はじめに

結腸・直腸癌の再発とくに局所再発は早期に診断できれば骨盤内臓全摘術の適用などにより長期生存も期待できるが、これまでの血液 CEA の検査では再発に対する感度が低く、注腸 CT, MRI など既存の画像診断では再発と瘢痕の鑑別を含めて十分な診断能が得られなかった。一方, [¹⁸F]fluorodeoxyglucose (FDG)-PET による結腸・直腸癌再発の診断については内外の多くの施設から有用性の報告があり高い診断能が報告されている^{1)~5)}。米国では ICP (Institute for Clinical PET), その他から直腸・結腸癌再発の診断における PET の有用性ととも医療経済効果の検討が報告されている^{6)~8)}。臨床検査としての PET の普及を考えると、検査としての有用性のみならず、医療経済効果の検討を行うことは現在のわが国の政治、社会状況からしても重要と考えられる。そこで ICP と同様の検討を日本アイソトープ協

* 本誌 Vol. 49, No. 2「原著」を再掲。

会医学薬学会サイクロトロン核医学利用専門委員会・PET ワーキンググループによる全国規模のアンケート調査に基づいて行った。

2. 調査対象

結腸・直腸癌局所再発の FDG-PET による診断例を対象としてアンケート調査を行った。Table 1 にアンケートの概要を示す。

3. アンケート調査協力機関と担当者

全国 6 施設よりアンケートの回答があった (Table 2)。

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

4.1.1 アンケートの結果

6 施設から集積された症例数は計 104 例であった。FDG-PET による結腸・直腸癌局所再発の診断に関する症例の選択基準は、① CT, MRI で mass が存在するが再発か癒痕か判定が困難な症例、あるいは ② CEA などの腫瘍マーカーの上昇が見られ再発が疑われるが、CT, MRI などでも再発巣の不明な症例の二つに集約された。

PET 検査は FDG 静注後 50 - 60 分からのスタティックスキャンが多かった。全身スキャン

Table 1 Summary of the questionnaire

- A. Number of patients
- B. Indications
- C. PET procedure
 - 1) Patient preparation
 - 1 Prearrival
 - 2 Preinjection
 - 2) Image acquisition
 - 3) Interventions
 - 4) Estimate of tumor metabolism
- D. The accuracy of FDG-PET
- E. Publications

の実施は 1 施設のみで行われていた。集積評価は 3 施設で視覚的に、2 施設で SUV (standard uptake value) を用いて半定量的に、残り 1 施設では PET counts/plasma counts により行われ、施設により異なっていた。血糖測定用の採血は 3 施設で行われていた。検査時の導尿は 4 施設で持続あるいは一時的に行われていた。

各施設からの診断成績のまとめを Table 3 に示す。診断は各施設おのおのの診断基準に基づいて行われた。全体として結腸・直腸癌局所再発の診断における FDG-PET の診断能は sensitivity 97.5%, specificity 91.7%, accuracy 96.2% であった。

4.1.2 臨床的有用性についての考察

Table 2 Institute and physicians involved in the questionnaire

Institution	Department	Physician	No. of cases
Nagoya University School of Medicine	Radiology	M. Tadokoro	51
Chiba University School of Medicine	Surgery	S. Okazumi	30
Chiba University School of Medicine	Radiology	Y. Uchida	13
Kyoto University Graduate School of Medicine	Nuclear Medicine	Y. Nakamoto	5
HIMEDIC Imaging Center at Lake Yamanaka		S. Yasuda	3
Nagoya Rehabilitation Center	Radiology	A. Iida	2

Table 3 FDG-PET in detecting local recurrence of colorectal carcinoma (n=104)

TP	TN	FP	FN	SEN(%)	SPE(%)	ACC(%)
78	22	2	2	97.5	91.7	96.2

TP: true positive, TN: true negative, FP: false positive, FN: false negative, SEN: sensitivity, SPE: specificity, ACC: accuracy

今回のアンケート結果から FDG-PET による結腸・直腸癌の局所再発診断に関してわが国での実施状況が明らかになった。回答が寄せられたのは 6 施設からで総症例数は予想より少なかったが、実際には少数例を施行している施設はまだあると思われる。

症例の選択基準、スキャンの方法についてはおおむね各施設で共通していたが、画像に大きな影響を与える導尿は必ずしも全施設で行われておらず、血糖の測定も半数の施設で行われているに留まった。また、診断基準に関しても視覚的判定、SUV、その他と統一されておらず、検査の実施から診断までの過程の共通化が望まれる。なお、全身型 PET による検査は 1 施設 2 例と少なかった。

診断基準の違いなどを考慮する必要があるが、今回のアンケート調査からは結腸・直腸癌局所再発の診断における FDG-PET の高い診断能が再確認された。ICP などから報告されている診断能とも合致しており、妥当な結果と考えられる。

4・2 医療経済効果について

4・2・1 医療経済効果の試算

今回のアンケート調査の結果に基づいてわが国における結腸・直腸癌再発の診断における PET の医療経済効果に関する試算を行った。アンケートでは結腸・直腸癌の局所再発を対象としたが、FDG-PET の結腸・直腸癌再発の診断における臨床応用としては全身型 PET の普及に伴って局所再発のほかに肝などを含めた全身の転移検索が一般的になりつつある。そこで医療経済効果の試算にあたっては全身型 PET の利用を前提として考えることとした。

検討の基礎となる数字としてわが国における結腸・直腸癌の罹患数を Fujimoto の将来予測⁹⁾から西暦 2000 年に結腸癌：45 000/年、直腸癌：27 000/年の年間約 72 000 例と仮定し、この値を用いた。全国大腸癌登録¹⁰⁾を参考にし、このうち 75%、54 000 例が根治手術を受

けると予想した。再発率としては全国大腸癌登録¹⁰⁾の 0.44 (局所再発を含むすべての再発)を用いたが、ICP の報告⁶⁾ 0.41 と大差がない。術後の経過観察に用いられる既存の診断手段である CEA, CT, Ba-enema, 内視鏡その他の診断能については日本でのまとまったデータが見つからなかったため、今回は ICP の報告⁶⁾と同じ仮定を用いた。すなわち、個々の診断能には限界があるが、これらの手段の組合せおよび繰返し実施と経過観察により、再発率 0.44 に相当する再発例が発見されると仮定した。厳密に言えばこの段階でも、PET を加える option も含めて細かく検討する余地はあるが、今回は単純化するため PET は開腹手術の代替手段として使用することに限った。PET を用いない場合、ICP の報告に準拠して再発症例のうち 47% が開腹術に受け、さらに再発症例全体の 20% が骨盤内臓全摘術などの根治目的の手術を受けることとした。しかし、開腹術の結果から最終的に根治目的の手術を受ける症例の中には癒着や視野の関係で開腹術のみでは見逃される転移があるため、そのうち 50% は本来は手術適応のない症例と見込まれる。

手術に伴う費用は名古屋大学医学部附属病院での実績から開腹術のみの場合は約 15 万円、骨盤内臓全摘術、肝切除術など根治手術を約 300 万円とした。また、PET の検査費用は PET ワーキンググループで統一して 1 回あたり 129 000 円とした。

PET の診断能に関しては今回のアンケート調査の結果を使用した。ただし、局所以外の肝転移、肺転移などに関するデータはないので局所再発の診断能を準用した。

上記の数字に基づく診断シミュレーションの過程を Fig. 1, 2 に示す。PET(－)プロトコルで行われる根治手術 4 752 例のうち 50% の 2 376 例に真の根治手術適応があり、11 167－2 376＝8 791 例は手術適応がない。これらの 11 167 例を PET(sensitivity 97.5%, specificity 91.7%)で診断すると、PET(＋)プロトコル

Fig. 1 Assessment of recurrent colorectal carcinoma, PET(-) protocol.
H and P: history and physical.

Fig. 2 Assessment of recurrent colorectal carcinoma, PET (+) protocol.

ではPET(-)プロトコルに比べて根治手術が2353例(49.5%)減って2399例になることがわかる。実際の経済効果の計算ではPET(+), PET(-)のおおののプロトコルにおける医療費のうち共通でないPET検査あるいは開腹術以降の過程を比較すればよい。PET(+)プロトコルでは手術が考慮される11167例全例に検査を行うとしてPETの検査費用が $11167 \times 12.9 \text{ 万} = 144054 \text{ 万円}$ 、骨盤

内臓全摘術など根治手術に $2399 \times 300 \text{ 万} = 719700 \text{ 万円}$ 、計863754万円—①必要なのに対し、PET(-)プロトコルでは開腹術のみの $(11167 - 4752) = 6415 \text{ 例}$ に $6415 \times 15 \text{ 万} = 96225 \text{ 万円}$ 、骨盤内臓全摘術など根治手術に $4752 \times 300 \text{ 万} = 1425600 \text{ 万円}$ 、計1521825万円—②必要である。都合、PET(+)プロトコルでは一年あたり②-①=658071万円の節約となる。これをPETあるいは開腹術より

前の段階で再発のために手術が考慮される 11 167 例で割ると一人当たり、589 299 円の節約となる。

4・2・2 医療経済効果の試算についての考察

今回の試算では全身型 PET による結腸・直腸癌再発のスクリーニング検査としての使用を前提とした。実際の再発様式の頻度は全国大腸癌登録¹⁰⁾では肝、局所、肺、腹膜播腫、その他の順で、肝と局所をあわせると約 60% を占める。局所以外の再発に関する PET の診断能のデータが利用できず、局所再発の診断能の値を準用した。肝転移の診断について FDG-PET と通常の単純・造影 CT の比較では、FDG-PET の方が sensitivity, specificity とともに高く、CTAP (CT during arterial portography) と比較しても sensitivity で劣るものの、false positive の多い CTAP より正診率では優るという報告^{11), 12)}があり、その他の報告¹³⁾とあわせても局所再発に対するものと同等の診断能が期待できる。肺、腹膜播腫に関してはまだ十分検討されておらず、今後わが国においても全身型 PET による症例の蓄積が必要と思われる。

試算の結果、わが国全体で年間 658 071 万円の医療費の節約となり、一人当たりでは 589 299 円の節約となった。PET の検査料は開腹術とはほぼ同等に設定されているので、医療費の節減はもっぱら根治手術数の減少に依存している。PET(－)プロトコールでは開腹術から根治手術に移行する割合を再発症例全体の 20% としたが、前述のようにこの中には癒着や視野の関係で開腹術のみでは見逃される転移が、50 - 75% (今回は 50% の値を使用) の症例で見込まれている。これらの症例は本来手術適応のない症例である。これに対し、PET(+)プロトコールでは全身型 PET による検索でこれらの開腹術でも見逃される転移を見つけることにより半数に及ぶ非治癒手術例を回避することになる。そのため結果として医療費が試算のように節減できる。

実際にこのように医療費を節減するためには

結腸・直腸癌再発の診断のために FDG-PET 検査が年間 11 167 例施行される必要があるが、現在の日本の PET 施設の数では困難である。したがって、今後、放射性医薬品としての FDG の供給体制の確立と PET カメラの普及が急務と思われる。

5. ま と め

結腸・直腸癌の局所再発の診断における FDG-PET の有用性に関する全国アンケート調査を行い、その結果に基づいて医療経済効果の検討を行った。アンケート調査からは sensitivity 97.5%, specificity 91.7%, accuracy 96.2% と FDG-PET の高い診断能が再確認された。医療経済効果の試算では、FDG-PET を結腸・直腸癌の再発の診断に導入することで日本全体で年間 658 071 万円の医療費の節約が期待できることがわかった。

謝 辞

手術費用に関してご教示いただいた名古屋大学医学部附属病院第二外科伊藤勝基先生に感謝いたします。

文 献

- 1) Schlag, P., Lehner, B., Strauss, L. G., Georgi, P. and Herfarth, C.: Scar or recurrent rectal cancer. Positron emission tomography is more helpful for diagnosis than immunoscintigraphy, *Archives of Surgery*, **124**, 197-200 (1989)
- 2) Strauss, L. G., Clorius, J. H., Schlag, P., Lehner, B., Kimmig, B., Engenhardt, R., Marin-Grez, M., Helus, F., Oberdorfer, F., Schmidlin, P. et al.: Recurrence of colorectal tumors: PET evaluation, *Radiology*, **170**, 329-332 (1989)
- 3) Ito, K., Kato, T., Tadokoro, M., Ishiguchi, T., Oshima, M., Ishigaki, T. and Sakuma, S.: Recurrent rectal cancer and scar: differentiation with PET and MR imaging, *Radiology*, **182**, 549-552 (1992)
- 4) Schiepers, C., Penninckx, F., De Vadder, N., Merckx, E., Mortelmans, L., Bormans, G.,

Marchal, G., Filez, L. and Aerts, R. : Contribution of PET in the diagnosis of recurrent colorectal cancer : comparison with conventional imaging, *Eur. J. Surg. Oncol.*, **21**, 517-522 (1995)

- 5) Ito, K., Kato, T., Ohta, T., Tadokoro, M., Yamada, T., Ikeda, M., Nishino, M., Ishigaki, T. and Gambhir, S. : Fluorine-18 fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography in recurrent rectal cancer : relation to tumour size and cellularity, *Eur. J. Nucl. Med.*, **23**, 1372-1377 (1996)
- 6) ICP Colorectal Cancer Task Force : Clinical Application and Economic Implications of PET in the Assessment of Colorectal Cancer Recurrence—A Retrospective Study, Abstract from the 1994 ICP Meeting
- 7) Conti, P. S., Lilien, D. L., Hawley, K., Keppler, J., Grafton, S. T. and Bading, J. R. : PET and [^{18}F]-FDG in oncology : a clinical update, *Nucl. Med. Biol.*, **23**, 717-735 (1996)
- 8) Valk, P. E., Pounds, T. R., Tesar, R. D., Hopkins, D. M. and Haseman, M. K. : Cost-effectiveness of PET imaging in clinical oncology, *Nucl. Med. Biol.*, **23**, 737-743 (1996)
- 9) Fujimoto, I., Hanai, A., Tominaga, S. and Kuroishi, T. : Predictions of the incidence of cancer in Japan in the year 2000, *Jpn. J. Cancer Clin.*, **34**, 1911-1916 (1988)
- 10) 大腸癌研究会編 : 全国大腸癌登録調査報告 第5号 昭和55, 56年度症例 (補遺) (1990)
- 11) Vitola, J. V., Delbeke, D., Sandler, M. P., Campbell, M. G., Powers, T. A., Wright, J. K., Chapman, W. C., Pinson, C. W. : Positron emission tomography to stage suspected metastatic colorectal carcinoma to the liver, *Am. J. Surg.*, **171**, (1), 21-26 (1996)
- 12) Delbeke, D., Vitola, J. V., Sandler, M. P., Arildsen, R. C., Powers, T. A., Wright, J. K. Jr., Chapman, W. C. and Pinson, C. W. : Staging recurrent metastatic colorectal carcinoma with PET, *J. Nucl. Med.*, **38**, 1196-201 (1997)
- 13) Abdel-Nabi, H., Doerr, R. J., Lamonica, D. M., Cronin, V. R., Galantowicz, P. J., Carbone, G. M. and Spaulding, M. B. : Staging of primary colorectal carcinomas with fluorine-18 fluorodeoxyglucose whole-body PET : correlation with histopathologic and CT findings, *Radiology*, **206**, 755-760 (1998)

第 8 章 頭頸部腫瘍における FDG-PET 検査成績の全国調査†

越智宏暢

大阪市立大学医学部 核医学研究室

1. はじめに

頭頸部領域 (口唇, 口腔および咽頭) の悪性新生物による死亡者数は96年度版「国民衛生の動向」によると, 1994年度は3267人 (全悪性新生物による死亡者数243670人) でその割合は1.34%である。過去に遡ると1985年度の割合は1.11%, 1990年度は1.20%と年々少しずつ増加している現状である。本邦では死亡者数の多い肺癌や胃癌は早期発見, 早期治療を目的に検診が行われ一定の成果を挙げているが, 頭頸部癌は発見された時点でかなり進行した状態のものが多く, 特に頸部リンパ節転移の有無により術式も異なってくる。そのため治療前に頸部リンパ節転移検査目的で, X線CT, MRI, Gaシンチなど複数の画像診断が行われ, それでも診断がつかない場合には生検, 術中生検などが施行される場合もある。

一方, FDG-PETは頭頸部腫瘍における良・悪の鑑別診断, 再発の診断, リンパ節転移の検査などその有用性が評価されている。

2. 調査対象

頭頸部腫瘍 (甲状腺を除く) については全国5施設より計344症例が報告された。検査目的 (重複あり) としては, 良悪性の鑑別240, 治療方針決定のため250例, 治療効果判定217例, 再発・経過観察などが58例であった。頭頸部腫瘍の種類としては扁平上皮癌が約80%と多く, その他悪性リンパ腫, 腺様嚢胞腺癌, 横紋筋肉腫などである。良性腫瘍では多形腺腫, ワルチン腫瘍が多く, 良性疾患としては炎症が含まれる。

3. アンケート調査協力機関と担当者 (敬称略)

千葉大学医学部附属病院 内田 佳孝
ハイメディック山中湖クリニック
安田 聖栄
福井医科大学高エネルギー医学研究
センター 米倉 義晴
大阪市立大学医学部附属病院 河辺 譲治

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

(1) 検査方法と評価基準

検査前 4-6 時間は絶食とし、全例にトランスミッションスキャンによる吸収補正を行った後、FDG (3-10mCi) を投与し 40-60 分後にエミッションスキャンを行っている。少数例においてダイナミックスキャンが行われている。FDG の腫瘍への集積の程度は視覚的評価、あるいは定量的評価として FDG の集積値を体重と投与量で補正した standardized uptake value (SUV) や、一部では時間放射能曲線を用いた客観的評価が行われている。頭頸部腫瘍の SUV は、腫瘍の発生部位や施設によっても異なっていた。

(2) 診断能の評価

頭頸部腫瘍における FDG-PET の有用性の評価については、有用(極めて有用を含む)が 307 例、有用性なしが 34 例で大部分の症例で有用と評価された。有用性なしの症例は、耳下腺の良性腫瘍であるワルチン腫瘍や多形腺腫で FDG の高集積を示すものが多く、良性・悪性の鑑別が困難であるためと考えられる。そこで耳下腺腫瘍を除いて、組織診断の確定した頭頸部腫瘍の 68 例について鑑別診断の見地からみると、sensitivity 93%, specificity 96%, accuracy 94% と良好な成績が得られた。この成績は今までの報告と同等である^{1),2)}。

(3) 治療効果判定についての評価

頭頸部悪性腫瘍では、化学療法、放射線療法

や両者の併用療法が行われ、その後手術が施行されることが多い。治療効果判定には、SUV による評価が行われている。FDG-PET による治療効果判定は、FDG の集積の程度、すなわち癌細胞の viability の評価が可能であることから、CT や MRI より有用であったとの評価が多く見られた。

(4) 再発・経過観察についての評価

今回の調査では、頭頸部腫瘍の診断に FDG-PET が施行されるようになってからの日も浅く、まとまった評価はできていない。舌癌の術後経過観察の一症例において、他のモダリティでは検出できなかった径 1cm の頸部リンパ節転移が発見され、きわめて有用と報告されていた。

脳腫瘍の手術、放射線による治療後の再発か放射線壊死かの鑑別診断や直腸癌の術後再発の診断は CT や MRI では困難であることが多く、FDG-PET が優れているといわれている。頭頸部癌においても同様に FDG-PET が CT や MRI より有用であるとの欧米からの報告がみられる^{3),4)}。

4.2 医療経済効果について

肺癌や乳癌については、米国の ICP (Institute for Clinical PET) から FDG-PET の医療経済効果についての詳しい試算の報告がされている。しかし、頭頸部癌についてのまとまった報告はない。そこで、舌癌を例にとって治療についての考え方、全身 FDG-PET による遠隔転移検出による治療方針について述べる。

舌癌では比較的早期においても頸部リンパ節転移を認める例もあり、その存在が予後に影響することがある。特に表 1 に示す最大径が 4 cm 以下の T1, T2 症例を例にとり、FDG-PET を用いて頸部リンパ節転移検索を行うことにより得られる医療経済効果について考えてみる。

T1, T2 舌癌診断：

舌癌診断の手順を表 2 に示す。原発巣は視診により容易に認められ生検も可能である。一

表 1 TNM 臨床分類

T：原発腫瘍

- T1 最大径が2cm以下の腫瘍
 T2 最大径が2cmをこえ、4cm以下の腫瘍
 T3 最大径が4cmをこえる腫瘍
 T4 腫瘍が隣接領域、たとえば骨皮質をこえたり外舌筋の深部、上顎洞、皮膚に浸潤したもの

(日本臨床, 47巻・1989年増刊号315頁より抜粋)

方、頸部リンパ節転移の診断はX線 CT, MRI, Ga シンチなど複数の検査を行い、さらに術中生検を行う場合もある。

舌癌の治療：頸部リンパ節転移のないT1, T2症例については舌部分切除術を行っている。一部放射線照射を追加する例もある。一方、頸部リンパ節転移症例は頸部リンパ節郭清術を追加しており、術前放射線照射も行われている。そこでFDG-PETによるリンパ節転移の有無の正確な診断は、医療経済に及ぼす影響は大きい。

予後：頸部リンパ節などリンパ節転移の有無で累積5年生存率は大きく異なる。舌癌においてリンパ節転移を認めない群では累積5年生存率が62.5%であるがリンパ節転移を認める群では39.0%と大きく低下する。

5. 頭頸部腫瘍におけるFDG PETの問題点と将来

(1) 頭頸部は解剖学的に複雑な構造をしており、FDGの集積部位の同定が困難であることが少なくない。現在はanatomical imagingであるCTやMRIとの重合画像が用いられているが、1999年の米国核医学会で発表されたPET/CTスキャナ(同一ベット上でPET画像とCT画像が撮ることができる装置)に近い将来使用可能となれば、より精度の高い情報が得られるものと期待できる。

(2) 腫瘍核医学のためのFDG-PETでは、原発巣のみならずstagingのための全身スキャンのできるPET装置が必要となる。遠隔転移を正確に診断することによって、治療方針が変わって根治手術の件数が減少し、医療経済につながるなどの報告がある⁵⁾。

(3) 腫瘍核医学では、現在FDGが多く用いられているが、ワルチン腫瘍など耳下腺の良性腫瘍にも高集積がみられることがある。そこで、頭頸部腫瘍に多い扁平上皮癌の診断にはcarbon-11-methionineがよいとの報告もある⁶⁾。

(4) 最近、SPECT装置でFDGを用いた

表 2 T1, T2舌癌治療におけるFDG-PETの役割

imaging が可能になってきている⁷⁾。

近い将来、本邦でも欧米のように FDG が供給されるようになれば、FDG-PET は頭頸部腫瘍の診断にも広く普及するものと期待される。

6. ま と め

FDG-PET 検査は従来から行われている Ga シンチに比べて感度、分解能に優れている。頭頸部腫瘍の診断においても、正診率が 94% と良好な成績が得られた。ただし、耳下腺のワルチン腫瘍や多形腺腫では FDG の高集積を示すので、読影上注意を要する。今後、全身 FDG PET 検査を施行することによって遠隔転移の検索が容易となり医療経済においても貢献するものと期待できる。

文 献

- 1) Wong, W. L., Hussain, K., Chevetton, E., Howkes, D. J., Baddeley, H., Maisey, M., McGurk, M.: Validation and clinical application of computer-combined computed tomography and positron emission tomography with FDG head and neck images, *Am. J. Surg.*, **172**, 628-632 (1996)
- 2) Chisin, R.: Nuclear medicine in head and neck oncology, reality and perspectives?, *J. Nucl. Med.*, **40**, 91-95 (1999)
- 3) Anzai, Y., Carroll, W. R., Quint, D. J., et al.: Recurrence of head and neck cancer after surgery or irradiation, prospective comparison of 2-deoxy-2[F-18]fluoro-D-glucose PET and MRI imaging diagnoses, *Radiology*, **200**, 135-141 (1996)
- 4) Davis, J. P., Maisey, N. M. and Chevetton, E. B.: Positron emission tomography, a useful imaging technique for otolaryngology, head and neck surgery?, *J. Laryngol. Otol.*, **112**, 125-127 (1998)
- 5) Valk, P. E., Abella-Columna, E., Pounds, T. R., Jadvar, H., Segall, G. M.: Whole-body FDG PET imaging in recurrent head and neck cancer, effect on management cost, *J. Nucl. Med.*, **40**, 63P (suppl.) (1999)
- 6) Lomdholm, P., Leskinen, S., Lapela, M.: Carbon-11-methionine uptake in squamous cell head and neck cancer, *ibid.*, **39**, 1393-1397

(1998)

- 7) Landri, C., Gianolli, L., Lucignani, G., Magnani, P., Savi, A., Travani, L., Gilardi, M. C. and Fazio, F.: Comparison of dual-head coincidence PET versus ring PET in tumor patients, *ibid.*, **40**, 1617-1322 (1999)

第 9 章 脳腫瘍における FDG-PET 検査成績の全国調査

越智宏暢

大阪市立大学医学部 核医学研究室

1. はじめに

脳腫瘍の診断における FDG-PET 検査結果について全国調査を行い、その有用性について検討した。

2. 調査対象

脳腫瘍については全国 7 施設より計 420 件の症例が報告された。検査目的（重複あり）としては、良悪性の鑑別診断 361 例、治療方針の決定のための 282 例、治療効果判定 30 例、再発・経過観察などが 59 例であった。脳腫瘍の種類は、悪性腫瘍では神経膠腫、神経膠芽腫、転移性脳腫瘍などであり、良性腫瘍では髄膜腫、神経鞘腫などが主なものである。

3. アンケート調査協力機関と担当者 (敬称略)

千葉大学医学部附属病院	内田 佳孝
九州大学医学部附属病院	佐々木雅之
秋田県立脳血管研究センター	畑澤 順
名古屋市総合リハビリテーションセンター	飯田 昭彦
浜松医療センター	尾内 康臣
福井医科大学高エネルギー医学 研究センター	米倉 義晴

大阪市立大学医学部附属病院 露口 尚弘

4. 調査結果および考察

4.1 臨床的有用性について

(1) 検査方法と評価基準

検査前 4-6 時間は絶食とし、全例にトランスミッションスキャンによる吸収補正を行った後、FDG (3-10 mCi) を投与し 40-60 分後にエミッションスキャンが行われている。FDG の腫瘍への集積の評価は大部分が視覚的に行われているが、一部では SUV (standardized uptake value) や時間放射能曲線を用いた定量的測定が行われていた。

(2) 診断能の評価

有用性については、有用 (極めて有用を含む) 387 例、有用性無しが 33 例であった。組織診断の確定している 120 症例について鑑別診断の見地からみると、sensitivity 88%, specificity 72%, accuracy 79% であった。今まで報告されているように¹⁾、脳腫瘍の手術後に放射線治療が施行された症例において、再発か放射線壊死かの鑑別に極めて有用の回答が多く見られている。一方、悪性度の高い腫瘍の診断において、有用性無しの解答が多く見られた。神経膠腫の grading に FDG-PET の有用性が報告されてきたが²⁾、今回の調査ではその報告はみられず、脳腫瘍や再発の鑑別診断には ¹¹C-methionine が FDG より有用であったとの回答もみられた。

4.2 医療経済効果について

脳腫瘍の診断には、現在のところ CT や MRI が優先されている。しかし、脳腫瘍の手術、放射線治療の行われた症例における再発か放射線壊死かの鑑別診断には、FDG-PET は他のモダリティより優れており、その経済効果は大きいと考えられる。また、最近普及しつつある全身スキャンをすることによって、原発巣不明の転移性脳腫瘍の治療方針が正確に決定され、経済効果につながるものと期待できる。

5. ま と め

脳腫瘍の診断における FDG-PET の評価には現在のところ限界があると考えられている。しかし、FDG-PET は腫瘍の再発と放射線壊死の鑑別診断には有用と考えられた。その他、生検部位の決定、治療効果判定などの有用性の報告³⁾があるように、代謝面からみた脳腫瘍の診断には多くの有用性があると期待できる。

文 献

- 1) Patronas, S. M., DiChiro, G., Brooks, R. A. et al.: ¹⁸F-Fluorodeoxyglucose and positron emission tomography in the evaluation of radiation necrosis of the brain, *Radiology*, **144**, 885-889 (1982)
- 2) Di Chiro, G., DeLaPaz, R. L., Brooks, R. A. et al.: Glucose utilization of cerebral gliomas measured by [¹⁸F] fluorodeoxyglucose and positron emission tomography, *Neurology*, **32**, 1323-1329 (1982)
- 3) Delbeko, D.: Oncological applications of FDG PET imaging, brain tumors, colorectal cancer lymphoma and melanoma, *J. Nucl. Med.*, **40**, 591-603 (1999)

第 10 章 腫瘍の FDG-PET 検査における全身撮影の有用性に関するアンケート調査結果

鳥塚莞爾

京都大学、福井医科大学名誉教授

1. はじめに

最近本邦において全身 PET スキャナを設置する施設が増加している。そこで平成 11 年 7 月、肺癌、大腸癌、悪性リンパ腫の 3 疾患において、X 線 CT, MRI, ⁶⁷Ga シンチグラフィなどで検出されなかった転移巣が全身 FDG-PET 検査により検出された症例の頻度の調査、およ

び上記の 3 疾患以外で全身 FDG-PET 検査が非常に有用であった症例の調査を行った。

2. アンケート調査協力機関と担当者

7 施設からアンケート調査の協力が得られた。これらの協力機関と担当者を表 1 に示す。

表 1 アンケート調査協力機関と担当者

協力機関	担当者
北海道大学 核医学科	塚本江利子
群馬大学 核医学科	井上登美夫
ハイメディック山中湖クリニック	安田 聖栄
県西部浜松医療センター	
先端医療技術センター	鳥塚 達郎
福井医科大学	
高エネルギー医学研究センター	石津 浩一
京都大学 核医学科	中本 裕士
九州大学 放射線部	桑原 康雄

3. 調査結果および考察

(1) 肺癌、大腸癌、悪性リンパ腫の 3 疾患において、378 例の調査データが得られた。表 2 に示す如く、従来の X 線 CT, MRI, ^{67}Ga シンチグラフィなどで検出されなかった転移巣が 20.9% に検出された。FDG-PET による全身撮影は病期診断ならびに治療方針の決定に有用な情報を提供し、他の画像検査を少なくし、また無用な治療を避けることができることにより、医療経済効果が大きいと考えられる。

表 2 肺癌、大腸癌および悪性リンパ腫の症例において FDG-PET 検査によってのみ転移巣の検出された症例数

	転移巣が検出された症例数	全症例数
肺癌	42例(17.9%)	234例
大腸癌	15例(24.6%)	61例
悪性リンパ腫	22例(26.5%)	83例
	79例(20.9%)	378例

(2) 上記の 3 疾患以外で全身 FDG-PET 検査が非常に有用であった症例：

以下の症例が報告された。

- 食道癌の転移巣の検出に有用であった。
- 再発胃癌における再発部位の検出に有用であった。
- 脾癌の転移巣の検出に有用であった。
- 脾癌と腫瘍形成性脾炎の鑑別に有用であった。
- 直腸癌の術後において、術後の fibrosis と再発の鑑別に有用であった。
- 精巣癌の左鎖骨上リンパ節転移、傍大動脈リンパ節転移などの遠隔転移巣が検出された。
- 転移性骨腫瘍の原発巣の検出に有用であった（下喉頭癌、肺癌）。
- サルコイドーシスの活動性病変の検索に有用であった。
- FDG-PET により、無症状の 6 mm 乳癌、6 mm 甲状腺癌、1 cm 肺癌、4 cm 傍咽頭癌が検出された。