放射性コバルト小球（プラストバルト・マクロ）

応用の一症例について

岡本十二郎，浜田政彦，（放射線科）

山田道生（婦人科）

（国立東京第一病院）

（昭和31年12月11日受理）

子宮の悪性絨毛上皮腫よりの転移と思われた陰部腫瘍に対してプラストバルトにより体腔内放射を試み経過良好の症例を得た。

1. 緒言

品名 PLASTOBALT MACRO（略称 P.M.）は1950年に Heidelberg の J. Becker と K. Scheer により γ 線源として発明利用されているもので P.M. は次章に述べる如く柔軟性のチウインガム様物質中にプラスチックにつつまれた直径 2 mm の多数の ^{60}Co 小球を包埋しており、適当な放射能と適当な形態に操作加工できる点はラジオウム針または管や ^{60}Co 針等と比較してある種の腫瘍治療上、遙かに有利性を持っている。われわれは 25 g の P.M. を入手しその利用について研究中であるが、ここに一使用症例を報告する。

2. プラストバルトの構成と特性

P.M. は第1図Aに示す如き ^{60}Co の小球（直径 2 mm）が硬いプラスチック中に包埋されている。小球1個の放射能は約 $40\mu\text{c}$ で第1図Bはラジオオートグラフを示す。

P.M. 1 g 中に約 64 個の ^{60}Co 小球が含まれ放射能は約 2.5mc. P.M. の最も有利な特長は小球

第1図

A

B

第2図

操作台並びに器具

が極めて均等に分布し線量分布では比較的均等性が得られる。また形態や厚さも目的病巣に応じて

自由に加工できる点にある。加工の操作は ^{60}Co 球に傷をつけないため、すべて木製器具を使用し、7線防禦の操作台(第2図に示す)によって行う。

3. 臨床応用例

43才家婦。昭和31年8月27日初診を行ったが、主訴は下腹部の腫瘍で、30年5月頃より月経異常、31年6月より全身倦怠、体重減少し下腹部に腫瘍を気附いた。腫瘍は急速に増大し性器出血を認めるようになり常に黄色帯下を多量に認めるに至った。

初診時所見。前腔壁は一見腔脱の如く、腔前壁が陰裂間に膨隆脱垂するをみる。その腔脱垂部のやや左側に拇指頭大の境界明確な非出血性で淡褐色漿液性液を圧出し得る壊死性潰瘍を認めかつ深部におよんでいて前腔壁または膀胱より発生した壊死性腫瘍が自然に前腔壁を破壊した如く考えられる。触診するに大きさは半鶏卵大で前腔壁に半球状に膨隆し陰裂間に脱出している。

内診するに子宮は軽度前傾前屈で小人頭大、硬度弾力性硬で左側に多少の圧痛がある。両側付属器は触れず、左側穹窿部に隆起した囊状超鳩卵大腫瘍を触れるが圧痛はない。腫瘍隆起の腔壁には色調の変化なく、かつ腔分泌物は淡赤色漿液性のほかは変化がない。なお、腎・膀胱に異常はない。

外来診断。子宮筋腫の悪性変化および腔部の悪性腫瘍または悪性絨毛上皮腫

入院時全身所見。(31年8月28日)

体格栄養中等、顔面やや蒼白、眼瞼結膜は貧血状、淋巴腺、乳腺および肺には異常を認めない。体温 38°C 前後、脈搏毎分80、緊張中等度なるも不整脈を認める。血圧 $212/86\text{ mm Hg}$ 、心臓は約3横指拡大し第一心音の延長、収縮期雑音聴取。肝は右季肋下に二横指触知。下肢に軽度の浮腫がある。

赤血球数は290万、Hb 8.0 g/dl 、白血球数は11800、GB 1049、GP 1024、Ht 27.0、血清高田反応陰性、B.S.P. 15~20% (30分)、硫酸亜鉛混濁反応10、尿は蛋白、糖陰性、ウロビリノーゲン弱陽性、胸部X線所見では異常を認めない。

パパニコロ氏腔分泌物検査では白血球を多数認めるほか腫瘍細胞は見られなかった。心電図では上房室性期外収縮多発し V_5 、 V_6 のTが平低で心筋の状態も悪い。

入院より手術までの治療および経過

ペニシリン毎日60万単位筋注するも体温下降せず。Apresolin 60 mg 7日連用するも血圧の下降をみず、またReserpin 1 mg を朝夕注射したが下降しなかった。腔前壁の腫瘍は鶏卵大に増大し硬度も増加したので9月11日手術施行、(隔日に1回200ccの輸血を2回施行)。

手術所見および経過。

(全身麻痺にて開腹手術) 腹腔内には出血および腹水を認めず。子宮は超小児頭大で子宮前壁に大網膜が癒着す。左側子宮旁結合組織より腔旁結合組織内にかけて超鳩卵大の転移腫瘍と思われる腫瘤を触知。よって子宮全摘と同時に左側転移腫瘍摘出の方針で手術を進めたが出血多く転移腫瘍は骨盤近くに達しかつ、腫瘍周囲に拡張蛇行せる大血管多数を認めるにより両側付属器を含めて単純子宮全摘術のみに止めた。

摘出標本所見。(第3図)

肉眼的には、摘出子宮は極めて腫大し(大きさ $14\times 18\times 11\text{ cm}$ 重さ 1040 gm)漿膜面は一部多少暗紫色を呈しこの部に大網膜の線維性癒着を認めた。硬度は弾力性やや軟、割を入れるにこの腫瘍は一部子宮壁内漿膜下に達し、出血ならびに壊死巣の混在する極めて多彩な拳拳大の比較球形の腫瘍である。

第3図 摘出子宮

第4図 治療前、前壁の半鶏卵大腫瘍

子宮体部腫瘍の組織学的所見 (H.E. 染色) としては、ラングハンス型巨細胞と合胞細胞が不規則に交錯し血液で満たされた管腔が直接これらの細胞に接している定型的な悪性絨毛上皮腫で壊死と出血が著明であった。

手術後の経過。

術後3日にして下熱し、1週間後に全抜糸し以後は全身状態は好転した。

フリードマン試験でも術直後より漸次好転した。(12/Ix 5千単位陽性, 15/Ix 1万単位陽性, 26/Ix 5万単位陽性, 2/x 20万単位陰性, 6/x 10万単位陽性, 23/x 10万単位陰性, 29/x 1万単位陽性, 5/xI 5万単位陰性。)

術後の放射線療法。

1) ^{60}Co 大量遠隔放射療法

左側子宮旁結合織内の転移腫瘍治療の目的でまず ^{60}Co 遠隔放射を行った。すなわち、恥骨上縁を中心に前後2門(各々 $10 \times 10\text{cm}$) をとり、1日1回1門に対し 30cm の距離で 300r 宛、術後第48日目までに総量 8400r を照射した。

2) プラストバルトマクロ

術後第23日目より陰前壁の転移腫瘍(直径約 5cm で中心部に約直径 2cm の腔がある)に対して P.M. 100 箇 4mc を球状となし腫瘍内に122時間挿入した。腫瘍線量は γ メーターによって測定し、 1cm の距離において1分間 0.8r すなわち122時間挿入によって 6000r の腫瘍線量を与えた。この結果放射終了16日目(術後44日目)には陰分泌物もほとんど消失し陰前壁の転移腫瘍は小指頭大の癒痕を残して完全に消失した。

かつまた左側子宮旁結合織内の転移腫瘍も拇指頭大となり縮小した。

第5図 治療後退院時所見

結 び

子宮の悪性絨毛上皮腫よりの転移と思われた陰部腫瘍に対して ^{60}Co 遠隔大量放射ならびに特にプラストバルトマクロの腔内放射を試み極めて良好な経過を認めたのでその一例を報告した。

稿を終るに臨み御指導ならびに御校閲を賜った大槻菊男博士、伊藤光雄博士に対し深甚の謝意を表す。

文 献

- 1) J. Becker and K. Scheer: A source of gamma radiation capable of being shaped to individual requirements in contact therapy with radio-active cobalt. (PLASTO-BALT MACRO) Buchler & Co.
- 2) Becker & Scheer: Künstliche radioactive Isotope in Physiologie, Diagnostik and Therapie. Abschnitt. "Die lokalisierte Applikation Künstlich-radioactive Isotope" p. 680 p. 648(1953); *Strahlenther.* 85, 4, (1951)
- 3) Werrer Schwab: Archiv für Ohren-Nasen and Kehlkopf heilkunde. 164, 547 (1953~54)
- 4) W. Gahlen: Zur Dosimetrie des Plastobalts (^{60}Co). *Strahlen therapie*, 93, 153 (1954)
- 5) H. Lehrner u. L. Psenner: Erfahrungen bei der Verwendung von ^{60}Co als Plastobalt in der Strahlenbehandlung maligner Geschwülste, *Wiener klinische Wochenschrift* 67 Ya (1955) Nr 21 S 373~374; Ya 66 Nr 21, (1954)

About a Case of Medical Using of ^{60}Co Small Pellet "PLASTOBALT MACRO".

Shiujiro OKAMOTO, Michio YAMADA and Masahiko HAMADA

(The First National Hospital of Tokyo.)

(Received December 11, 1956)

The PLASTOBALT MACRO is a new development brought out by J. Becker and K. Scheer, University of Heidelberg, for gamma ray treatment of malignant tumor.

Plastobalt M contains about 64 pellets of radioactive Co in a gram and they are small, shot-like, very hard and coated with special plastic of 2 mm diameter. Radioactivity of each pellet is approximately 40 μC .

The authors applied Plastobalt M for a 43 years woman's vaginal tumor, that was the metastase of Chorioepithelioma malignum. At first she was applied 8400r irradiated by telecobalt apparat and uterus was extracted but her tumor metastase in front vagina was unable to be takenout. That was dramatically improved after irradiation with 6000 r of Plastobalt M 100 pellets.