試製放射性金コロイドに関する基礎的研究

山田文夫, 前田茂和, 池尻博美, 笠原俊行, 河合 公, 森村正孝,
岡部秀平, 土屋英和, 寺村定雄, 中山正二, 内藤七勝, 竹内清次
(大阪市立大学医学部産婦人科学教室, 主任 藤森速水教授)

於勢真輔, 吉村嘉男, 三奈木康夫, 倉田邦夫
(大日本製薬株式会社研究部, 部長 筒井清)
(昭和 34 年 2 月 2 日受理)

緒 言

放射性金コロイド(以下 ^{198}Au コロイドと記す)は, 悪性腫瘍の治療あるいは, 管腔疎通性検査などの目的にますます多く利用されつつあるが, わが国ではそのすべてを海外からの輸入に頼っている現状である。今回大日本製薬株式会社研究部において, 放射性金のコロイド化を試み, その物理化学的性状の一端を検し, かつ大阪市立大学産婦人科学教室において, 生物学的応用に関する基礎的検討をも加え, それぞれ認むべき成績を得たので, ここに報告する。

^{198}Au コロイドの製造

第 1 図のように約 1 c の ^{198}Au を取扱いうる

第 1 図 ^{198}Au コロイド製造装置

装置を用い, 原料としては, 英国 Amersham 製の放射性金箔を使用した。コロイド中の金濃度

は, 輸入金コロイドに準じて, 約 8 mg/ml とし, 還元剤としては注射薬としての考慮から, ブドウ糖またはアスコルビン酸を使用, 保護コロイド物質としては, セラチンを用いた。製造に用いた試薬類は, 日本薬局方適, または試薬特級品を使用し, さらに工程の間, 発熱性物質の生成防止および滅菌の考慮を払った。

製品の性状の検討

製品の試験は, 放射性医薬品および一般薬局方試験に準じ, 必要と思われる項目について実施した。

後述の生物学的試験に供した製品は, ブドウ糖還元法によって製出したものであるが, その試験の成績はつぎのとおりである。

1) 金濃度

炭化ののち, 王水処理して塩化金となし, Dianisidine 法により比色定量し, Au 10 mg/ml の値を得た。

2) Au イオンの有無

Au イオンは, 医薬用として有害と思われるので, Rhodamine B による呈色反応(確認限界 2γ/ml)によって検討したが, これは検出されなかった。

3) pH 値

コロイドの安定化のため弱酸性が望ましい。Amersham のコロイドは, pH 4~6 であるが, 試験したものは, pH 5 であった。

4) コロイド粒子の大きさと均一性

New and Nonofficial Drugs (NND) には、粒子の大きさが $3 \sim 7 \text{ m}\mu$ と記載されている。電子顕微鏡による観察の結果は、第2図のよ

第2図 ^{198}Au コロイドの電子顕微鏡像

うに、粒子の大きさは $3.6 \sim 9.5 \text{ m}\mu$ 、大部分は $5.5 \text{ m}\mu$ であった。均一性もまた良好であると観察された。

5) 安定性

常温で数週間の放置、また 100°C 、1時間の加熱、あるいは10%食塩水の添加によっても、沈降物を生ずることはなかった。

6) 放射性純度

20日間の測定では、減衰曲線は直線であり、半減期は2.71日と測定された。また Feather 法による β 線最大エネルギーの測定値は 0.939 MeV であり、スペクトロメーターによる γ 線エネルギーの分布図からは、 0.41 MeV に大きなピーク、 0.69 MeV に小さなピークが測定され、ほかに認むべきピークはなかった。

7) 放射性強度

標準線源と比較できなかったが、Amersham における照射データからの計算、および ^{131}I で計数効率を校正したウェルタイプのシンチレーション計数器による測定では、製造直後において、ほぼ 6 mc/ml と推定された。原料の輸送間の減衰を避け得られれば、輸入品と同じく $30 \sim 60 \text{ mc/ml}$ 程度のものも製造可能であると考えられる。

8) 無菌試験

薬局方に従いTGC培地の試験で無菌であった。

9) 発熱性物質試験

薬局方に従い検定し、発熱性物質なしと判定された。

10) 毒性試験

同様の製法によって製造した非放射性金コロイド(金濃度 11 mg/ml) は、DM 系マウス(尾静注)で $\text{LD}_{50} 0.25 \text{ ml/10g}$ であった。

生物学的実験

上述のような ^{198}Au コロイドを生体に応用するための基礎的研究として、つぎのような実験を行った。

1) ^{198}Au の局所停留

^{198}Au コロイドを臨床的に用いる際には、しばしばその局所停留率が問題になるので、つぎのような実験を試みた。

$^{198}\text{Au} 71 \mu\text{c}$ を 2 ml に希釈し、これを家兎(体重 2 kg)の臀部皮下に注射し、注射直後の局所の cpm を100%として以下経日的に注射局所の cpm を G-M 計数管で測定して、その百分率と共に示せば第1表のとおりである。これをグラフに示せば第3図のごとくであって、皮下に投与

家兎 No	1		2		3		平均(%)
	cpm	%	cpm	%	cpm	%	
0	8612	100	4429	100	4205	100	
1	5505	63.9	3100	70.0	2860	68.1	67.3
2	4822	56.0	2301	51.9	2153	51.2	53.0
3	3466	40.3	1745	39.4	1809	43.1	40.9
6	1638	19.0	816	18.5	834	19.9	19.1
7	1094	12.7	650	14.0	383	9.1	12.1
9	712	8.3	447	9.5	268	6.4	8.1
11	414	4.8	226	5.1	219	5.2	5.0
14	212	2.5	119	2.7	122	2.9	2.7
17	99	1.2	53	1.2	57	1.4	1.3

第1表 ^{198}Au コロイド皮下投与家兎の局所 cpm

された ^{198}Au は、注射後24時間以内に約8.7%が体内に移行するものの、そのほとんどは注射局所に停留し、以下経日的に ^{198}Au の崩壊曲線と

第3図 ^{198}Au コロイドの局所停留率

平行な曲線が得られる。これより見て、この試製 ^{198}Au コロイドの局所停留性は良好、すなわち血行中に移行する部分は極めて少ないといえる。

つぎに17日目における同家兎の肝、腎、血の cpm を測定すると、第2表のごとくであった。

第2表 ^{198}Au コロイド皮下投与後17日目の家兎臓器 cpm

No.	肝 cpm	腎 cpm	血、液 cpm
1	4	14	14
2	7	13	9
3	9	11	17

これを局所 cpm と比較すれば、肝では No.1 4.04%, No. 2 13.2%, No. 3 15.8% と局所 cpm に比し低い値を示している。しかし一般に腎の cpm は肝の cpm よりも高く、注射後17日たつてなお血中 cpm が腎 cpm と同程度に見られることは、 ^{198}Au コロイド注射生体では、注射直後から24時間以内に肝へ移行した金コロイド粒子は、徐々に血中に排泄され、腎にも一部蓄積が

あることを示すものである。

2) 白血球数の変動

白血球数は、放射線に対し鋭敏に反応し、かつ障害度のよき指標となるゆえ、家兎を用いて ^{198}Au 投与時の白血球数の変動を検討した。一応投与量を $800\mu\text{C}/2\text{kg}$ とし、これを皮下、静脈内、筋内、腹腔内に投与、急を要する実験のため、1～3日間測定することにした。その成績は第3表

第3表 ^{198}Au コロイド投与家兎の白血球数の変動

投与方法	1	2	3
皮下	8100	14100	11000
静脈	10100	14600	12600
筋	7100	9770	10400
腹腔	10000	7970	7730

に示すとおりであって、静注群が最も強く増加し、筋内、腹腔内投与では、比較的軽度であった。なおこの観察期間中に、白血球減少を示すものは認められなかった。

3) 血液学的所見の変化

家兎において、上記のごとき投与方法を行った場合の血液像を、主として白血球分類より観察すれば、リンパ球、単球の出現、単核球の増加などが認められた。なおかくのごとき血液像所見については、長期にわたる観察を今後加える予定である。

4) マウス体内における ^{198}Au の分布

生体に ^{198}Au コロイドを投与した場合、いかなる組織、臓器に摂取されるか、またその経日的変化や排泄のいかんを知ることは、臨床使用上必要であるので、マウスを用いて体内分布の観察を試みた。

すなわち ^{198}Au コロイドを $5\mu\text{C}/15\sim 17\text{g}$ の割にマウスの皮下、筋内、血管内、腹腔内に注入し、24, 48, 72時間目ごとに第4表に示した各種臓器の cpm/g を測定した。第4表にその成績を一括表示する。

この成績を通覧するに、血液の cpm は、筋注群

第4表 ^{198}Au コロイドのマウス体内分布 (cpm/g)

投与法	臓器 時間	血液	尿	肝	胃	腎	筋	脳	小腸	大腸	肺	心臓	注射部位
筋内	24	2756	254	9556	484	4720	151	220	523	461	1303	1049	
	48	3588	138	3040	300	3185	116	152	335	263	620	287	
	72	1070	367	3404	220	3859	92	149	351	322	677	299	
腹腔内	24	275	213	8443	4281	2581	149	103	2956	521	4856	250	
	48	726	274		6753	2513	208	343	1240	7658	346	538	
	72	34	23		3267	137	133	82	1230	8560	226	16	
皮下	24	345	92	532	68	52	658	44	90	133	246	258	
	48	980	126	536	368	1708	242	121	231	336	631	490	不 能
	72	887	420	588	372	2980	72	59	203	399	460	279	不 能
静脈内	24	470	124	不 能	370	1557	623	100	303	250	3808	441	
	48	99	469	146080	92	841	485	521	300	106	1098	753	
	72	115	286	—	87	1770	61	101	212	227	1485	297	

において高く、尿中排泄も比較的多い。静注群の血液 cpm の低いのは、24 時間以内に臓器に摂取されることの多いためと考えられ、これを裏づけるごとく、同群の肝の cpm は極めて高い。一般的にみて、尿への排泄が各群とも少ないのは、コロイド粒子の大きさのためと考えられる。臓器中では、肝、腎がほかにならべて多いのが注目される（腹腔内投与で胃腸に多いのは、汚染によるものと考えられる）。さらに、静注群で肺に多いことも注目してよからう。

また、これら臓器のうち、血液、肝、腎などの主要臓器を長期にわたって観察した結果は第5表

第5表 ^{198}Au コロイド投与マウスの臓器 cpm/g の変化

臓器 \ 日	1	2	3	5	7	10	14
血 液	437	169	205	104	49	50	16
肝	528	887	852	561	964	157	50
腎	743	715	665	747	130	221	112

に示すごとくである。（条件は上に同じ。測定日は、1, 2, 3, 5, 7, 10, 14日）

5) オートラジオグラフ

マウス腹腔内に ^{198}Au を $5\mu\text{C}$ 注入し、種々なる時間後に腹腔内臓器（主として小腸、肝）のマクロオートラジオグラフを作製した。これらによるとそれぞれの表面に強い黒化部を認め、腹腔内に投与した場合には、 ^{198}Au コロイドは臓器表面に沈着することを知った。

さらに、マウス皮下に投与された ^{198}Au コロイドは肝に移行、沈着し、また子宮癌患者の局所に投与された ^{198}Au コロイドは局所に停留するので、ストリッピング法によるマイクロオートラジオグラフを作製した（第4図、第5図）。

第4図 マウス C3H 肝オートラジオグラフ $\times 400$
a: 黒化部, b: 肝細胞

写真では ^{198}Au による黒化部 a は濃い斑点として見られ、b の肝細胞は淡く映っている。a の黒化部は肝細胞に一致して存在する。

第5図 子宮癌患者局所投与×200

投与された ^{198}Au は、局所に停留し、強い放射線のために濃度の高い大きい黒斑として黒化部が見られる。

6) 実験的腹水癌に及ぼす影響

(1) 腹水癌細胞の細胞数

Ehrlich 腹水癌担癌マウス C3H を各群5匹ずつの4群に分け、第1, 2群は対照、第3群は

第6表 ^{198}Au コロイドの Ehrlich 腹水癌に対する影響

No.	細胞数		生存日数	
	第1群 (対照)	第3群 (^{198}Au 投与)	第2群 (対照)	第4群 (^{198}Au 投与)
1	4600	1200	7	13
2	3200	1100	7	14
3	4300	900	7	14
4	5100	1200	8	14
5	4400	1500	9	15
平均	4320	1180	7.6	14.0

第6図 Ehrlich 腹水癌移植マウスの腹水細胞
(A) ^{198}Au コロイド非投与

^{198}Au コロイド 25 μC を移植2日目に腹腔内に投与、第4群も同様移植第2日目に ^{198}Au を 25 μC 投与して、その細胞数および生存日数を検討す

第6図 Ehrlich 腹水癌移植マウスの腹水細胞

(B) a: Mitosis における空胞変性と原形質融解
b: 核が Mitosis において解離
c: 裸核
d: 核濃縮

第6図 Ehrlich 腹水癌移植マウスの腹水細胞
(C) (B) の a: 強拡大

第6図 Ehrlich 腹水癌移植マウスの腹水細胞
(D) 原形質消失と核融解

るに, 成績は第6表に示すごとくであった。

細胞数の計算法は, 白血球数計算用メランデュールおよびトーマ血球計算板により, 全区劃の細胞数を100倍した値をもって細胞数とした。

i) 細胞数では, 対照群 4320 に比し, ^{198}Au 投与群は1180と著明な減少を示した。

ii) 生存日数では, 約2倍の日数の延命効果が見られた。

(2) 腹水癌細胞像に及ぼす影響

Ehrlich 腹水癌細胞0.1mlを C3H マウスの腹腔内に投与し, 各5匹ずつの2群に分け, 1群に ^{198}Au 25 μC を投与した。移植後7日目に腹水を採取, ギムザ染色による塗抹標本を作製し, 腹水細胞の形態学的な変化を見た。その成績は第

第7表 ^{198}Au コロイドの Ehrlich 腹水癌細胞像に及ぼす影響

群	No.	正 常	核濃縮	原形質及び核融解	裸 核
対 照	1	964	0	11	25
	2	953	0	15	32
	3	960	0	21	19
	4	959	0	18	23
	5	958	0	15	27
照 射	平 均	958.8	0	16.0	25.2
	(%)	(95.9%)	0.0%	(1.6%)	(2.5%)
^{198}Au 投 与 群	1	188	394	160	285
	2	125	507	175	193
	3	247	493	168	92
	4	270	325	133	272
	5	160	488	187	168
群	平 均	198.0	441.4	164.6	202.0
	(%)	(19.6%)	(43.9%)	(16.4%)	(20.1%)

7表のごとくである。 ^{198}Au コロイド投与群では, 44%に核濃縮を起した腹水細胞が見られた。核および原形質の融解ならびに裸核は, 非投与群でも, 細胞の死によりそれぞれ1.6%および2.5%に見られたが, ^{198}Au 投与群では, それぞれ16.0%, 19.6%と高率に見られ, ^{198}Au の照射効果が著明であった。

また, ^{198}Au 投与群では, 極めて低率すなわち1%以下で腹水細胞が ^{198}Au を原形質内に摂取している所見と, 核消失, 細胞膜の融解を伴う硝子様に変性化した腹水細胞集団を若干認めた。

7) He La Cell に及ぼす影響

子宮癌由来の培養細胞たる He La Cell に及ぼす ^{198}Au コロイドの影響を検討した。すなわち, 培養開始後2日目のものに対し, Earle 培養液に20%の割に血清を加え, さらに, 1) 5 $\mu\text{C}/\text{ml}$, 2) 10 $\mu\text{C}/\text{ml}$, 3) 20 $\mu\text{C}/\text{ml}$, 4) 40 $\mu\text{C}/\text{ml}$ の割に ^{198}Au コロイドを増加した。培養は, 角瓶によるほか, 教室創案のシャーレ法によった。この結果, 1) および2) 群では, 24時間後脱落を認めないが, 2) 群では30時間目より脱落を

第7図 He La Cell の変化 (A) 弱拡大

第7図 He La Cell の変化 (B) 強拡大

始め, 3) および 4) 群では, すでに24時間で大部分脱落する。なお 1) 群では, 対照と比べ4日後も大差がない。代表として 2) 群をとり, 24時間後ギムザ染色を施すと, 第7図のごとく細胞質の空胞化, 崩壊が認められ, 裸核をとるものも現われる。核の染色異常, 濃縮なども惹起されるが, この程度では巨大細胞の出現は見られず, また多

核形成もない。

8) 実験腫瘍に及ぼす影響

マウスの皮下に Ehrlich 腹水癌を接種し, のち 1, 3, 5, 7 日目に, 腫瘍内に ^{198}Au コロイドを $5\mu\text{c}$ ずつ注入した。そして腫瘍の大きさの消長を横径×縦径 (mm) であらわしてみると, その成績は第8表のごとくである。これより見る

第8表 Ehrlich 腹水癌腫瘍の生長に及ぼす ^{198}Au コロイドの効果

群	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
対 照	24.1 ↓ Au	39.2	58.3	69.0	81.5	94.2	103.4	124.6	135.2	149.1	174.0	200.8
I	(±)	(±)	(+) ↓ Au	14.3	61.5	73.2	99.4		129.6		152.2	157.4
II	(+)	59.1	85.7	95.6	96.4 ↓ Au	102.5	121.4	125.3	129.9	124.0	141.7	157.9
III	(+)	34.4	49.2	65.8	83.9	91.0 ↓ Au	98.9	91.2	101.0	111.0	124.2	126.7
IV	(±)	(+)	(+)	31.4	52.5	54.5	71.5	115.8	119.5	114.8		143.8

1) ↓Au : Ehrlich 腹水癌皮下移植, 固型癌局所に ^{198}Au $5\mu\text{c}$ 注射を示す

2) マウス : C3H 17g

3) 対 照 : ^{198}Au 非投与群

4) 数値は腫瘍の大きさを横径×縦径 (mm) で表わしたもの

と, どの発育時期においても, ^{198}Au の投与は制癌的に作用すると考えられる。ことに発育初期には, その感受性はさらに強いようで, 腫瘍発育曲

線をもても, とくに極度の抑制が認められる (第8図)。

なお, このように ^{198}Au を皮下腫瘍に与えた場合の, 主要臓器の cpm/g をみると第9表のごとくである。

第9表 皮下腫瘍に ^{198}Au コロイドを投与したマウスの臓器 cpm/g

群	注 射 後 の 日 数	血 液	肝	腎
I	12日	55	160	173
II	10日	195	341	150
III	8日	160	344	275
IV	7日	100	348	160

9) 臨床例への応用 (副作用の検討)

順向性 Radio tubation のトレーサーとして, 8例の患者に本剤を用いた。すなわち毎回 $50\mu\text{c}$ を腹腔内に注入したが, 発熱, 下痢, 疼痛, そのほかなんらの副作用も認められず, よくトレ

第8図 腹水皮下移植腫瘍の生長曲線

ーサーの目的を達した。 ^{198}Au コロイドは、このようにトレーサー実験にも都合よく用い得るものである。また子宮癌末期症例の1例の癌局所に用いた(治療量ではない)が、局所および全身になんら認むべき障害をきたさなかった。

結 論

上述のごとき基礎的小実験により、大日本製薬株式会社において試作された ^{198}Au コロイドは、

従来の輸入品に比べてその性状も類似し、かつ生体にもよく応用しうることを知った。かくのごとき邦製 ^{198}Au コロイドは、臨床上多大の便宜を与えるものと考えられる。

終りに、金コロイド製造研究は、原子力平和利用研究補助金によって行われたものであり、生物学的検討は大阪市立大学藤森教授のご指導およびご校閲をたまわったものである。ここに深謝する次第である。

Study on the Radiogold Prepared Experimentally in Japan

By

Fumio YAMADA, Shigekazu MAEDA, Hiroyoshi IKEJIRI, Toshiyuki JIKUHARA, Isao KAWAI, Masataka MORIMURA, Shuhei OKABE, Hidekazu TSUCHIYA, Sadao TERAMURA, Shōji NAKAYAMA, Hichikatu NAITO, Seiji TAKEUCHI

(Osaka City University Medical School, Department of Gynecology & Obstetrics)

Shinsuke OSE, Yoshio YOSHIMURA, Yasuo MINAKI, Kunio KURATA

(Research Laboratory, Dainippon Pharmaceutical Co. Ltd.,)

(Received February 2, 1959)

Sterilized and pyrogen free radio-active gold-198 colloid was produced from irradiated gold foil and was examined biologically and clinically from the viewpoint of practical use.

The colloid was prepared by using the method of reduction with glucose or ascorbic acid and was adjusted to gold concentration 10mg/ml and particle size 3.6-9.5 μ , also it was confirmed that the colloid did not contain ionic gold and its half-life and radiation energy were practically equal to the values as reported in literature.

Then, biological examinations were performed as follows.

1) The local deposition:

The radiogold administered in the subcutaneous tissue of the rabbit deposited at the local for the long time.

2) Leucocyte:

The increase of leucocyte numbers occurred in the case administered in the vein. In other cases treated in the muscles or in the abdominal cavity, the increase was mild.

3) Hematological examination:

The increase of lymphocytes and monocytes appeared slightly by the treatment with the radiogold. No other pathological findings were observed by the hematological examination.

4) The distribution in the mouse:

The up-take of organs was investigated comparing with the groups treated with various methods. The up-take of the Liver and the Kidney was higher in general. The urinary excretion was slight.

5) Radioautograph:

In the case administered in the abdominal cavity, the positive figure was obtained on the surface of the organs.

6) The effects to the experimental ascites cells:

By the treatment with the radiogold the cell numbers were decreased strongly. The life duration of the animals was prolonged two times

longer. And the pycnosis, cytolysis and other findings of the destruction were observed by the treatment.

7) The effects to He La Cell:

By addition of the radiogold to the medium, many He La Cells were destructed and fallen.

8) The effects to the experimental tumor:

The treatment with the radiogold disturbed the development of the tumor.

9) The clinical application:

No complications and no accidents occurred in the cases treated with the radiogold of 50 μ c.