原 著

噴門部癌の食道浸潤および手術成績の検討

日本大学第1外科 (主任: 森田 健教授)

黒 須 康 彦 荒 井 徹 中 西 浩
石 井 郁 夫 水 野 敏 彦 深 町 信 介
佐 藤 公 望 岡 村 治 明 加 部 吉 男
馬 越 文 男 森 田 健

昭和60年迄の10年間に於ける自験噴門部癌39例の食道浸潤, 手術成績を検討した。食道浸潤は48.7%に認められ, 浸潤距離は癌型の肉眼分類, 壁深達度, 癌先進部肉眼型により影響をうける傾向を示した。癌先進部肉眼型が限局型ではOWが1cmを越える症例には, ow (+) 例はなかった。これに対して浸潤型ではow (+) 例はOW 2cm未滿では42.8%, OW 2~3cm未滿では40.0%に認められた。しかし, OWが3cm以上では認められなかった。手術術式は開胸術38.4%, 噴門側胃切除術15.3%, 胃全摘術84.6%, 周囲他臓器合併切除術76.9%であり, 治癒切除率は61.5%であった。手術直死例はなく, 術後合併症発生率は41.0%であった。5年以上経過例の5年生存率は23.0%, 対象全体の累積5年生存率は9.8%であった。累積5年生存率に影響を与える因子としてはstageが最も著明であった。腹部所見がow以外はcurativeな場合は積極的に開胸してow (+) を排除することが重要と思われた。

索引用語: 噴門部癌, 食道浸潤

はじめに

噴門部癌, とくに食道浸潤を伴うものの手術的療法に関しては, 従来より開胸を付加するか, あるいは開腹操作のみで行うかについて種々論議されて来た。すなわち, 術前, 術中, 術後管理や麻酔技術が発達した今日といえども開胸付加の侵襲は大きく, 開胸例の術後合併症発生率は非開胸例のそれよりも高い。しかし, 一方, 癌の根治性の面からは, とくに口側食道断端癌遺残を排除し, また縦隔内リンパ節を郭清する必要があり, 開胸付加が勧められている。

今回, 我々は, 過去10年間に教室および関連病院で経験した噴門部癌を対象に, その食道浸潤および手術成績について検討したので, 若干の文献的考察を併せ報告する。

I. 対象および方法

昭和51年1月より昭和60年12月までの10年間に, 当教室および関連病院で経験した噴門部癌 (中心がE-J junctionより2cm以内にあるもの) 39例を対象とし

た。

これらの症例について, 食道浸潤および手術成績を検討した。

臨床病理学的所見の記載は, 胃癌取扱い規約に従った¹⁾。

II. 成 績

1. 食道浸潤

食道浸潤を認めたのは39例中19例 (48.7%) であった。

1) 浸潤距離

最長3cm, 平均 1.3 ± 0.8 cmであった。

(1) 癌型の肉眼分類との関係

表1に示すごとく, 0, 1型では全例0~1cm未滿であった。これに対して, 2, 3型では, 1~2cm未滿がそれぞれ9.0% (1/11), 28.5% (6/21), 2cm以上に及ぶ症例はそれぞれ27.2% (3/11), 23.8% (5/21) 認められた。

(2) 組織分類との関係

表2に示すごとく, 分化型, 未分化型とも1~2cm未滿および2~3cm未滿に及ぶ症例がそれぞれ21.0%

昭和62年4月11日受付 62年7月10日採用

表 1 癌型の肉眼分類と食道浸潤距離

肉眼型 距離	0 (n=4)	1 (n=1)	2 (n=11)	3 (n=21)	4 (n=1)	5 (n=1)
0~1cm 未満 (n=24)	****	*	***** **	***** *****	*	*
1~2cm 未満 (n= 7)			*	***** *		
2~3cm 未満 (n= 6)			**	****		
3~4cm 未満 (n= 2)			*	*		

表 2 組織分類と食道浸潤距離

組織型 距離	分化型 (n=19)	未分化型 (n=19)	その他 (n=1)
0~1cm 未満 (n=24)	***** ***** *	***** ***** ***	
1~2cm 未満 (n= 7)	****	**	*
2~3cm 未満 (n= 6)	****	**	
3~4cm 未満 (n= 2)		**	

(4/19), 10.5% (2/19) であった。また, 3~4cm 未満に及ぶ症例は分化型には認められず, 未分化型には 10.5% (2/19) 認められた。

(3) 壁深達度との関係

表 3 に示すごとく, 壁深達度が深くなるにつれて, 浸潤距離も長くなる傾向が認められた。

(4) 癌先進部肉眼型との関係

表 4 に示すごとく, 1~2cm 未満に及ぶ症例は限局型では 9.5% (2/21), 浸潤型では 27.7% (5/18) であり, 2cm 以上に及ぶ症例は限局型では 14.2% (3/21), 浸潤型では 27.7% (5/18) であった。

2) 癌先進部より口側断端までの距離 (OW) と癌先進部肉眼型よりみた組織学的癌遺残 (ow) との関係

表 5 に示すごとく, 癌先進部肉眼型が限局型 (21例) では, OW が 1cm を越える症例には ow (+) 例は認められなかった。これに対して, 癌先進部肉眼型が浸潤型 (18例) では OW 2cm 未満では 42.8% (3/7), OW 2~3cm 未満では 40.0% (2/5) が ow (+) であった。しかし, OW が 3cm を越える症例には ow (+) 例は認められなかった。

2. 手術成績

1) 術式

表 6 に示すごとく, 非開胸例 61.5% (24/39), 開胸例 38.4% (15/39) であった。開胸例 15 例中右開胸+開腹 6.6% (1 例), 左開胸+開腹 13.3% (2 例), 左開胸開腹 (斜胴切り法) 80.0% (12 例) であった。非開胸例 24 例中噴門側胃切除術 16.6% (4 例, 再建はいずれ

表 3 壁深達度と食道浸潤距離

深達度 距離	m sm (n=4)	pm (n=5)	ss (n=8)	se (n=19)	si sei (n=3)
0~1cm 未満 (n=24)	****	****	****	***** ***** *	*
1~2cm 未満 (n= 7)		*	**	**	**
2~3cm 未満 (n= 6)			**	****	
3~4cm 未満 (n= 2)				**	

表4 癌先進部肉眼型と食道浸潤距離

距離	肉眼型	限局型 (n=21)	浸潤型 (n=18)
0~1cm 未満 (n=24)		***** ***** ***** *	***** ****
1~2cm 未満 (n=7)		**	*****
2~3cm 未満 (n=6)		**	****
3~4cm 未満 (n=2)		*	*

表5 癌先進部より口側断端までの距離(OW)と癌先進部肉眼型よりみた組織学的断端癌遺残ow(+)の関係

OW	肉眼型	限局型 (n=21)	浸潤型 (n=18)
1cm 未満 (n=7)		××○○○	×○
1~2cm 未満 (n=12)		○○○○○ ○○	××○○○
2~3cm 未満 (n=11)		○○○○○ ○	××○○○
3~4cm 未満 (n=4)		○○	○○
4cm 以上 (n=5)		○	○○○○

○; ow(-)

×; ow(+)

も食道胃吻合), 胃全摘術83.3% (20例, Roux-Y 66.6%, 16例, 空腸間置16.6%, 4例)であった。開胸例15例中噴門側胃切除術13.3% (2例, 再建はいずれも食道胃吻合), 胃全摘術86.6% (13例, Roux-Y 73.3%, 11例, 空腸間置13.3%, 2例)であった。全

体的には胃噴門側切除術15.3% (6例, 再建はいずれも食道胃吻合), 胃全摘術84.6% (33例, Roux-Y 69.2%, 27例, 空腸間置15.3%, 6例)であった。

2) 他臓器合併切除

76.9% (30/39)に行われた。合併切除臓器は脾100% (30/30), 膵(体尾部) 46.6% (14/30), 肝(左葉外側区) 6.6% (2/30), 横隔膜3.3% (1/30)であった。合併切除の理由は脾ではsi 3.3% (1/30), No. 10リンパ節転移20.0% (6/30), 予防的76.6% (23/30)であり, 膵ではsi 14.2% (2/14), No. 11リンパ節転移28.5% (4/14), 予防的57.1% (8/14), 肝, 横隔膜ではいずれも全例(100%) siのためであった。

3) 術後合併症

39例中手術直接死亡例はなかった。術後合併症は表7に示すごとく, 全体では41.0% (16/39), 非開胸例では29.1% (7/24), 開胸例では60.0% (9/15)に認められた。合併症の種類としては, 非開胸例では縫合不全が最も多く, これに対して開胸例では呼吸器合併症が最も多かった。

4) 手術効果

R₂切除術を標準術式としており, 治癒切除率61.5% (24/39)であった。非治癒切除(15例)となった主理由は, HおよびP因子20.0% (3例), S₃ 13.3% (2例), N or n>R 33.3% (5例), ow (+) 33.3% (5例)であった。

なお, 対象39例中ow (+)の出現頻度は(表8), 全体的には17.9% (7例)であり, 癌先進部肉眼型が限局型では9.5% (2/21), 浸潤型では27.7% (5/18)であり, 手術のアプローチでは非開胸例25.0% (6/24)であったのに対して, 開胸例では浸潤型の1例のみで6.6% (1/15)であった。

5) 術後生存率

消息判明率は100%であった。観察期間が5年以上経

表6 手術術式

		非開胸 (n=24)	開胸* (n=15)	計 (n=39)
噴門側胃切除術		16.6(4)	13.3(2)	15.3(6)
胃全摘術	Roux-Y	66.6(16)	73.3(11)	69.2(27)
	空腸間置	16.6(4)	13.3(2)	15.3(6)
		83.3(20)	86.6(13)	84.6(33)

*右開胸+開腹 6.6(1)

左開胸+開腹 13.3(2)

斜胸切法 80.0(12)

数字は%, ()内は症例数

表 7 術後合併症

	合併症発生率	合併症の種類* % (症例数)
非開胸例	29.1% (7/24)	縫合不全 33.3 (3)
		呼吸器 22.2 (2)
		肝障害 22.2 (2)
		肺瘻 11.1 (1)
		創感染 11.1 (1)
		計 100.0 (9)
開胸例	60.0% (9/15)	呼吸器 50.0 (6)
		縫合不全 16.6 (2)
		肝障害 16.6 (2)
		心不全 8.3 (1)
		イレウス 8.3 (1)
		計 100.0 (12)
対象全体	41.0% (16/39)	

* 症例によっては重複する。

表 8 癌先進部肉眼型および手術のアプローチと
ow (+) の頻度

アプローチ 肉眼型	非開胸	開胸	計
限局型	14.2%(2/14)	0.0%	9.5%(2/21)
浸潤型	40.0%(4/10)	12.5%(1/8)	27.7%(5/18)
計	25.0%(6/24)	6.6%(1/15)	17.9%(7/39)

過例の粗 5 年生存率は 23.0% (3/13) であり、対象全体の累積 5 年生存率は 9.8% であった (図 1)。以下、この累積 5 年生存率 (5 生率) と各因子との関係について検討する。有意差検定は Cox-Mantel 法によった。

(1) 食道浸潤との関係

食道浸潤陰性例 (E-) 20 例の 5 生率は 16.9%，陽性例 (E+) 19 例のそれは 6.9% であった。

(2) s 因子との関係

s (-) 例 17 例の 5 生率は 15.6%，s (+) 例 22 例のそれは 6.0% であった (図 1)。両群間の生存率の差は統計学的に有意であった ($p < 0.05$)。

(3) 進行度との関係

5 生率は、stage I (5 例) 100.0%，stage II (7 例) 100.0%，stage III (17 例) 0%，stage IV (10 例) 0% であった (図 2)。stage I と III ($p < 0.05$)，IV 間 ($p < 0.01$) および stage II と III ($p < 0.01$)，IV ($p < 0.01$) 間の生存率の差は統計学的に有意であった。

(4) 手術効果との関係

治癒切除例 (24 例) の 5 生率は 22.7%，非治癒切除

図 1 累積生存率と s 因子：* $p < 0.05$ 図 2 累積生存率と stage: stage I vs stage III, IV; $p < 0.05$, $p < 0.01$, stage II vs stage III, IV; いずれも $p < 0.01$

図3 累積生存率と手術効果：* $p < 0.01$

図4 累積生存率と腹部所見がow 以外は curative な場合の手術アプローチとの関係

例 (15例) のそれは 0% であった (図3)。両群間の生存率の差は統計学的に有意であった ($p < 0.01$)。

(5) 腹部所見および手術のアプローチとの関係

図5 腹部所見が curative な場合における開胸ow (-) 例と非開胸ow (+) 例の累積生存率

腹部所見がow 以外は curative な場合 (29例)、開胸例11例の5生率は67.3%、非開胸例18例のそれは40.8%であった (図4)。これに対して腹部所見がow 以外は non-curative な場合 (10例)、開胸例 (4例)、非開胸例 (6例) とともに5生率は0%であった。さらに、腹部所見が curative でしかもow (-) の場合 (24例)、開胸例10例の5生率は63.0%、非開胸例14例のそれは44.6%であった。これに対して、腹部所見が non-curative で、しかもow (-) の場合 (8例)、5生率は開胸例 (4例)、非開胸例 (4例) とともに0%であった。

また、腹部所見が curative な場合、開胸ow (-) 例10例の5生率は63.0%、非開胸ow (+) 例4例のそれは25.0%であった (図5)。これに対して、腹部所見が non-curative な場合、開胸ow (-) 例 (4例)、非開胸ow (+) 例 (2例) の5生率はいずれも0%であった。

III. 考 察

噴門部癌の根治手術に際して、そのアプローチを選択する上で考慮しなければならないものの1つに癌の食道浸潤と安全な口側切除線設定の問題がある。

まず、食道浸潤の頻度は三戸ら²⁾55.9% (94/168)、榊原ら³⁾57.3% (43/75)、西ら⁴⁾93% (54/58) で、浸潤距離は三隅ら⁵⁾は最長5.3cm、平均 2.3 ± 1.2 cm であっ

たとしている。自験例では、頻度は三戸ら、榊原らの成績にほぼ一致して48.7% (19/39) であり、距離は三隅らの成績よりも短く、最長3cm、平均 1.3 ± 0.8 cmであった。

また、浸潤距離に影響を与える因子として、神前ら⁶⁾の癌型の肉眼型、組織型、深達度、三戸ら²⁾、井口ら⁷⁾の壁深達度、癌先進部肉眼型態(限局型、浸潤型)、西ら⁴⁾の癌型の肉眼分類についての報告がある。これらは、おおむね以下の如く要約出来るものと思われる。すなわち、①癌型の肉眼分類では、浸潤型(3, 4型)の方が限局型(0, 1, 2型)に比較して長い、②壁深達度では、深達度が深くなるにつれて長くなる傾向にある、③癌先進部肉眼型では、浸潤型に長いものが多い。自験例においても、これらとはほぼ同様の成績が得られた。なお、組織型との関係については、神前ら⁶⁾は腺管型腺癌や低分化型腺癌は腺房型腺癌に比べ浸潤距離が長いと報告している。著者らが組織型を分化型、未分化型に2大別して検討した結果では、組織型と浸潤距離との間には特に明らかな関係は見出せなかったが、未分化型では3cmを越える症例が認められた。

次に安全な口側切除線の設定に関しては、秋山ら⁹⁾、井口ら⁷⁾の意見が呈出されている。秋山ら⁹⁾は「肉眼的癌先端より組織学的癌先端までの距離が、限局型0cm、中間型0.7cm、浸潤型2.5cm、先端隆起型1.0cm、深在型0.1cmであった。したがって、肉眼的癌先端より生体内で3cm離して切除すべきである」としている。井口ら⁷⁾は、「①組織学的食道浸潤距離から、肉眼的食道浸潤距離を引いた長さが口側限局型(38例)では2cmを越えるものは認められなかったのに対して、口側浸潤型(59例)では2例(3.4%)認められた、②口側限局型では肉眼的癌先端部より口側断端までの距離(OW)が2cm以上ではow(+)例は認められなかった。これに対して、口側浸潤型ではow(+)例はOW 2cm以下では53.0%(26/49)、OW 2~4cmでは22.2%(2/9)に認められたが、OW 4cm以上では認められなかった。したがって、口側限局型では肉眼的癌先進部より2cm以上、口側浸潤型では4cm以上離して切除する必要がある」と述べている。自験例においては、このOWおよび口側癌先進部肉眼型とow(+)との関係を検討したが、限局型ではOWが1cmを越える症例にはow(+)例は認められなかった。これに対して、浸潤型では、ow(+)例はOW 2cm未満では42.8%(3/7)、OW 2~3cm未満では40.0%(2/5)に認められた。しかし、OWが3cm以上では認められなかった。以上、

総合すると、井口ら⁷⁾をはじめ諸家により指摘されているごとく¹⁰⁾、口側限局型では2cm以上、口側浸潤型では4cm以上肉眼的癌先進部より離して食道を切除すれば安全と考えられる。

噴門部癌の手術術式は、アプローチ、切除範囲、再建法、吻合法等、いずれもが多彩である^{6)7)11)~14)}。西ら¹¹⁾は、「噴門部癌48例中、開胸術37.5%(18例)、噴門側胃切除術62.5%(30例)、胃全摘術37.5%(18例)を行っている。再建は噴門側胃切除術では食道胃吻合23.3%(7例)、空腸 Double tract 法63.3%(19例)、空腸間置10%(3例)、その他3.3%(1例)であり、胃全摘術では空腸 Double tract 法83.3%(15例)、空腸間置5.5%(1例)、Roux-Y 吻合11.1%(2例)であった」と報告している。自験例においては、開胸術は西らの報告とほぼ同様に38.4%に行われていた。しかし、噴門側胃切除術、胃全摘術の頻度あるいは再建法に関しては、西らの報告と異って、前者は15.3%、後者は84.6%に行われ、また再建法に関しては、前者では全例胃食道吻合、後者ではRoux-Y法が最多を占めた。今後は、幽門洞を残すという意味から、噴門側胃切除例でも根治性が期待出来るような症例に対してはそれを積極的に行い、また再建法としては術後愁訴がもっとも少なく、しかもより生理的な再建法(例えば空腸間置法など)を特に治癒切除例に対して選択的にやりたいと考える。

噴門部癌の根治手術に際しても、直接浸潤(S₃)が認められる臓器の合併切除は勿論のこと、また直接浸潤が認められない場合でも、特に脾門リンパ節(No. 10)あるいは脾動脈幹リンパ節(No. 11)を予防的、あるいは治療的に郭清する目的で脾や脾に加えて脾体尾部の合併切除がしばしば行われる¹¹⁾¹⁵⁾。自験例においても、他臓器合併切除が76.9%の症例に施行され、合併切除臓器としては脾あるいは脾+脾体尾部が大部分であり、しかもそれらは特にNo. 10あるいはNo. 11リンパ節の予防的郭清のために行われたものが過半数を占めた。近年このリンパ節郭清を目的とする他臓器合併切除については、特に転移陰性と判定されたリンパ節を郭清する目的での他臓器合併切除に関して、賛否両論のみられるところである^{16)~21)}。今後臓器欠損によるデメリットと併せ、検討を要するものと思われる。

手術直接死亡率は、全体的には、西ら¹¹⁾8.3%、加治佐ら¹⁵⁾10.1%、種村ら²²⁾19.4%と報告しており、アプローチ別では榊原ら³⁾非開胸例5.6%、開胸例40%、西ら¹¹⁾非開胸例6.6%、開胸例11.1%と報告している。自

験例では手術直接死亡例は認められなかった。

術後合併症は、飯塚ら²³⁾は50.4%にみられ、その種類としては縫合不全、呼吸器合併症、心房細動などが多かったとしている。加治佐ら¹⁵⁾は、全体的には59.4%、非開胸例では58.9%、開胸例では60.0%にみられ、種類としては非開胸例では創感染、呼吸器合併症、肝障害などが、一方開胸例では呼吸器合併症、創感染、肝障害などが目立ち、縫合不全は全体的には5%、非開胸例10%、開胸例0%に認められたと報告している。自験例では合併症は全体的には41.0%、非開胸例では29.1%、開胸例では60.0%に認められた。また、その種類として非開胸例では縫合不全、開胸例では呼吸器合併症が最多を占めた。以上、噴門部癌の手術的療法においては、一般に、手術直接死亡率や術後合併症の発生率が高く、しかもそれらは手術侵襲の大きさから考えて当然のことながら開胸例に特に高いということがいえる。

噴門部癌の手術効果に関しては、治癒切除率は、石川ら²⁴⁾46.2%、加治佐ら¹⁵⁾72.1%、種村ら²²⁾69.4%と報告している。自験例では61.5%であった。一方、非治癒切除となった主理由については、石川ら²⁴⁾はHおよびP因子が約半数を占めたとしている。またS₃のみで非治癒切除となったものは少なく、Nおよびn>Rのものが約23%、OW(+)のみが約26%に認められたと報告している。種村らはP因子およびn>Rがそれぞれ約半数、H因子9.1%、ow(+)が36.4%であったとしている。自験例ではHおよびP因子20.0%、S₃13.3%、N or n>R 33.3%、ow(+) 33.3%であった。ちなみに、これらの諸因子のうち手術によって排除し得るものは、特にHの一部およびS₃、N、n>R、ow(+)の3者である。しかし、一般に深達度の高度のものではR-numberを高めても予後は著明に向上しないといわれている²⁴⁾。したがって、これらの諸因子のうち、なかでも手術によって排除し得る因子、特にow(+), すなわち口側断端の癌遺残をなくすことが噴門部癌の予後向上にとってもっとも手近かでしかも有効な手段と考えられる²⁴⁾。

一方、このow(+)の出現率について、井口ら⁷⁾は癌先進部限局型では15.7%、浸潤型では48.2%と報告しており、またow(+)例は一般に非開胸例に多く認められている。自験例においてもow(+)例は浸潤型および非開胸例に多く認められた。これらは、癌先進部肉眼型が浸潤型では食道の切除範囲を特に慎重に決定する必要があり、また噴門部癌の手術にあたっては

開腹のみによる手術操作には限界があることを示すものと思われる。

噴門部癌の予後は、切除後の5生率が20~30%といまだあまり良好でなく⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾、また、予後に影響を与えるものとして、胃癌取扱い規約¹⁾であげられている諸因子や切除標本の後壁剝離面における癌の露出程度などがあげられている⁷⁾²⁶⁾²⁷⁾。自験例では、観察期間が5年以上経過例の粗5生率は23.0%、対象全体の累積5生率9.8%、治癒切除例のそれは22.7%であった。また、予後に影響を与える因子としては、検討したなかでは、当然のことながら進行度がとくに目立った。すなわち、累積5生率はstage I, IIいずれも100.0%、stage III, IVいずれも0%であった。これは、やはり早期の噴門部癌をできるだけ多く診断することが、その治癒につながることを示すものと思われる。なお、自験例の検討で、①腹部所見がow以外はcurativeな場合、開胸例の5生率は非開胸例のそれより良好な傾向が認められ、これは腹部所見がcurativeで、しかもow(+)例に限定して検討しても同様であった。しかし、腹部所見がow以外はnon-curativeな場合にはそのような関係が認められず、これは腹部所見がnon-curativeで、しかもow(+)例に限定して検討しても同様であった。②同様に腹部所見がcurativeな場合、開胸ow(+)例の5生率は非開胸ow(+)例のそれより良好な傾向が認められた。しかし、腹部所見がnon-curativeな場合にはそのような関係は認められなかった。ここで、①には縦隔内リンパ節の郭清が一因として関与しているものと推測され、また、②は、井口ら⁷⁾も指摘しているごとく、腹部所見がcurativeな場合には、積極的に開胸してow(+)を排除することが、予後向上につながることを示唆するものと思われる。

おわりに

教室および関連病院では昭和51年1月より昭和60年12月までの10年間に、噴門部癌39例を経験した。そこで、今回これらの症例の食道浸潤および手術成績を検討し、今後の手術方針とともに若干の文献的考察を加え報告した。

文 献

- 1) 胃癌研究会編：胃癌取り扱い規約。改訂第11版，金原出版，東京，1985
- 2) 三戸康郎，犬尾修三，平野雅士他：食道浸潤状況よりみた下部食道噴門癌の手術適応，癌の臨 20：119—127，1974

- 3) 榊原 宣, 矢沢知海, 羽生富士夫他: 噴門部癌について, 腹腔内手術の限界, 手術 24: 619—622, 1969
- 4) 西 満正, 愛甲 孝, 加治佐隆他: 噴門部(胃)癌の臨床上的特徴, 外科 Mook 28: 104—116, 1982
- 5) 三隅厚信, 原田和則, 馬場憲一郎他: 噴門部癌の治療, 日医新報 3218: 13—19, 1985
- 6) 神前五郎, 岡川和弘: 下部食道噴門部癌の手術, 今日の臨床外科 13: 39—54, 1979
- 7) 井口 深, 杉町圭蔵, 神代龍之介他: 下部食道・噴門部癌手術術式の選択, 1. 特に口側・肛門側切除範囲の検討, 消外 5: 1861—1866, 1982
- 8) 西 満正, 末永豊邦, 加治佐隆 他: 噴門部癌の病理, 外科 Mook 14: 128—146, 1980
- 9) 秋山 洋, 坂本啓介, 豊島範夫他: 下部食道噴門癌の食道側浸潤口側切除線ならびに胸腔内リンパ節転移に関する研究, 胃と腸 7: 801—808, 1972
- 10) 藤巻雅夫, 唐木芳昭, 麓 耕平他: 口側切除断端の癌遺残例に対する術式, 消外 5: 1881—1886, 1982
- 11) 西 満正, 加治佐隆, 末永豊邦他: 食道・胃境界領域癌の特殊性, 手術 32: 827—833, 1978
- 12) 西 満正, 太田恵一郎, 土屋繁裕: 食道・胃接合部癌, 外科診療 28: 1299—1307, 1986
- 13) 掛川暉夫: 噴門部癌の手術, 左開胸・腹直筋横切による開腹, 消外 5: 1948—1960, 1982
- 14) 鍋谷欣市, 本島悌司, 伊藤賢一郎: 下部食道噴門部癌手術, 消外セミナー 23: 44—58, 1986
- 15) 加治佐隆, 西 正満, 愛甲 孝他: 下部食道噴門部癌の手術術式の選択, 消外セミナー 16: 132—298, 1984
- 16) 丸山圭一, 北岡久三, 平田克治他: 脾門, 脾動脈幹リンパ節郭清, 臨外 39: 1529—1533, 1984
- 17) 宮下 薫, 武藤輝一, 佐々木公一他: 脾門, 脾動脈幹リンパ節郭清, 臨外 39: 1535—1538, 1984
- 18) 吉野肇一, 熊井浩一郎, 浅沼史樹他: 胃癌手術における脾摘の是非, 臨外 39: 1539—1542, 1984
- 19) 黒須康彦, 深町信介, 田中述彦他: 胃癌患者脾単核細胞の自己末梢血リンパ球幼若化反応に及ぼす影響, とくにその biphasic effect について, 日外会誌 84: 965—969, 1983
- 20) 神代龍之介, 杉町圭蔵, 白石守男他: 脾摘術の担癌宿主抵抗性に及ぼす影響, —とくにその相反効果について, 日外会誌 84: 978—981, 1983
- 21) 峠 哲哉, 浜本直徳, 板垣衛治他: 脾におけるサプレッサー細胞活性の動態とがん治療における脾摘の意義, 日外会誌 84: 961—964, 1983
- 22) 種村広己, 田中千凱, 伊藤隆夫他: 噴門部癌切除症例の検討, 日消外会誌 19: 1699—1705, 1985
- 23) 飯塚紀文, 加藤抱一: 下部食道噴門部癌手術, 消外 8: 766—767, 1985
- 24) 石川 純, 岡島邦雄, 藤井康宏他: 噴門部癌の検討 —とくに食道進展について, 外科 39: 893—857, 1977
- 25) 西 満正, 野村秀洋, 加治佐隆他: 食道・胃境界領域癌の外科的治療の問題点, 胃と腸 13: 1497—1507, 1978
- 26) 城所 仵, 林田康男, ト部元道他: 下部食道噴門部癌の進展形式と予後, 消外セミナー 16: 114—130, 1984
- 27) 佐々木迪郎, 荻田征美, 及川隆司: 食道・胃境界領域癌の予後因子—とくに組織学的癌露出程度について, 日消外会誌 14: 1543—1548, 1981

ESOPHAGEAL INVASION AND THE RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT OF GASTRIC CANCER IN THE CARDIAC REGION

Yasuhiko KUROSU, Tooru ARAI, Hiroshi NAKANISHI, Ikuo ISHII, Toshihiko MIZUNO,
Shinsuke FUKAMACHI, Kobo SATO, Haruaki OKAMURA, Yoshio KABE,
Fumihiko UMAKOSHI and Ken MORITA

First Department of Surgery, Nihon University School of Medicine

For the last 10 years, we experienced 39 cases of gastric cancer at the cardiac region. In this paper, the esophageal invasion of the cancer and the results of the surgical treatment were analyzed. The esophageal invasion was seen in 48.7% and the length of it tended to be influenced by the macroscopic appearances of the lesion itself and its oral margin and the degree of gastric wall penetration of the cancer. The distance at which the esophagus should be divided to give a tumor free oral margin differed depending upon the macroscopic appearances of the oral margin of the cancer. Thoracotomy was done in 38.4%. Proximal gastrectomy was done in 15.3%. Total gastrectomy was done in 84.6%. Combined resections of adjacent organs were performed in 76.9%. No operative death was noted. But, postoperative complications were seen in 41.0%. A cumulative 5 year survival rate was 9.8% and staging classification influenced it most. In cases where addominal lesion was found to be removed curatively, thoracotomy to avoid residual cancer at oral resection line appeared to improve the prognosis.