原 著

切除例からみた細小肝癌治療の問題点

大阪市立大学第2外科（主任：酒井克治教授）

久保正二 酒井克治 木下博明

広橋一裕 街保敏 沖本俊明

福嶋康臣 岩佐隆太郎 李光春

肝切除施行 small liver cancer（細小肝癌）のうち術後再発をきたした7例（再発群）と術後3年以上無再発で経過した5例（無再発群）の臨床像および臨床病理学的所見を比較し、細小肝癌治療の問題点について検討した。肝切除施行例の臨床病期は stage I あるいは II であり、stage III 症例に対しては他の治療法を選択すべきである。再発群には HBs 抗原あるいは抗体陽性例が多かった。また再発群には単結節周囲増殖型や多結節癒合型あるいは被膜浸潤陽性例が多いことから、それらに対する処置が重要である。細小肝癌であっても肝部分切除術よりも亜区域切除術、区域切除術などの系統的肝区域切除術が望ましく、また部分切除術に終わった症例には他の治療法を追加すべきである。さらに術前併用療法として動脈塞栓術だけでなく、経皮経肝門脈枝塞栓術などによって抗腫瘍効果を増強させておくことが必要である。

索引用語：small liver cancer, 肝切除術, 細小肝癌術後再発, 肝動脈塞栓術, 経皮経肝門脈枝塞栓術

はじめに

近年、肝細胞癌（以下、肝癌）に対して肝切除療法のほかには肝動脈塞栓術（以下、TAE）、経皮経肝門脈枝塞栓術¹⁾（以下、PTPE）や経皮的エタノール局所注入療法²⁾³⁾（以下、PEIT）などが考案され、かつそれらの治療法の組み合わせによる集学的治療が行われるようになった。一方、各種画像診断法の進歩や肝癌に対する high risk group の設定に基づいたスクリーニングにより比較的小さな肝癌の発見が増加している。しかし、これら small liver cancer⁴⁾（以下、細小肝癌）の多くは高度な肝硬変症を併存し、肝予備能の減少を伴っており、治療法の選択の幅が狭いのも事実である。そこで肝切除術施行細小肝癌症例の臨床像および臨床病理学的所見を検討し、細小肝癌に対する治療上の問題点について考察を加えた。

対象と方法

昭和56年7月より昭和62年12月までの期間に大阪市立大学第2外科で切除された肝癌166例中細小肝癌症例は22例13.3%であった。この22例中6例はすでに死

亡し、その死因は術死1例、骨転移を伴った肝不全死1例、癌死4例であった。また3例は再発生存中であり、他の13例は無再発生存中である。すなわち8例が再発をきたしたが、このうち多中心性発生の疑われた1例を除く7例の再発時期を調べると、全例の再発病巣が術後3年以内に発見されていた。そこで今回、生死にかかわらず再発のみられたこの7例（以下、再発群）と、今後再発の可能性が低いと考えられる術後3年以上無再発生存中の5例（以下、無再発群）を比較し、その臨床像および臨床病理学的所見から細小肝癌治療上の問題点について検討を加えた。

結 果

1. 臨床像と経過

無再発群は57歳から67歳（平均62.2歳）で、男3例、女2例、再発群は54歳から70歳（平均61.7歳）、男5例、女2例であり、両群間の年齢、性別に差はみられなかった。両群とも全例肝硬変症を併存し、その臨床病期⁴⁾をみると無再発群の5例中4例80%が stage I であったのに対し、再発群の7例中4例57%が stage II 症例であった。なお両群とも stage III の症例はなかった。無再発群全例で HBs 抗原あるいは抗体が検出されな

昭和63年2月15日受付 63年7月15日採用

表 1 細小肝癌の臨床像と経過

	症例 番号	年齢・性	臨床病期	HB	手術術式 (切除)	術後再発の 確認時間	再発部位	予 後
無再発群	1	67 男	I	—	亜区域	—	—	3年10ヵ月, 生
	2	61 男	I	—	亜区域	—	—	3年10ヵ月, 生
	3	62 女	I	—	亜区域	—	—	3年7ヵ月, 生
	4	57 女	II	—	部 分	—	—	3年3ヵ月, 生
	5	64 男	I	—	部 分	—	—	3年2ヵ月, 生
再 発 群	6	65 男	II	—	部 分	3年	肝	3年2ヵ月, 死
	7	66 女	I	抗体	部 分	2年2ヵ月	肝	2年8ヵ月, 死
	8	55 男	I	抗体	亜区域	1年8ヵ月	肝	2年8ヵ月, 死
	9	61 男	I	抗体	区 域	2年5ヵ月	肝	2年8ヵ月, 死
	10	61 女	II	—	部 分	1年9ヵ月	肝	2年8ヵ月, 生
	11	54 男	II	—	部 分	1年3ヵ月	骨	2年3ヵ月, 死
	12	70 男	II	抗原	亜区域	1年2ヵ月	肝	1年5ヵ月, 生

表 2 細小肝癌の臨床病理学的所見

	症例 番号	肉眼分類 (型)	異型度 (Ed 分類)	被膜形成 (fc)	被膜浸潤 (fc-inf)	脈管侵襲 (v)	肝切離面における 癌浸潤 (TW)
無再発群	1	単結節	II	+	+	—	+
	2	単結節周囲増殖	不明	+	—	—	—
	3	単結節	不明	+	—	—	—
	4	単結節	III	+	—	—	+
	5	単結節	II	—	/	—	+
再 発 群	6	単結節	II	+	—	—	+
	7	単結節周囲増殖	I	+	+	—	+
	8	単結節周囲増殖	不明	+	+	—	—
	9	単結節周囲増殖	II	+	+	—	—
	10	多結節癒合	II	—	/	—	+
	11	多結節癒合	III	+	—	—	—
	12	単結節	III	+	+	—	—

かったが、再発群では7例中1例14%にHBs抗原が、また3例43%にHBs抗体が検出された。亜区域切除術あるいは区域切除術などのいわゆる系統的肝区域切除術⁵⁾が無再発群の5例中3例60%に施行されたのに対し、再発群では系統的肝区域切除術が7例中3例43%に施行され、無再発群では系統的肝区域切除術の占める割合が再発群に比べやや多かった(表1)。

2. 臨床病理学的所見

無再発群、再発群ともに全例がEggelの分類⁶⁾上、結節型であった。原発性肝癌取り扱い規約⁴⁾による肉眼分類上、無再発群5例中4例80%が単結節型に分類され、単結節周囲増殖型は1例20%にすぎず、また多結節癒合型はなかった。一方、再発群では単結節型は7例中2例28%にすぎず、単結節周囲増殖型が3例43%と最も多く、2例28%が多結節癒合型に分類された。Ed-

mondson and Steiner 分類⁷⁾上、両群ともII型が最も多く、次いでIII型であり、I型は再発群の1例だけであった。なお、無再発群の2例および再発群の1例は術前併用療法のため腫瘍が完全壊死に陥っており、分類不能であった。被膜形成(fc)は無再発群の5例中4例80%、再発群の7例中6例87%にみられ、両群間に差はなかった。またそれら癌部被膜への浸潤(fc-inf)をみると、無再発群の4例中1例25%に被膜浸潤が観察されたにすぎなかったのに対し、再発群では6例中4例67%と高率に観察された。しかし、両群とも門脈、肝静脈、胆管への侵襲の認められた症例はなかった。すなわち、対象症例全例の肉眼的進行程度⁸⁾がStage Iに相当した。つぎに肝切離面における癌浸潤(TW因子)を検討したところ、無再発群の5例中3例60%がTW(+), 2例40%がTW(-)であったのに対し、

表3 術前併用療法とその効果

	症例 番号	内 容	効 果	
			主 腫 瘍	被膜浸潤
無再発群	1	TAE	完全壊死	一部壊死
	2	TAE+PTPE	完全壊死	—
	3	TAE	完全壊死	—
再 発 群	7	TAE	部分壊死	一部壊死
	8	TAE+PTPE	完全壊死	90%壊死
	11	TAE	部分壊死	—

再発群では7例中3例43%がTW (+), 4例57%がTW (-)であり, TW (-)であっても再発をきたすことが明らかとなった(表2)。なお, 再発形式を検討すると, 再発7例中6例では術後早期に同区域ないしは同側の肝葉に再発病巣が出現したことから経門脈性転移と考えられ, 他の1例は遠隔転移が認められたが, 断端再発と考えられる症例はなかった。

3. 術前併用療法

われわれは術前併用療法としてTAEやPTPEを施行している¹⁰⁾が, そのうちわけは両群ともにTAE単独施行が各々2例, TAEおよびPTPE併用施行が各々1例であった。その効果を検討すると, 無再発群では全例の主腫瘍に完全壊死が認められたのに対し, 再発群では3例中1例に完全壊死が, 他の2例では部分的な壊死が認められたにすぎなかった。被膜浸潤に対してTAEは両群ともその一部に壊死をもたらしたにすぎないが, TAEとPTPEの併用例では被膜浸潤がほとんど壊死に陥っていた(表3)。

考 察

近年, 細小肝癌に対して切除療法, TAE, PEIT²³⁾などの種々の治療法が積極的に試みられているが, それら治療法の選択と実施にあたって細小肝癌の特徴を把握することが重要であると考えられる。そこで肝切除施行細小肝癌22例のうち再発をきたした7例(再発群)と今後再発の可能性が低いと考えられる術後3年以上無再発生存中の5例(無再発群)を比較し, 細小肝癌の臨床像および臨床病理学的所見からその治療の問題点について検討した。

肝細胞癌の約80%が肝硬変症を併存しているといわれている⁹⁾が, 対象症例は全例肝硬変症を伴っていた。これはhigh risk groupに対するスクリーニングが発見の動機になったことによると考えられる。しかしその臨床病期はstage Iあるいはstage IIであり, 比較的軽度の肝硬変症併存症例が切除の対象となってい

た。すなわちstage IIIのような肝機能予備力の乏しい症例はたとえ腫瘍が小さくとも切除の対象となり難しく, TAEやPEITなどの治療が選択されるべきであると考えられた。HBs抗原陰性が再発の高危険因子とする報告¹⁰⁾がみられるが, 一般にHBs抗原陽性肝癌の進展は速いといわれ¹¹⁾, 自験例でも再発群にHBs抗原あるいは抗体が陽性であった。しかもHBs抗原陽性であった症例12は被膜浸潤を伴い, 再発群のなかで術後最も早い時期(術1年2ヵ月後)に再発が確認された。したがってHBウィルスが再発に関与する可能性が推察された。

著者らは細小肝癌の切除療法には亜区域切除術あるいは区域切除術等の門脈枝を重視したいわゆる系統的肝区域切除術⁹⁾の施行を原則としている。しかし, 臨床病期がstage IIであると肝実質の温存が術式選択の第一条件となり, 系統的肝区域切除術ではない部分切除術に終わる症例が多く, 結果的に再発をきたしたとも考えられる。

Eggelの分類⁶⁾上, 腫瘍は全例結節型であり, 被膜形成は無再発群, 再発群のそれぞれ80%, 87%と高頻度にみられた。しかし, 今回の対象となった12例のうち, TAEやPTPEなどの術前併用療法施行6例全例に被膜形成がみられたのに対し, 術前併用療法非施行6例のうち2例に被膜が形成されていなかった。したがって術前併用療法と被膜形成との間には何らかの関係があるのではないかと考えられた。原発性肝癌取扱規約による肉眼分類⁹⁾上, 再発群では無再発群に比べ, 単結節周囲増殖型や多結節癒合型が多かった。一方, 被膜浸潤は細小肝癌であってもその60%から85.7%にみられたと報告されている¹²⁾⁻¹⁴⁾。自験例では無再発群の25%に観察されたにすぎなかったが, 再発群では67%の高率に観察された。また肉眼分類と被膜浸潤の関係をみると, 単結節型6例中2例に被膜浸潤が観察されたにすぎないのに対し, 単結節周囲増殖型4例中3例に被膜浸潤が存在し, それらの症例はいずれも術後再発をきたした。そこで腫瘍の肉眼分類と被膜浸潤の有無が再発に関与する重要な因子であり, また結節型の内でも単結節型, 単結節周囲増殖型, 多結節癒合型によって進展様式やその程度が異なると推察された。したがってPEITなどの治療を選択する場合, 被膜浸潤に対する処置が必要である。すなわち, 品川ら²⁾の報告のようにエタノールを注入する際, 腫瘍内だけでなく被膜外の周囲肝組織にも注入する必要があると考えられた。

自験例の TW 因子をみると無再発群の60%が TW (+)であり、再発群の57%が TW (-)であった。また断端再発と考えられる症例はなく、TW 因子は予後には関係しないと考えられた。さらに細小肝癌であっても門脈侵襲が20%から25%に観察されたという報告⁹⁾¹⁴⁾を勘案すると再発は区域や亜区域内に転移した細胞集団によって発生すると推察される。そのため肝部分切除術に終わった症例には術後他の治療法を追加する必要があると考えられた。

術前併用療法について竜ら¹⁵⁾は術後再発に TAE が有効であったと報告しているが、自験例でみられたようにその併用療法の抗腫瘍効果が強いことが望ましいと考えられる。しかし、TAE のみでは腫瘍内部に広範囲の壊死をもたらすが、その壊死は部分的であることもあり、また被膜浸潤や門脈侵襲に対する効果は少ないといわれている¹¹⁾¹⁶⁾。事実 TAE は4例中2例の主腫瘍の完全壊死と被膜浸潤の一部に壊死をもたらしただけで、TAE の効果が不十分であった症例7および11に再発がみられている。したがって術前処置として TAE のみでは十分ではなく、担癌区域の PTPE などによって抗腫瘍効果を増強させておく必要があると考えられた。

結 語

肝切除術施行細小肝癌のうち術後再発をきたした7例と術後3年以上無再発で経過した5例の臨床像および臨床病理学的所見を比較検討し、以下の結論を得た。

1. 肝切除術施行例の臨床病期は stage I あるいは II であり、stage III の症例に対しては他の治療法を選択すべきである。

2. HBs 抗原あるいは抗体陽性例は再発をきたしやすい。

3. 再発群には単結節周囲増殖型や多結節癒合型が多く、また被膜浸潤例が多いことより、それらに対する処置が重要である。

4. 肝部分切除術よりも亜区域切除術、区域切除術などの系統的肝区域切除術が望ましい。

また部分切除術に終わった症例には他の治療法を追加すべきである。

5. 術前併用療法として TAE だけではなく、PTPE などによって抗腫瘍効果を増強させておくことが必要である。

本研究の一部は昭和62年度厚生省研究助成金（肝がんの外科療法を中心とした集学的研究）による。

文 献

- 1) Kinoshita H, Sakai K, Hirohashi K, et al: Preoperative portal vein embolization for hepatocellular carcinoma. *World J Surg* 10: 803—808, 1986
- 2) 品川 孝, 宇梶晴康, 飯野康夫他: 小肝細胞癌に対する超音波映像下腫瘍内エタノール注入療法の試み, *肝臓* 26: 99—105, 1985
- 3) 藤本隆史, 真島康雄, 田中正俊他: 小肝細胞癌に対する経皮的超音波ガイド下エタノール局注療法の検討, *肝臓* 27: 1559—1567, 1986
- 4) 日本肝癌研究会編: 臨床・病理. 原発性肝癌取扱い規約. 金原出版, 東京, 1987
- 5) 山崎 晋, 長谷川博, 幕内雅敏: 細小肝癌の臨床病理学的分析と、それにもとづく新しい概念の切除法—27切除例の検討—, *肝臓* 22: 1714—1724, 1981
- 6) Eggel H: Ueber des primare Carcinoma der Leber. *Beitr z Path Anat u z allgem Pathol* 30: 506—604, 1901
- 7) Edmondson HA, Steiner PE: Primary carcinoma of the liver. A study of 100 cases among 48,000 necropsies. *Cancer* 7: 462—503, 1954
- 8) 木下博明, 広橋一裕: 肝細胞癌, 肝・胆・膵 15: 441—449, 1987
- 9) 日本肝癌研究会編: 原発性肝癌に関する追跡調査 (第7報), *肝臓* 27: 1161—1169, 1986
- 10) 小幡 裕, 久満薫樹, 本池洋二他: 肝炎・肝硬変・肝癌の関連, 肝・胆・膵 5: 955—961, 1982
- 11) 高安賢一, 村松幸男, 森山紀之他: 小型肝細胞癌97例の術後残肝再発に関する臨床放射線の検討, *日消誌* 84: 1424—1432, 1987
- 12) 竜 崇正: 細小肝癌の診断と予後, *肝臓* 24: 1464—1466, 1983
- 13) 広岡 昇, 岩崎 勇: 小肝癌の腫瘍構造と、その進展様式に関する病理組織学的検討, *肝臓* 25: 384—392, 1984
- 14) 三村 久, 高倉範尚, 浜崎啓介他: 臨床病理学的検討からみた早期原発性肝細胞癌の考え方と切除上の問題点, *日消外会誌* 18: 2453—2458, 1985
- 15) 竜 崇正, 山本義一, 山本 宏他: 細小肝癌に対する Transcatheter Arterial Embolization 併用肝切除の意義, *肝臓* 25: 881—889, 1984
- 16) 広橋一裕, 酒井克治, 木下博明他: 肝動脈塞栓療法後肝切除施行肝細胞癌症例の臨床的ならびに病理組織学的研究, *日外会誌* 56: 555—565, 1985

THE TREATMENT OF SMALL LIVER CANCERS EXAMINED IN TERMS OF
CLINICAL AND PATHOLOGICAL FINDINGS

Shoji KUBO, Katsuji SAKAI, Hiroaki KINOSHITA, Kazuhiro HIROHASHI,
Yasutoshi TSUJI, Toshiaki OKIMOTO, Yasuomi FUKUSHIMA,
Ryutaro IWASA and Kwang Choon LEE

Second Department of Surgery, Osaka City University Medical School

To determine possible ways to treat small liver cancers less than 2 cm in diameter, we compared the clinical and pathological findings in patients with recurrence following liver resection with such findings in patients without. The clinical stage of the patients in both groups was either stage I or II. HBsAg or HBsAb was present only in some patients in the group with recurrence. In most patients who later had a recurrence, there was invasion of the capsule or the surrounding hepatic tissue at the time of resection; therefore it is important to treat such invasion. These patients should be treated by radical surgery, with selective removal of the tumor-bearing area, such as by subsegmentectomy or segmentectomy. Preoperative transcatheter arterial embolization (TAE) was not effective in preventing recurrence; therefore so it is necessary to enhance the effect of TAE by portal vein embolization.