症 例

肝細胞癌との鑑別に難渋した右尾状葉原発肝血管腫の1切除例

大同病院外科

榑 野 正 人 近 藤 成 彦 金 井 道 夫
森 光 平

名古屋大学第1外科

二 村 雄 次 向 山 博 夫 神 谷 順 一

症例は56歳の女性で、血尿の精査にて入院中、腹部超音波検査にて肝腫瘤が発見された。腹部血管造影では、腫瘍血管の著明な増生、支配動脈の拡張、不整な腫瘍濃染像を認めた。Angio-CTでは、腫瘍は造影剤注入直後から中心部以外は、ほぼ均一に濃染し、その濃染が経時的に中心部にも移行してゆく像を認めた。Angio-CTからは、肝血管腫も強く示唆されたが、血管造影、特に腫瘍血管の著明な増生像より、肝細胞癌と診断し手術を施行した。腫瘍は右尾状葉に存在し、尾状葉全切除を伴う左葉内側区および右葉前上区域切除という非定型的術式にて切除しえた。病理組織学的には、腫瘍は肝海綿状血管腫で、悪性像は認められなかったが、腫瘍の被膜外に動脈枝を多数認め、血管造影の所見をよく反映していると考えられた。血管造影上、肝細胞癌との鑑別が困難な肝血管腫が存在する点に留意すべきである。

索引用語：肝血管腫、血管造影、腫瘍血管

はじめに

血管造影上、支配動脈の拡張、腫瘍血管の増生といった肝細胞癌類似の所見を呈した肝海綿状血管腫の1切除例を経験したので、両者の画像診断上における鑑別を中心に若干の考察を加えて報告する。

症 例

患者：56歳、女性。

主訴：血尿。

家族歴：特記すべきことなし。

既往歴：特記すべきことなし。

現病歴：昭和60年6月下旬より血尿に気づき、7月10日精査のため当科入院となった。血尿の原因は、膀胱鏡、経静脈性腎盂膀胱造影などから出血性膀胱炎と診断したが、腹部超音波検査にて肝に腫瘤が発見された。

入院時現症：体格中等、栄養良、貧血(-)、黄疸(-)、胸部理学的所見異常なし。腹部は平坦、軟で、肝、脾、腫瘤を触知しない。

入院時検査成績：尿検査で赤血球(++)である以外、

異常を認めなかった。腫瘍マーカーも CEA 0.5ng/ml, AFP 2ng/ml, CA19-9 12U/ml, Ferritin 64.1ng/ml と正常であった。

腹部超音波検査(図1)：左葉内側区頭側に、65×54mmと25×16mmの境界明瞭な類円形の腫瘤が2つ存在し、右および左肝静脈を圧排していた。中肝静脈は

図1 腹部超音波像：腫瘍は、類円形で右および左肝静脈を圧排している。

IVC：下大静脈，RHV：右肝静脈，LHV：左肝静脈

昭和62年5月16日受付 62年10月26日採用

描出できなかった。腫瘍の内部は全体に肝実質と同程度のエコーレベルで、内部に小さな低エコー部を認めたが、質的診断は困難であった。

肝シンチグラム：左葉内側区頭側に、陰影欠損像が認められた。

腹部血管造影(図 2a, b, c)：動脈相では、屈曲、蛇行した腫瘍血管の豊富な増生を、静脈相では、不整な腫瘍濃染像を認めた。腫瘍は、中肝動脈、右肝動脈前上区域枝からも栄養されていたが、主支配血管は著明に拡張した右尾状葉枝であった。経動脈性門脈造影で

図 2a 腹部血管造影像(動脈相)：腫瘍血管の著明な増生を認める。ノは拡張した右尾状葉動脈枝。

図 2b 腹部血管造影像(静脈相)：不整な腫瘍濃染像を認める。

図 2c 経動脈性門脈造影像：矢印に示すように左葉内側区門脈枝に圧排所見を認める。

図 3a CT 像(CE)：腫瘍は肝門部と下大静脈の間に位置している。

は、左葉内側区門脈枝に圧排所見を認めたが、門脈内腫瘍栓は認めなかった。

Computed Tomography (以下, CT)：主腫瘍は、肝門部と下大静脈の間、やや右側に存在しており、右尾状葉原発と診断した(図 3a)、カテーテルを固有肝動脈まで挿入して施行した Angio-CT では、腫瘍は造影剤注入直後から中心部以外はほぼ均一に濃染し、その濃染は経時的に中心部にも移行し、比較的長時間にわたって認められた(図 3b)。

以上、画像診断では、Angio-CT からは肝血管腫も考慮されたが、血管造影像より右尾状葉原発の肝細胞癌と診断した。

図 3b Angio-CT 像：腫瘍濃染は、経時的に周辺部から中心部へ拡がり、その濃染は比較的長時間認められる。（数字は造影剤注入後の秒数）

図 4 手術終了図：尾状葉全切除を伴う拡大内側区域切除術。

IVC：下大静脈 R-HV：右肝静脈、L-HV：左肝静脈、\：右葉前上区域グリソン断端、／／：右葉前下区域グリソン

手術所見：8月5日、両側季肋下切開にて開腹。肝硬変（－）。腹水（－）。尾状葉の腫瘍は肝表面から全く同定できなかったが、他に、左葉内側区の横隔膜側

図 5a, b 切除標本（矢印の方向が頭側を示す）：a：標本を左側切離面よりみる、b：標本を右側切離面よりみる。（\：中肝静脈断端、T：腫瘍）

にクルミ大の腫瘍が認められた。尾状葉全切除を伴う拡大内側区域切除術（尾状葉＋左葉内側区＋右葉前上区域切除術）を施行した（図 4）。手術時間 8 時間 9 分、出血量 3,756cc であった。

切除標本肉眼所見（図 5a, b, c）：切除肝重量は、420 g。主腫瘍は右尾状葉を占居し、大きさ 60×50mm で、正常肝組織とは明瞭に区別され、全体に暗赤色であったが、中心部は白色調を呈していた。左葉内側上区の小腫瘍も暗赤色を呈し、主腫瘍と同じ性状であった。

病理組織所見：2 コの腫瘍とも悪性像はなく、肝の海綿状血管腫と診断された。腫瘍の大部分は比較的大きな血管腔と疎な隔壁より構成されていたが（図 6a）、中心部の白色調の部分は、硝子変性に陥っており、小さな血管腔が散在性に認められた（図 6b）。また、腫瘍は明瞭な被膜を有し、被膜外には、腫瘍の栄養動脈と思われる動脈枝が多数認められた（図 6c）。術後経過は良好で、術後 13 カ月の現在、元気に社会復帰している。

図 5c 切除標本断面像：主腫瘍（T）が右尾状葉原発であることがよくわかる。（L.Caud：左尾状葉）

考 察

血管造影上、肝血管腫に最も特徴的な所見は、動脈相に出現し、静脈相にまで持続する点状ないし斑状の密な濃染像とその濃染像が経時的に増大する傾向を示すことである^{1)~3)}。血管腫における腫瘍の支配動脈の拡張の有無は、腫瘍の vascularity に関連し¹⁾、vascularity の多い腫瘍では支配動脈は拡張することもあるが一般には、正常径か、拡張していても軽度なことが多く¹⁾⁴⁾、大きな血管腫では腫瘍の圧排、伸展のため逆に狭小化していることもある^{1)~3)}。また、血管腫では、通常、腫瘍血管の増生は認められないとされているが¹⁾³⁾⁴⁾、腫瘍血管の増生を示し、血管造影上、肝細胞癌と極めて類似した症例も報告されている^{3)5)~7)}。Arterio-Portal shunt については、従来、肝細胞癌に特徴的で、血管腫には稀とされているが⁸⁾⁹⁾、石口ら⁴⁾は、40例の肝海綿状血管腫のうち4例（10%）にこれを認めており、それほど稀な所見ではないと報告している。また、最近ではLipiodolを併用した動脈造影が主に肝細胞癌に対して施行されているが、Lipiodolの集積は肝細胞癌に特徴的とは言えず¹⁰⁾、われわれも肝血管腫でLipiodolの集積した症例を2、3経験している。このように、多少の例外はあるものの、肝血管腫の大部

図 6a, b, c 病理組織所見：a：腫瘍周辺部で海綿状血管腫の像を認める。（H.E. 染色，×200），b：腫瘍中心部で硝子様変性を認める。（H.E. 染色，×200），c：腫瘍被膜近傍で動脈枝（'）を認める。（H.E. 染色，×40）

分は、先述した血管造影上の特徴的所見を有しており、その診断は比較的容易であると言えよう。しかし、本症例では、静脈相における不整な腫瘍濃染の程度が、肝細胞癌に比べやや強いようにも思われるが、血管腫に特徴的ないわゆる“cotton wool”の所見¹¹²⁾はなく、また、動脈相における腫瘍血管の著明な増生は、retrospective に見ても肝細胞癌の動脈相の所見と区別するのは困難であると考えられた。

最近、肝血管腫の診断法として、bolus 注入による Dynamic CT の有用性が数多く報告されている^{110,111)}。肝血管腫の Dynamic CT 像は、造影直後より周辺部が部分的ないし環状に濃染され、時間の経過と共にその濃染が中心部に向って拡がってゆくという特徴的所見を呈する^{110,111)}。肝細胞癌では、bolus 注入直後には腫瘍の一部または全体が濃染され高濃度減となるが、経時的に高濃度域が拡がらず、低濃度域に移行することから肝血管腫と鑑別できるとされている¹¹²⁾。Itai ら¹¹³⁾は、12例の肝海綿状血管腫全体に、石口ら⁴⁾は、38例中37例にこの特徴的所見を認めたと報告し、それゆえ肝血管腫の診断は、ほとんど CT のみで可能であり、1cm 以下の小病変や診断がつけにくい症例にのみ血管造影の診断的価値があるとしている^{4,111)}。石口ら⁴⁾は、Dynamic CT は、肝血管腫に特徴的な腫瘍内の血行動態をよく反映しており、横断面を観察できる CTの方が、血管造影よりも容易にその特徴をとらえたと述べている。

本症例は、血管造影上、腫瘍血管の著明な増生を認め、肝細胞癌と誤診したわけだが、Angio-CT 像では、肝血管腫に特徴的な所見を有しており、“腫瘍血管の増生が著明な肝血管腫”と診断すべきであったと反省している。本症例の病理組織像は、通常の肝血管腫のそれと大きく異なることはないものの、明瞭な被膜を認め、この被膜外に腫瘍をとり囲むようにして多数の栄養動脈と思われる動脈枝を認めたことが特徴的であり、これが、血管造影上、特に動脈相における著明な腫瘍血管の増生所見をよく反映しているものと考えられた。

肝血管腫の手術適応として、腫瘍が大きくそれによる症状のある場合、破裂の可能性のある場合などがあげられるが、一定した基準は、まだないようである^{13,14)}。本症例は、血管造影上、最大径90mmと比較的大きな血管腫であったが、無症状であり、また、右尾状葉という肝の深部に存在していたことから、破裂の可能性は極めて少ないと考えられる。しかし、中肝静

脈は腫瘍によりほぼ完全に閉塞しており、また、右および左肝静脈も腫瘍により圧排されていた（手術時、特に右肝静脈との剝離が困難であった）ことから、このまま放置すれば、3本の主肝静脈のすべてが狭窄もしくは閉塞されることも予想されよう。本症例の手術術式は、尾状葉+左葉内側区+右葉前上区域切除術という非定型のかつ複雑なものであったが、切除の意義はあったものと考えている。

結 語

1) 血管造影上、肝細胞癌に類似した肝血管腫の1切除例を報告した。

2) 血管造影上、腫瘍血管の増生が著しく、肝細胞癌に極めて類似した所見を呈する肝血管腫が存在する点に留意すべきである。

本論文の要旨は第27回日本消化器外科学会（於、米子市）にて発表した。

文 献

- 1) 大石 元, 黒田純純, 中尾宣夫他: 肝血管腫, 肝・胆・膵—確定診断への画像的接近と診断手技の治療的応用—, 打田日出夫 編, p77—88, 医学書院, 東京, 1984
- 2) McLoughlin MJ: Angiography in cavernous hemangioma of the liver. *Am J Radiol* 113: 50—55, 1971
- 3) 森田 稔, 篠原正裕, 佐藤直樹他: 血管造影による肝血管腫の診断, *臨放線* 26: 375—381, 1981
- 4) 石口恒男, 改井 修, 佐久間貞行他: 肝血管腫, 肝・胆・膵, 肝胆膵 10: 415—422, 1985
- 5) Pollard JJ, Nebesar RA, Mattoso JF, et al: Angiographic diagnosis of benign diseases of the liver. *Radiology* 86: 276—283, 1966
- 6) Pontajo E: Angiography in liver hemangioma. *Am J Roentgenol* 104: 874—879, 1968
- 7) Freeman LM, Bernstein RG, Hayt DB: Diagnosis of hepatic hemangioma with combined scanning technique. *Radiology* 95: 127—128, 1970
- 8) Abrams RM, Beranbaum ER, Santos JS, et al: Angiographic features of cavernous hemangioma of the liver. *Radiology* 92: 308—312, 1969
- 9) Okuda K, Musha H, Yamasaki T, et al: Angiographic demonstration of intrahepatic arterio-portal anastomoses in hepatocellular carcinoma. *Radiology* 122: 53—58, 1977
- 10) 有山 襄, 幕内雅敏, 武藤晴臣他: 小肝細胞癌の進

- 展度判定と治療, 腹部画像診断 5: 517—538, 1985
- 11) Itai Y, Furui S, Araki T, et al: Computed tomography of cavernous hemangioma of the liver. Radiology 137: 149—155, 1980
- 12) 中村仁信, 田中 健, 崔 秀美他: 肝細胞癌の CT —その特徴 CT 像と転移性腫瘍との鑑別—, 臨放線 27: 601—607, 1982
- 13) 葛西洋一, 圓谷敏彦, 柿田 章他: 良性腫瘍の手術適応, 肝胆膵 6: 7—12, 1983
- 14) 木村泰三, 渡辺五郎, 万代恭嗣他: 肝海綿状血管腫の診断と治療, 外科 43: 1427—1433, 1981

A RESECTED CASE OF CAVERNOUS HEMANGIOMA SITUATED IN THE RIGHT CAUDATE LOBE OF THE LIVER DIFFICULT TO DIFFERENTIATE FROM HEPATOMA

Masato NAGINO, Shigehiko KONDOH, Michio KANAI and Kohei MORI

Department of Surgery, Daidoh Hospital

Yuji NIMURA, Hiroo MUKAIYAMA and Junichi KAMIYA

1st Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine

A 56-year-old female complaining of macrohematuria was accidentally found to have a liver tumor by ultrasonography. Selective celiac angiography showed a hypervascular hepatic lesion with haphazard marked neovascularity, dilated feeding artery and mottled tumor stain, 90 mm in diameter, in the middle and cranial portion of the liver. On angio-CT, dense accumulation of contrast material near the periphery of the lesion in early contrast scan, accumulation spreading toward the center of the tumor with time, and marked reduction of the low density area in the late scan were recognized. The lesion was diagnosed as hepatoma as a result of the findings on angiography, although hemangioma was strongly suggested by angio-CT.

At laparotomy the tumor was found in the right caudate lobe, and extended medial segmentectomy (caudate, middle and right anterosuperior segments) was performed. The cut surface of the resected specimen was spongy and dark red in color except for a whitish area at the center of the tumor. Histologically it was liver cavernous hemangioma without malignancy. The fact that many abnormal arteries were recognized near the capsul of the tumor reflected the findings of neovascularity on angiography.

We should pay careful attention to differential diagnosis between hepatoma and hemangioma with neovascularity on angiography.