症 例

S 状結腸 IIc 型早期癌の 1 例

東海大学第 2 外科

安 田 聖 栄 野 登 隆 池 田 正 見 則 久 洋 子
近 藤 泰 理 中 崎 久 雄 田 島 知 郎 三 富 利 夫

患者は75歳，男性。残胃癌術前検査の注腸造影で直腸ポリープが認められたため大腸内視鏡検査を施行したところ，S 状結腸の限局性発赤病変が偶然発見された。生検にて腺癌と診断，手術を施行した。切除標本の肉眼所見では，病変部は11×8mm で周囲粘膜より僅かに陥凹しており IIc 型と診断した。病理組織学的には sm に僅かに浸潤する高分化型腺癌であり，所属リンパ節転移は認められなかった。また腺腫成分は認められなかった。

索引用語：陥凹型早期大腸癌

はじめに

近年，平坦・陥凹型大腸早期癌に対する関心が高まり報告例が増加している。われわれも S 状結腸 IIc 型早期癌を経験した。貴重な症例と考えられたのでその注腸造影，内視鏡，切除標本の肉眼所見及び病理所見について報告する。

症 例

患者：75歳，男性。

既往歴：53歳，胃潰瘍にて胃切除術。

家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：主訴は上腹部痛。1987年 2 月，胃内視鏡・生検により残胃癌と診断。手術目的で入院となった。術前検査の注腸造影で直腸ポリープが認められたため大腸内視鏡検査を施行，直腸ポリープは直径4mm の腺腫であったがその口側25cm に今回の病巣を偶然発見した。

入院時現症：身長150cm，体重50.8kg。上腹部に手術瘢痕があること以外に異常所見は認められなかった。

入院時臨床検査成績：血液検査，生化学検査，尿検査に異常は認められなかった。CEA は4.3ng/ml（正常：7.0ng/ml 以下）であった。

大腸内視鏡所見：肛門縁から45cm の S 状結腸に限局性発赤病変を認めた。吸引による発赤とは明らかに区別できる発赤であり，発赤部の周囲がやや盛り上

がって見えた。発赤部の生検で腺癌が証明された。内視鏡診断は IIa+IIc であった（図 1）。

大腸 X 線所見：大腸内視鏡検査に先立って行われたルーチンの注腸造影では病変部は描出されていなかった。図 2 は内視鏡検査後に再度施行した大腸二重造影である。注入空気量を調節することにより病変部を描出できた。辺縁がわずかに不整な，類円形の小さな透亮像として描出された。陥凹の所見であるバリウム斑は認められなかった。

手術所見：1987年 4 月13日，残胃癌に対して残胃全摘，臍尾部・脾合併切除，リンパ節郭清（R₃）を，S 状結腸癌に対しては S 状結腸切除，リンパ節郭清（R₂）を行った。S 状結腸の病変部位は漿膜面から同定不能

図 1 内視鏡所見：S 状結腸に小さな発赤病変があり，周辺はやや盛り上がって見える。

1988年11月5日受付 1989年 3 月 3 日採用

図2 内視鏡検査後の大腸二重造影：辺縁がわずかに不整な、類円形の透亮像として描出されている。

図3 切除標本：発赤部は11×8mmで、周辺粘膜よりわずかに陥凹している。

であり、注腸造影で病変部の目安をつけ切除した。なお胃癌は $P_0H_0ssy n_1$ で低分化腺癌であった。

切除標本肉眼所見：発赤部は11×8mmであり辺縁部はやや不整で、周囲粘膜より僅かに陥凹していた。辺縁が粘膜ひだに重なる部分でやや盛り上がっているようにも見たが従来の IIa+IIc や IIa の隆起性病変とは明らかに異なっていた。切除標本の肉眼形態より IIc と診断した (図3)。

病理組織学的所見：剖面ルーベ像のヘマトキシリン・エオジン染色では矢印で示した僅かな範囲に癌を認めた (図4)。癌細胞は一部で粘膜筋板を越え、僅か

図4 病理組織所見：剖面のルーベ像で矢印の範囲に癌を認める。

図5 病理組織所見：smにわずかに浸潤する高分化型腺癌である。

に sm に浸潤している高分化型腺癌であった (図5)。強拡大像でリンパ管侵襲、脈管侵襲は認められなかった。所属リンパ節転移はなかった。多数切片での検索でも腺腫成分は認められなかった。

考 按

大腸の早期癌は深達度 sm までとされている¹⁾。従来、大腸早期癌は隆起型の形態をとると考えられていた。しかし1977年に初めて陥凹型早期癌の1例が報告され²⁾、その後も同様の症例が発見、報告されて、大腸にも胃と同様に平坦・陥凹型早期癌が存在することが明らかになった。また、これまで大腸癌の組織発生においてはいわゆる adenoma-carcinoma sequence が通説であったが³⁾⁴⁾、de novo に発生したと考えて異論の無い症例も報告され⁵⁾⁶⁾、改めて大腸癌の組織発生について関心が高まってきた⁷⁾。

これまでの報告例を見ると、圧倒的に男性に多く、部位では横行結腸に多い。臨床症状はなく、内視鏡検

査で偶然に発見された症例が多い。本症例は発生部位がS状結腸であるがこれとほぼ同じ傾向であった。S状結腸で注腸造影所見の記載がみられる報告は2例あるがいずれも病巣部は描出されていない⁸⁾⁹⁾。本症例はルーチンの注腸造影では描出されていなかったものの、内視鏡検査後に施行した精査の注腸造影で描出し得た。

治療においては深達度smの症例でリンパ節転移のあった症例があり¹⁰⁾リンパ節郭清に対する考慮は必要と考えられた。腸管の切除に際しては病変部が漿膜側から同定不能のため、注腸造影で目安をつけるか、術前に内視鏡的に病変部近傍に色素を注入しておくなどの工夫が必要と考えられた。

平坦・陥凹型大腸癌の組織発生については興味ある点である。本症例では癌巣に隣接する大腸上皮の範囲に腺腫の合併は検索されなかった。このような病変が平坦腺腫・IIb型腺腫から癌化して発生しうるとの見解はあるが¹¹⁾、de novoに発生した癌であると考えるのが妥当と思われた¹²⁾。

臨床的には、このような病変の存在を念頭において、内視鏡・X線検査にあたるのが重要であり、今後同様の症例が集積され、平坦・陥凹型大腸癌の特徴がより明らかにされるものと思われる。

おわりに

S状結腸IIc型早期癌の1例を若干の文献的考察を加え報告した。

本症例は第49回日本臨床外科医学会総会(昭和62年10月、福岡)で発表した。

文 献

- 1) 大腸癌研究会編：臨床・病理。大腸癌取り扱い規約。改訂第3版。金原出版、東京、1983
- 2) 狩谷 淳、水野幸一、間山素行他：IIc型早期大腸癌が認められた家族性大腸ポリポージスの1例、胃と腸 12：1359—1364, 1977
- 3) Morson BC： The polyp-cancer sequence in the large bowel. Proc Roy Soc Med 67：451—457, 1974
- 4) Muto T, Bussey HJR, Morson BC： The evolution of carcinoma of the colon and rectum. Cancer 36：2251—2270, 1975
- 5) 辻仲康伸、土屋周二、大木繁男他：IIc型直腸早期癌—de novo 発生の1例、胃と腸 18：211—217, 1983
- 6) 長谷川かをり、鈴木 茂、長廻 紘他：IIc型早期大腸癌の1例、胃と腸 18：842—843, 1983
- 7) 安達実樹、武藤徹一郎、斉藤幸夫他：IIc+IIa型早期大腸癌の1例、胃と腸 22：899—905, 1987
- 8) 志田晴彦、山本登司、黒木 尚他：平坦型S状結腸m癌の1例、胃と腸 20：1351—1355, 1985
- 9) 吉野 肇、升田和比古、安達哲夫他：IIc型早期大腸癌の1例、胃と腸 22：889—891, 1987
- 10) 五十嵐達紀、長廻 紘、田中俊夫他：IIc+IIa型早期大腸癌の1例、胃と腸 22：933—936, 1987
- 11) 武藤徹一郎：陥凹型早期大腸癌：主題症例を見て、胃と腸 22：959—960, 1987
- 12) 中村恭一：陥凹型早期大腸癌：主題症例を眺めて、胃と腸 22：961—963, 1987

IIc TYPE EARLY CARCINOMA OF THE SIGMOID COLON, REPORT OF A CASE

Seiei YASUDA, Takashi NOTO, Masami IKEDA, Yohko NORIHISA, Yasumasa KONDOH,

Hisao NAKAZAKI, Tomoo TAJIMA and Toshio MITOMI

Second Department of Surgery, Tokai University School of Medicine

Our case described here was a 75-year-old man admitted for an operation of gastric cancer which developed in the residual stomach. Routine barium enema study showed a polyp in the rectum. Subsequent colonoscopic examination revealed another small lesion in the sigmoid colon. Biopsy specimen was positive for adenocarcinoma. Operation was performed. The resected specimen showed a slightly depressed lesion with redness, measuring 11 × 8 mm in size. On this macroscopic findings, we diagnosed this case as type II early carcinoma. Histologically, it was a well differentiated adenocarcinoma invading to the shallow part of submucosa. Lymph nodes were free from metastasis. Adenomatous elements were not observed.