原 著

非浸潤性乳癌16例

—その診断と治療について—

社会保険船橋中央病院外科

永 野 耕 士 山 野 元 呉 正 信 正 岡 博

千葉大学第1外科

藤 本 茂

極めて早期の乳癌と思われる非浸潤癌16例におけるその診断, 治療について問題点を検討した。

- (1) 非浸潤性乳癌は, 女子原発性乳癌314症例のうち16例 (5.1%) であった。
- (2) 非浸潤癌といえども, 熟練した丹念な触診により腫瘤様あるいは硬結として14/16例 (87.5%) 触知できた。
- (3) 乳頭分泌は4例 (25.0%) に認められたが, すべて Class I, III であった。
- (4) 乳房撮影にて腫瘍陰影が認められたものは, 7/16例 (43.8%) であり, 悪性微細石灰化像の出現率は (50.0%) であった。又, 6/16例 (37.5%) はどちらの所見も呈さなかった。
- (5) 乳腺超音波による腫瘍像の描出は, 11/16例 (84.6%) に可能であった。
- (6) 穿刺吸引細胞診では, Class IV 以上は30.0%であった。
- (7) 診断に生検を必要とした症例は, 11/16例 (68.8%) であった。
- (8) 2.1cm 以上の small t が多く, 定型手術が6/16例 (37.5%) に施行された。

索引用語: 非浸潤性乳癌, 単純乳房 X 線撮影, 乳腺超音波診断, 乳頭分泌細胞診, 乳腺穿刺吸引細胞診

緒 言

乳癌は浸潤癌の場合, 一般に主腫瘤が小さいほど, リンパ節転移, 血行転移が少なく予後も良いが, 0.5cm 以下のいわゆる微小乳癌でも n1 β 以上のリンパ節転移の認められる場合もあり¹⁾, さらに, 0.6cm を越えると1cm 以下でも血行転移を起こし死亡する例も報告されている²⁾。しかしながら, ほとんどの非浸潤性乳癌は, リンパ節転移, 血行転移が見られず, ほぼ100%近い5生率, 10生率が得られている²⁾。以上のように, 非浸潤癌は手術療法にてほぼ根治が可能である, いわゆる早期の癌と考えられ, 臨床上このような癌の早期発見と適切な治療が望まれる。著者らは昭和57年以来16例の非浸潤癌を経験しておりその診断の過程を retrospective に解析し非浸潤癌の診断, 特に補助診断法や治療上の問題点について検討した。

対象症例並びに方法

対象は社会保険船橋中央病院外科において, 昭和57年1月より昭和62年3月までに手術された女子原発性乳癌症例314例のうち非浸潤癌16例 (5.1%) である (表1)。なお非浸潤癌は便宜上, 切除標本の病変中心より3mm 幅の階段状標本において, 管外浸潤が全く見られないものとした。診断への過程として原則的に視触診の後, 主に単純 X 線乳房撮影 (Spot 撮影を含む), 超

表1 症例と主訴

非浸潤性乳癌症例16例(5.1%) (女子原発性乳癌症例314例中)		
平均年齢: 44.2 $\pm$ 5.4歳		
左側: 7例 右側: 9例		
主訴: ① 腫瘤, 硬結触知		11例
② 検診 (2例は, 2年前, 7年前から経過観察中)		3例
③ 疼痛		1例
④ 乳頭分泌		1例

1988年8月2日受付 1989年3月27日採用

音波検査、乳頭分泌細胞診を行い、必要に応じて穿刺吸引細胞診、乳管造影、生検を実施した。施行した補助診断について以下に略記する。

(1) 乳房 X 線撮影は、東芝 MO-3 特型, KXO-850 型, X 線管球, DRX-B20-MO, Be 窓附加フィルター MO-30 μ , 固有濾過 Be 0.5mm, 焦点 1.0 $\times$ 1.0mm 材質 MO. 使用フィルムは、コダック Min-R フィルム, 増感紙; コダック Min-R スクリーン, グリッド; 80 lines/cm; 3.5:1.

(2) 乳腺超音波は、第一期(S57, 1~58, 8)Aloka SSD-120B 5.0MHZ, 第二期(S58, 9~60, 2)Aloka SSD-120B 7.5MHZ, 第三期(S61, 1~62, 3)日立 EUB2D 7.5MHZ を使用した。

(3) 穿刺吸引細胞診は、千葉大第 1 外科式穿刺細胞診用吸引ピストル, 20ml ディスボーザブルの注射器と 21G の注射針を使用した。

成績

年齢は平均 44.2 $\pm$ 5.4 歳 (表 1) であり、左側 7 例, 右側 9 例であった。腫瘤あるいは硬結を触知して来院した者 11/16 例 (68.8%), 集団検診にて長期間経過観察して見出し得た者 2 例 (2 年前と 7 年前から), 疼痛にて来院した者 1 例, 乳頭分泌にて来院した 1 例であった (表 1)。

表 2 局所所見と乳頭分泌

触 診			
腫瘤様触知	11 例 (68.8%)		
硬結様触知	3 例		
TO	2 例		
T の最大径 (cm)		乳頭分泌: 有	4/16 例 (25.0%)
~1.0	7 例	血 性	2 例 (Class I, Class III)
1.1~2.0	3 例	非血性	2 例 (Class I, Class III)
2.1~5.0	4 例		
5.1~	0 例		

表 3 乳房撮影診断

乳房撮影			
○腫瘤陰影	有	7 例 (43.8%)	
	無	9 例	
○悪性微細石灰化像 (MFC)	有	8 例 (50.0%)	
	無	8 例 (50.0%)	
○腫瘤陰影 (-) かつ MFC (-)		6/16 例 (37.5%)	
癌 確診	6 例	9/16 例 (56.3%)	
疑診	3 例		
判定不能	6 例		
誤診	1 例		

1. 診断

① 乳頭分泌: 4/16 例 (25.0%) に認められ、そのうち血性 2 例, 非血性は 2 例であった。また乳頭分泌の細胞診では、血性 2 例はそれぞれ Class I, Class III, 非血性 2 例も, Class I と, Class III であった (表 2)。

② 触診: 腫瘤としては触知できず腫瘤様に触知できたもの 11/16 例 (68.8%), やや異常な硬結として触知できたもの 3 例, 硬結の触知が、ほとんど不可能のもの (TO) 2 例であった。腫瘤ならびに異常硬結の触診最大径は、1.0cm 以下 7 例, 1.1~2.0cm 3 例, 2.1~5.0cm 4 例であった (表 2)。

③ 乳房撮影: 腫瘍陰影が認められたもの 7/16 例 (43.8%), 認められないもの 9 例 (56.2%) であった。いわゆる悪性に特長的な微細石灰化像が認められたもの 8/16 例 (50.0%), 認められなかったもの 8 例 (50.0%) であり、腫瘍陰影も悪性微細石灰化像も認められなかったものは 6/16 例 (37.5%) であった。これらにより総合的に確定診断を下し得たものは 6 例 (37.5%), 疑診は 3 例 (18.8%), 判定不能 6 例 (37.5%), 誤診 1 例であった (表 3)。

④ 乳腺超音波診断: 初期の機器 (S57, 1~S60, 12) では、超音波には既報のように腫瘤径 1.0cm 以下の診断能が悪く³⁾⁻⁵⁾, その存在診断, 質的診断は困難との結論から触診で腫瘤に触れる症例に対してのみ施行したので、全期を通して 16 例中 13 例に施行した。腫瘍像描出が可能であったのは 11/13 例 (84.6%) で、2 例 (15.4%) は描出できなかった。癌と診断できたものは 4/13 例, 疑診は 5 例であるので正診は 9/13 例 (69.2%) であり、判定不能は 2 例, 誤診は 2 例 (乳腺症) であった (表 4)。

⑤ 穿刺吸引細胞診: 16 例中 10 例の穿刺に足る腫瘤のある症例に施行されたが、Class I 1 例, Class I 2 例, Class III 4 例, Class IV 2 例, Class V 1 例と, Class IV 以上は、3/10 例 (30.0%) であった (表 5)。

⑥ 生検: 諸検査の結果 5/16 例 (31.2%) は、生検によらず確診できたが 11/16 例 (68.8%) は、生検によ

表 4 超音波診断

		t(cm)~1.0	1.1~2.0	2.1~5.0	計
腫瘤像描出	可	2	3	6	11 例 (84.6%)
	不可	1	0	1	2 例 (15.4%)
癌 確診	4 例	9/13 例 (69.2%)			
疑診	5 例				
判定不能	2 例				
誤診 (乳腺症)	2 例				

表5 穿刺吸引細胞診と生検率

穿刺吸引細胞診			
Class	I	1 例	
	II	2 例	
	III	4 例	
	IV	2 例	3/10例(30.0%)
	V	1 例	
生検			
施行	11例	(68.8%)	
未	5例		

表6 生検、手術術式と組織診断

	定型手術		非定型手術	
生 検 11例	4	36.4%	7	63.6%
未生検 5例	2	40.0%	3	60.0%
計 16例	6	37.5%	10	62.5%

組織診断 16例中全例乳管癌(1a)(1例はのう胞内癌)
全例 リンパ節転移, 遠隔転移 陰性

て確診できた(表5)。

2. 術前臨床病期と手術術式

T1aNOMO Stage I 10例, T2aNOMO Stage II 4例であった。

手術術式としては定型的乳房切断術6/16例(37.5%)に行われ, 非定型は10例(62.5%)であった。なお生検未施行例5例中, 非定型手術は, 3例(60.0%), 定型手術は2例(40.0%)であり, また生検施行11例中では非定型は7例(63.6%), 定型は4例(36.4%)であった(表6)。

3. 触診上腫瘤最大径(T)と組織学的腫瘍径(t)との関係

T 1.0cm 以下7例中3例はt 1.0cm 以下であり, 1.1~2.0cm は1例, 2.1~5.0cm は3例と触診上よりかなり広範囲な広がりを示していた(表7)。T 1.1~2.0cm の3例は, 1.1~2.0cm 2例, 2.1~5.0cm の1例であった。T 2.1~5.0cm の4例のtは, 全例2.1~5.0cm であった。一方TOの2例は, 2例とも2.1~5.0cm の広範囲な広がりがみられた(表7)。

4. 組織診断

16例全例非浸潤性乳管癌(1a)であり, うち1例は嚢胞内癌で生検により確診し得た。また, 非浸潤性小葉癌(1b)は1例も見られなかった。腫瘍組織径tは, 1.1cm 以上のものが13/16例(81.3%)と, 広範囲に管内に浸潤しているものが多かった。なお全例リンパ節

表7 触診上腫瘤最大径(T)と組織学的腫瘍径(t)との関係

T (cm)		t (cm)		
		~1.0	1.1~2.0	2.1~5.0
~1.0	7例	3例	1例	3例
1.1~2.0	3	0	2	1
2.1~5.0	4	0	0	4
T0	2	0	0	2
計	16例	3例	3例	10例

転移, 血行転移は認められなかった(表6, 表7)。

考 察

本研究の非浸潤癌の頻度は5.1%であり, 久野らの報告²⁾と, 大きな差はない。主訴では非浸潤癌といえども何等かの腫瘍様, 硬結様等の異常を感じているものが11/16例(68.8%)に認められた。また, 検診にて長期間 follow up することによって2症例が診断されたが, 乳頭分泌を自覚症状とした症例の確定診断が少ないのは, 当外科における Microdochectomy 施行症例が少ないためと思われる。

触診について, TO の定義が乳癌取扱規約では, 「腫瘤を認めず」となっており, 触診力の差を考えた場合非常に曖昧な表現である。著者らはなんらかの乳房の堅さの異常や, 抵抗感程度に触れる微妙な感じを, 乳癌取扱規約では TO とすべきものでも, 「硬結様触知」とし, ほとんど何も触れないものを TO とした。腫瘍様触知は11/16例(68.8%)に認められ, 硬結様触知の3例を含めると, 14/16例(87.5%)となり, Specimen Mammography, Microdochectomy を積極的に施行すれば, 全く触れない非浸潤癌の TO 症例の頻度は増加したと思われるが, 久野ら²⁾の81.6%, 遠藤ら⁶⁾の76.7%の報告も見られるが, 何らかの乳房の異常を触知出来る症例も多い。

乳頭分泌の出現率は, 4/16例(25.0%)と低いが, 久野ら²⁾の26.5%とほぼ同様の頻度であり非浸潤癌はむしろ乳頭分泌を示さない方が多いと推定された。乳頭分泌物の細胞診は, 4例すべてが Class I, III であり, Class IV 以上の症例は皆無であった。久野ら²⁾は Class IV 以上がかなり高率であるが, 第23回乳癌研究会の全国集計⁷⁾では22%, 浅越ら⁸⁾は, 55例中の33%と報告している。われわれの場合は症例数の少ないこと, さらに細胞の読み不足の可能性も考えられた。本研究の成績からみると, Class III の症例では繰り返しの検

査が必要と思われ、いずれにしても乳頭分泌細胞診だけでは、癌の確定診断は不十分である。

穿刺吸引細胞診の報告は少ない、広瀬ら⁹⁾は、Paget 病の 1 例を除き非浸潤性乳癌の 4 例はすべて陰性との報告しているが、本稿においては Class IV 以上は、3/9 例 (33.3%) に見られており、穿刺針が確実に腫瘤内にあれば、非浸潤癌といえども穿刺吸引細胞診は極めて有用と思われる。

超音波診断では、I 期、II 期、III 期を通して腫瘤描出能は腫瘍径と関係なく、11/13 例 (84.6%) に腫瘍は描出可能であり、正診率は 69.2% であった。先に報告したように¹⁰⁾、探触子 7.5MHz (S58, 9 ~) になってからの 7 例中、非常に瘦せた小さい乳房の症例の 1 例を除いて、非浸潤癌といえども腫瘍像描出可能があった (6/7 例 (85.7%))。今後 hard ware のより一層の進歩により、その存在、質的診断の向上に伴い現在診断が不可能の非浸潤癌の診断が着実に増加するものと思われる。

乳房撮影は日本人女性乳房の特長によるものの為か、また Specimen Mammography によって得られただけではないので、Spot 撮影も含めた腫瘍像描出率は、7/16 例、43.8% である。悪性微細石灰化像出現率は 50.0% (16 例中 8 例) と低率で、当然ながら悪性微細石灰化像を主とした Specimen Mammography により見いだした症例だけ¹¹⁾ではないので、岡崎¹²⁾ 46.9% の成績とほぼ同様であったのであるが、いずれにしてもこのように石灰化像を呈しない症例も多いことは留意すべきであると思われる。正診率は、56.1% で久野らの報告²⁾ 54.8% と同様に成績は良くない。腫瘤陰影も悪性微細石灰化像の見られなかったのは、16 例中 6 例 37.5% もあり、単独では触診、超音波より存在、質的診断において劣っている。

以上非浸潤癌における各種診断法の成績を中心に、文献的考察を加えて検討したが、存在診断については熟練した触診や超音波が最も成績がよい。しかし確診となるとその成績はどれをとっても満足すべきものではない。したがって生検は 16 例中 11 例 68.8% に施行され、久野ら²⁾ の 77.9%、遠藤ら⁶⁾ の 67.4% と同様確診には生検によらねばならない症例が多い。

組織学的腫瘍径 (t) は、藤森は¹³⁾、2.0cm 以下に 64 例中 35 例と最も多く、2.1~5.0cm は 22 例、5.1~10.0cm は 7 例で、10.0cm 以上のものはなかったと、又、高嶋ら¹⁴⁾ は剖面の平均長径は 1.8cm との報告があるが、当外科の症例では、2.0cm 以下は、16 例中 6 例で、

比較的小さいものが多いが、5.1cm 以上の症例はなくても、2.1~5.0cm は、16 例中 10 例と過半数以上あり管内を広範に広がった症例も多い。すぐに管外浸潤を呈せず管内にのみ広範に進展する症例のみが比較的多く発見しやすいと思われる。1.0cm 以下は 16 例中 3 例と少なく、まだすぐ管外浸潤をおこさない管内の小さい範囲に留まっている段階での乳頭分泌も呈さず、Microcalcification を呈さない非浸潤癌の発見は大変難しく、今後の課題と思われる。

手術術式についてみると腫瘍が比較的大きく触れる症例があるため、定型手術が 16 例中 6 例 37.5% と久野ら²⁾ の 39.5%、遠藤ら⁶⁾ の 37.2% 報告と同様に比較的多くみられた。また、生検例でも 4/11 例 (36.4%) に定型手術が施行されており、適切な術式選択の困難さがかがわれる。しかし実際画像上、浸潤癌と非浸潤癌の術前診断の特長の差は著しくないが、前述のような所見を具有し、かつ広範に悪性細微細石灰化像を認めるときは、癌が管内進展性に発育して石灰化沈着を見ること¹⁵⁾から、非浸潤癌あるいは微小管外浸潤癌の可能性が強いので、手術術式に考慮を払うべきと思われる。

前述のように、触診上小さい腫瘍であっても、かなり広範囲に癌が管内進展している症例が多い。これらの非浸潤癌は当然縮小手術の対象ではあるが、もし Quadrantectomy を施行する場合には病巣の完全摘出の面からみれば、術前術中に適切な範囲を決めるのは困難であるので、むしろこのような症例は、乳頭への浸潤がなければ、Subcutaneous Mastectomy がより安全で、適応であると思われる。また全例リンパ節転移は見られなかったが、他の報告¹⁶⁾等を考慮すれば、必要なリンパ節郭清を付加することがより安全であると思われる。

結 語

乳頭分泌を示さず、また単純乳房 X 線撮影上、腫瘍像や悪性微細石灰化像を呈さない非浸潤癌症例も存在することを報告した。熟練した触診によって、わずかに腫瘍像あるいは硬結程度に触れる症例でも、超音波撮影を併用することによって、腫瘍の存在とその性状をより明瞭にすることが出来る。さらに、穿刺吸引細胞診や、必要に応じた生検によって、そのような非浸潤性乳癌の診断が可能である。また手術術式は Subcutaneous Mastectomy + 腋窩郭清が望ましい。

稿を終るに当たり、終始ご指導を賜りました社会保険船橋中央病院、前院長、故武田清一先生に謹んで深甚な謝意

を捧げ、そのご冥福をお祈りすると共に、ご協力戴いた院長大久保春男先生、成田日赤外科青柳栄一先生、千葉県立がんセンター外科川上義弘先生、当院放射線科、検査科の諸氏に感謝致します。

文 献

- 1) 乳癌研究会：第22回研究会記録—主題II. 微小な浸潤癌（癌巣0.5cm以下）—, 日癌治療会誌 II: 827, 1976
- 2) 久野敬二郎, 深見敦夫, 泉雄 勝他：最小乳癌 Minimal Breast Cancer：診断と治療, 癌の臨床 28: 1225—1229, 1982
- 3) 永野耕士, 武田清一, 川上義弘他：乳房腫瘍における超音波診断について, 日癌治療会誌 17: 506, 1982
- 4) 永野耕士, 武田清一, 山野 元他：乳腺疾患における各種補助診断法の検討, 日癌治療会誌 20: 178, 1985
- 5) 永野耕士, 武田清一, 小川 清他：乳腺疾患における超音波診断の特長. 第43回日本臨床外科医学会総会抄録集, 日臨外会誌 42: 53, 1981
- 6) 遠藤敬一, 泉雄 勝, 飯野祐一他：最小乳癌 (Minimal Breast Cancer) の臨床病理学的研究, 日癌治療会誌 18: 653—660, 1983
- 7) 綿貫 結編：第23回乳癌研究会抄録集, 1976
- 8) 浅越辰男, 花上 仁, 黒澤 努他：早期乳癌の診断

- と定義について, 臨外 47: 411—417, 1986
- 9) 広瀬敏樹, 小海陽子, 山村はるみ他：小腫瘍乳癌に対する穿刺吸引細胞診の成績, 日臨細胞会誌 26: 386—392, 1987
- 10) 安藤 聡, 永野耕士：女子非浸潤性乳癌の超音波断層所見の検討. 第51回超音波医学会講演集, 89—90, 1987
- 11) Price JL, Gibbs NM: The relation-ship between microcalcification and in situ carcinoma of the breast. Clin Radiol 29: 447—452, 1978
- 12) 岡崎正敏：早期乳癌（非浸潤癌）の乳房 X 線像による検討, 代謝(臨時増刊号「癌'83」)20: 211—221, 1983
- 13) 藤森正雄：早期乳癌. 臨床と病理, 中山書店, p224—227, 東京, 1976
- 14) 高嶋成光, 横山伸二, 平井隆二他：最小乳癌の臨床病理学的検討—非浸潤癌について—, 臨外 36: 1281—1284, 1981
- 15) 富山次郎：乳癌組織にみられる石灰沈着の組織学のおよび臨床的検討, 日外会誌 77: 1615—1628, 1975
- 16) Rosen PP, Braun DW, Kinne DE: The clinical significance of preinvasive breast carcinoma. Cancer 46: 919—925, 1980

DIAGNOSIS AND TREATMENT FOR 16 PATIENTS WITH NONINVASIVE BREAST CANCER

Kohji NAGANO, Hajime YAMANO, Masanobu KURE and Hiroshi MASAOKA

Division of Surgery, Social Insurance Funabashi Chuoh Hospital

Shigeru FUJIMOTO

First Department of Surgery, Chiba University

1) Noninvasive breast cancer was found in 16 (5.1%) among 314 female patients with primary breast cancer and, these 16 patients were studied retrospectively. Careful, skilled palpation could detect a tumor-like mass or induration even in noninvasive cancer. Nipple discharge was observed in only 4/16 patients (25.0%). Neither class IV nor V was found in cytological examination for their smears. Mammography revealed a tumor shadow in 43.8%, malignant fine calcification in 50.0%, and no such findings in 37.5% of the patients. 2) Echography represented a tumor echo in 84.6% of the 16 patients. 3) Aspiration biopsy cytology revealed 30.0% of the patients to be class IV or V. 4) 68.8% of the patients could not be definitely diagnosed till an excisional biopsy was made. 5) Since a large number of the patients had a palpable tumor more than 2.1 cm in diameter measured pathologically, standard radical mastectomy had been performed for 37.5% of the 16 patients.