症 例

早期十二指腸球部癌の1例

健康保険人吉総合病院外科

田 中 道 宣 田 辺 大 朗 佐 田 英 信 上 村 邦 紀

原発性十二指腸早期癌の1手術例について報告する。症例は68歳の男性で自覚症状はなく胃集団検診で精査を指示された。上部消化管 X 線検査で十二指腸球部に長径約4.5 cmの半球状の隆起性病変がみられ、内視鏡検査では球部後壁に表面がカリフラワー状の隆起性病変を認めた。生検で腺癌と診断し、腫瘍が大きくリンパ節転移の可能性を否定できなかったため膵頭十二指腸切除術を行った。切除標本では十二指腸球部後壁に4.5×3.7×高さ1.5cmの広基性病変を認めた。組織検査では高分化型乳頭腺癌で深達度は粘膜層でありリンパ節転移はなかった。手術後の経過は良好で10カ月を経て健在である。

索引用語：十二指腸球部癌，早期十二指腸球部癌

はじめに

原発性十二指腸癌は、最近の内視鏡検査の進歩に伴い次第に発見される機会が多くなってきてはいるものの、乳頭部癌を除けばまだその数は少ない。とくに十二指腸早期癌の報告は稀である。今回、術前に十二指腸球部癌と診断し膵頭十二指腸切除術を行った早期癌の1例を経験したので報告する。

症 例

患者：68歳，男性。

主訴：自覚症状なし。

現病歴：1988年10月，胃集団検診で胃体部の皺襞肥大を指摘され，前医で精査を受けた。その結果，胃には異常はなかったが十二指腸球部の隆起性病変を発見され，1989年2月当科を受診した。

既往歴・家族歴：ともに特記事項はない。

入院時理学所見および血液所見：栄養状態は良好で貧血・黄疸はなく，胸部・腹部にも特記すべき事はない。血液検査でも異常所見はなく，腫瘍マーカーも正常範囲である。

十二指腸造影所見：十二指腸球部に長径約4.5cm，境界明瞭で表面は不整な隆起性病変を認めた（図1）。

内視鏡検査所見：十二指腸球部後壁に，周囲粘膜に比べ褪色した境界明瞭な隆起性病変を認めた。表面はカリフラワー状であり，潰瘍や出血はなかった（図2）。

生検所見：細胞異型は比較的軽度ながらもこれらの

図1 十二指腸造影像

細胞が乳頭状あるいは管状の増殖をしている像がみられ，しかも組織構造異型は著明であった。これらの所見より十二指腸球部の腺癌と診断した（図3）。

血管造影所見：腹腔動脈造影では胃十二指腸動脈で球部の領域に新生血管の軽度の増生がみられた（図4）。

図 2 十二指腸球部の内視鏡像

図 3 生検標本組織像 (H.E 染色, $\times 200$)

胸腹部 X 線写真, 腹部 CT および超音波検査, 注腸透視などの検査では, 十二指腸以外には異常所見はなかった。以上より原発性十二指腸球部癌と診断し手術を行った。

手術所見: 十二指腸球部にくるみ大の腫瘤を触れたが漿膜面には異常なく, 周囲のリンパ節の腫大も認めなかった。十二指腸以外の臓器には異常所見はなかった。以上より肉眼上は漿膜浸潤やリンパ節転移はないと判断したが, 腫瘍が大きく進行癌であることを完全には否定できなかったので, 臍頭十二指腸切除術を行い今永 I 法にて再建した。

切除標本肉眼所見: 十二指腸球部後壁に山田 III 型ポリプ状で, 大きさ $4.5 \times 3.7 \times$ 高さ 1.5 cm の隆起性病変を認める。境界は明瞭で表面はカリフラワー状である (図 5)。

切除標本病理組織所見: 高分化型乳頭腺癌で深達度は粘膜層に局限し, リンパ管や静脈への侵襲はみられ

図 4 腹腔動脈造影像

図 5 切除標本

なかった。またリンパ節転移はなかった (図 6)。

患者は術後 33 日目に軽快退院し, 10 ヶ月目の現在も健在である。

考 察

原発性十二指腸癌は他の消化器癌に比べるとまれな疾患であるが, 最近では上部消化管に対する内視鏡検査や X 線検査などの画像診断法の発達により発見される機会が次第に増加してきている。それでもまだ癌の浸潤が粘膜下層までにとどまるものを早期癌と規定すると, 乳頭部癌を除く原発性十二指腸早期癌の報告は少ない。今回報告した球部の早期癌についてみると, 平田¹¹⁾の集計では, 本邦においては 1986 年までに 21 例が報告されているにすぎない。ただし, 平田の集計の中には, 報告者は異なるが同一症例が 1 例含まれていたため, 今回は 1986 年までに 20 例の報告があったものとして以下の考察を行った。その後, 1987 年から 1988 年までに 12 例^{2)~12)} (13 病変) の球部早期癌が報告されているので, 自験例をあわせると 1988 年までに計 33 例 (34 病変) ということになる。

図6 切除標本組織像 (H.E 染色, 左×100, 右×400)

これらの症例の臨床症状には他の上部消化管症状とくらべて特異的な症状はなく、無症状例も10例(30%)にみられた。これら無症状例の病巣の発見の動機は、検診や他の疾患での検査中に偶然発見されたものであり、上部消化管の検査の際は十二指腸の観察も充分に行う必要があることを示している。病変の肉眼形態は、隆起性病変が94%で圧倒的に多く、陥凹型はわずか2例、6%である。

術前診断は十二指腸内視鏡による組織生検でなされるが、生検診断については、一般に胃癌や大腸癌の取り扱い規約の生検組織グループ分類に準じて行われているようである。この基準で生検診断がなされた29例のうち術前に Group V と診断されたものは19例で66%、悪性の疑いありとしたもの3例10%であった。また、術前には良性と診断されたものが7例24%であった。これら7例が悪性と診断されなかった理由には、まず病変の一部に癌があり、生検で癌部を採取していなかったことが考えられる。carcinoma in adenoma の場合はこのようなことが起こり得るので、生検でたとえ良性であっても、疑診例には頻回に生検をくり返すか、大腸ポリプと同様に total biopsy を行い全体像から判定する必要がある。また悪性と判定しなかった第2の理由として、癌部を採取していても

組織診断で癌とみなさなかったことも考えられる。このことに関して、中村¹³⁾は次のように述べている。すなわち、十二指腸癌では、細胞異型が軽度であるにもかかわらず構造異型が中等度～高度の場合は、生検組織からその良・悪性の診断は困難であり、このようなことが十二指腸は胃や大腸に比べて多く、胃や大腸における上皮性腫瘍の異型の尺度をそのまま適用すると悪性を良性としてしまう危険があると注意を促している。

球部癌の治療については、進行癌症例であれば臍頭十二指腸切除が一般に行われており、これには特に異論はないと考えられる。深達度が粘膜または粘膜下層までにとどまる症例に対して、切除の範囲をどの程度にするのが適当であるかという点についてはまだ確立されていない。病変が内視鏡的ポリペクトミー可能であるときは、ポリペクトミーを行った上で追加手術を行うかどうか更に検討するのがよい。しかし広基性隆起型や陥凹型の場合は、開腹の上でポリプ切除や球部切除、胃・球部切除あるいは臍頭十二指腸切除のどれかを行うことになる。ここで球部癌の深達度とリンパ節転移の相関をみると、深達度が粘膜下層までの症例でリンパ節転移があったものは1例⁹⁾が報告されているのみである。しかし、この1例は臍体部と上行結

腸のそれぞれ進行した癌を合併した 3 重複癌で、脾門部に転移リンパ節を認めているが、同時に膵癌からの肝転移と肺転移もみられた症例であるので、脾門部リンパ節も膵体部癌からの転移と考える方が妥当と思われる。したがって、球部癌では深達度が粘膜下層までの症例に限っては、リンパ節郭清度を上げるために膵頭十二指腸切除を行う必要はなく、球部切除か球部・胃切除にとどめても良いのではないかと考えられる。今後さらに長期的予後をみた上で検討する必要がある。現在のところでは、術前に癌の深達度やリンパ節転移の有無についての予測が困難な面もあるので、田中¹⁴⁾が述べるように、開腹時の漿膜浸潤の程度と No. 12, 13, 17 などのリンパ節転移の有無を指標として、リンパ節を郭清した上で胃切除や球部切除にとどめるか、膵頭十二指腸切除を行うかを決定するのが妥当である。

今回の自験例では、術前に病巣が広基性隆起型で長径 4.5 cm と大きく、生検で癌と診断したが深達度が判定できなかったことより、進行癌の可能性もあったのでリンパ節郭清を充分にするために膵頭十二指腸切除術を行った。

おわりに

胃集検で胃の精査を指摘されたが、胃には異常はなく、偶然に十二指腸球部の腫瘍が発見され、術前に腺癌と診断し膵頭十二指腸切除術を行った球部早期癌の 1 例を報告した。

文 献

- 1) 平田公一, 白松幸爾, 相沢 誠他: 十二指腸球部進行癌の 1 例, 日消外会誌 21: 1099—1102, 1988

- 2) 杉山秀樹, 柴田美恵, 岩田雅人他: 十二指腸球部に限局した早期癌の 1 例, Gastroenterol Endosc 29: 396, 1987
- 3) 森山剛榮, 長沢正史, 森岡松英他: 十二指腸球部早期癌の 1 例, Gastroenterol Endosc 29: 822, 1987
- 4) 赤司文広, 渡辺講一, 新里 健他: 原発性早期十二指腸球部癌の 1 例, 日内会誌 76: 756, 1987
- 5) 大野正博, 渡部公二, 檀上 泰他: 原発性十二指腸癌の 3 例, 外科診療 29: 1056—1060, 1987
- 6) 木村清志, 中村洋三, 倉塚 均他: 原発性早期十二指腸癌の 1 例, Gastroenterol Endosc 29: 1876, 1987
- 7) 駒崎敏郎, 鋤柄 稔, 畠中正孝他: 十二指腸球部に発生した多発早期癌の 1 例, 日臨外医会誌 48: 1930, 1987
- 8) 三屋公紀, 渋谷美恵子, 松岡幹雄他: 早期十二指腸球部癌を含んだ三重複癌の 1 例, 消内視鏡の進歩 31: 374—377, 1987
- 9) 鈴木 昇, 鍋谷欣市, 花岡建夫他: 原発性十二指腸癌 4 症例の検討, 日消外会誌 21: 517, 1988
- 10) 光藤章二, 丸山恭平, 堀口雄一他: 早期十二指腸癌の 1 例, Gastroenterol Endosc 30: 2034, 1988
- 11) 佐伯好信, 中村 清, 北原明倫他: 早期十二指腸球部癌の 1 例, 胃と腸 23: 1138—1141, 1988
- 12) 前田 淳, 宮田久裕, 久保田稔他: 早期十二指腸癌の 1 例, 消内視鏡の進歩 32: 237—240, 1988
- 13) 中村恭一: 病理概評, 胃と腸 18: 978, 1983
- 14) 田中 裕, 白鳥 隆, 甲斐達朗他: 原発性十二指腸球部癌の 1 例, 臨外 40: 1445—1449, 1985

A CASE OF EARLY PRIMARY CANCER OF THE DUODENAL BULB

Michinobu TANAKA, Dairo TANABE, Eishin SATA and Kuninori UEMURA

Department of Surgery, Hitoyoshi General Hospital

A surgically treated case of primary early cancer of the duodenal bulb was reported. The case was a 68-year-old man without any symptoms who was admitted to our hospital for further investigation, because an abnormality of the stomach was suspected by mass screening examination. X-ray examination of the upper gastrointestinal tract revealed a round, well defined and elevated lesion, 4.5 cm in diameter, on the posterior wall of the duodenal bulb, and no abnormal findings in the stomach. Endoscopic examination showed a polypoid lesion with cauliflower-like appearance and the endoscopic biopsy specimen revealed an adenocarcinoma. Under a preoperative diagnosis of cancer of the duodenal bulb, pancreatoduodenectomy and lymphnode dissection were performed, because the tumor size was as large as 4.5 cm in diameter and possible metastases to the regional lymphnodes were not excluded. The resected tumor was 4.5 × 3.7 cm in size and 1.5 cm in height.

Histological diagnosis was a well differentiated adenocarcinoma limited within the mucosa with no lymphnode metastasis. Postoperative course was uneventful and the patient is enjoying a symptom-free life as of 10 months after the operation.