症 例

男子の乳腺に原発した malignant fibrous histiocyoma の 1 例

順天堂大学浦安病院外科（主任：八木義弘教授）

杉 山 和 義 河 端 誠 射 場 敏 明 菊 地 直 心 夫
福 永 正 氣 木 所 昭 夫 谷 尚 志 八 木 義 弘

順天堂浦安病院検査科

霜 多 広 石 和 久

われわれは最近経験した男性の乳腺に原発した malignant fibrous histiocyoma の 1 例をもとに若干の文献的考察を行ったので報告する。症例は31歳の男性で、10年前右乳房腫瘍切除術を施行されていたが、再び右側乳房(D)領域に増大傾向を示す無痛性腫瘍(3×2cm)を認め当科受診した。試験切除した腫瘍は灰白色で辺縁は比較的明瞭であった。組織学的には、紡錘形の腫瘍細胞が典型的に striform pattern 像を呈し、乳腺に原発した malignant fibrous histiocyoma と診断された。約3週間後単純乳房切除術を施行したがリンパ節廓清は施行しなかった。腫瘍細胞の脂肪組織への浸潤を認めた。術後も補助化学療法は施行していないが、患者は術後1年2カ月を経過した現在も再発転移の徴候はない。

索引用語：乳腺非上皮性腫瘍, malignant fibrous histiocyoma, 花むしろ多形型

緒 言

1964年 O'Brien ら¹⁾が malignant fibrous xanthoma として症例を報告して以来、多数の臨床報告がなされている。しかし、乳腺原発 malignant fibrous histiocyoma は稀で、われわれの検索し得た限りでは本邦で13例目で、しかも男性の同腫瘍は本邦初と思われた。現在術後約1年を経過するが、再発を認めていない。今回われわれはきわめて稀な男性の乳腺原発 malignant fibrous histiocyoma の治療経験を有したので報告する。

症 例

患者：31歳、男性。

主訴：右乳房腫瘍。

家族歴：特になし。

既往歴：特になし（放射線治療経験なし）。

現病歴：10年前右乳房の部位に腫瘍を触知し、近医にて腫瘍切除を施行されたが、特に腫瘍の説明はされなかった。2年前頃より、同部位に腫瘍形成を認めるも放置、徐々に腫大してきたため、平成1年9月20日当科初診となった。

初診時現症：身長166cm, 体重68kg, 血圧138/90 mmHg, 眼球結膜に黄染なく、眼瞼結膜に貧血無し。右乳房 D 領域に手術痕を認め、その直下に2×3cmの楕円形の弾性硬の腫瘍を触知した。皮膚には発赤などの所見を認めず、胸筋緊張位にても腫瘍の可動性は良好で胸筋との癒着はないと思われた。また腋窩リンパ節は触知不能であった。

マンモグラフィーでは、触診上の腫瘍の部位に一致して比較的明瞭な境界を持つ腫瘍陰影を認めたが、微小石灰化像や針状影 (spicula)・彗星状陰影 (comet sign) などは認められなかった (図1)。

図1 マンモグラフィー像：比較的明瞭な境界を持つ腫瘍陰影を認めた。

1990年12月28日受付 1991年6月17日採用

図2 乳腺超音波像：辺縁平滑な楕円形で、内部エコーは不均一で複雑な構造を呈した。

乳腺超音波所見では、形状は整な楕円形で、辺縁は平滑であったが、内部エコーは不均一で複雑な構造を呈し、悪性腫瘍が示唆された（図2）。

生検所見、平成1年10月25日外来にて腫瘍摘出生検術を施行した。摘出腫瘍は偽被膜を有し充実性で断面は灰白色の断面像を呈していた。

臨床病理組織学的検査所見では、3×3×2.5cmの灰白色充実性の腫瘍であった。組織学的には、腫瘍内に出血や壊死が散見され、周囲脂肪組織への浸潤発育像認められた。腫瘍細胞は紡錘形で放射状に配列し、互いに交錯する像を呈し、細胞形や大きさは不同で核の異型性も認められたが、細胞分裂像に乏しく悪性度は低いことが示唆された。また免疫組織学的所見においても α_1 アンチトリプシン陽性、 α_1 アンチキモトリプシン陽性、s-100陰性の結果が得られた。

以上より、乳腺原発 malignant fibrous histiocytoma の花むしろ多形型 (storiform-pleomorphic type) と診断された（図3）。

入院時検査所見では、アルコール性肝障害が認められた他は、腫瘍マーカーを含めて異常所見は認められなかった（表1）。

平成1年11月17日、皮膚の手術後瘢痕部を含む単純乳房切除術を施行した。

病理組織学的所見では前回手術の瘢痕部周囲に大小の乳白色の結節を認め、組織学的には malignant fibrous histiocytoma の所見であった。

術後経過は順調で、平成1年12月1日退院、外来に

図3 病理組織像：紡錘形の腫瘍細胞が放射状に配列し、互いに交錯する像を呈していた（A：×40，B：×250）。

表1 入院時検査所見

血液検査		化学検査	
WBC	5500 /mm ³	ALP	5.3 K-AU
RBC	4.99×10 ⁶ /mm ³	GOT	20 IU/l
Hgb	15.0 g/dl	GPT	31 IU/l
Hct	46.7 %	LDH	325 IU/l
PLT	267000	LAP	259 G-RU
尿定性検査		γ -GTP	92 U/l
		CPK	34 U/l
		CHE	1572 IU/l
		T.BIL	0.5 mg/dl
尿糖	(-)	D.BIL	0.2 mg/dl
尿蛋白	(-)	TTT	3.6 U
血清検査		ZTT	3.0 U
		TIP	7.4 g/dl
		ALB	4.9 g/dl
		BUN	14 mg/dl
		CREA	0.9 mg/dl
		UA	4.7 mg/dl
		T-CHO	268 mg/dl
		TG	117 mg/dl
CRP	≤0.3 mg/dl	GLU	88 mg/dl
CEA	0.8 ng/ml	AMY	212 IU/l
CA15-3	13 U/ml		
BCA225	115 U/ml		

表 2 乳腺原発 MFH 本邦報告例

報告者 (発表年)	年齢	性別	臨床症状	腫瘍径 (cm)	所属リン パ節転移	遠隔転移	病理型	治 療	再発部位	転 帰
小 林(1977) ³⁾	55	女	右乳房腫瘍	16	なし		striform	Br+Mj+Ax	肺	1年7ヵ月死亡
若 田(1980) ⁴⁾	33	女	左乳房腫瘍	32	なし		striform	Br+Mj(一部)	肺・肝腎骨	1.5ヵ月死亡
中 村(1981) ⁵⁾	52	女	左乳房腫瘍 左乳頭異常分泌	8	(-)		inflammatory	Br+Mj+Mn+Ax+PS	(-)	(-)
小笠原(1982) ⁶⁾	46	女	右乳房腫瘍	4.5	(-)		(-)	Br+Mj+Mh+Ax+PS	(-)	(-)
清 松(1983) ⁷⁾	29	女	右乳房腫瘍	2	なし		striform	Br+Ax	な し	2年死亡
林 (1983) ⁸⁾	33	女	右乳房腫瘍	4	なし		striform	Br+Mj+Ax	な し	(-)
小 山(1983) ⁹⁾	56	女	左乳房腫瘍	5.5	(-)		(-)	Br+Mj	局所, 肺	4ヵ月死亡
牛 島(1987) ¹⁰⁾	39	女	右乳房有痛性腫瘍	2	なし	(-)	striform	Br+Mj+Ax	な し	10ヵ月生存
高 嶋(1987) ¹¹⁾	49	女	右乳房腫瘍	3	なし	(-)	striform	Br+Mj+Mn+Ax+PS	肺	10ヵ月生存
貝 塚(1988) ¹²⁾	27	女	左乳房腫瘍	5	なし		striform	Br+Ax	な し	9ヵ月生存
森 (1989) ¹³⁾	56	女	左乳房腫瘍	4	なし	(-)	striform	Br+Mj+Mn+Ax	な し	4年7ヵ月生存
吉 田(1990) ¹⁴⁾	63	女	右乳房腫瘍	6.5	なし	(-)	(-)	Br+Ax+Mn	な し	2年2ヵ月生存
自験例	31	男	右乳房腫瘍	3	(-)	(-)	striform	Br	な し	1年2ヵ月生存

て経過観察となった。

考 察

malignant fibrous histiocyoma (MFH) は第10版臨床病理乳癌取り扱い規約において、III. 非上皮性腫瘍の A. 間質肉腫に分類されている²⁾。その発生頻度は諸家の報告により若干の差は認められるものの総じて稀である。

われわれの入手し得た放射線治療の既往の無い乳腺原発 MFH の本邦報告例は12例であり、すべて女性であったが、われわれの報告例は男性で本邦報告例の男性としては1例目であると思われた(表2)。本邦報告例の年齢は、29歳から63歳までで平均43.8歳で標準偏差は11.8であった。これは乳癌症例の好発年齢(40歳台後半)および成人の MFH 症例の平均(58.5歳)に比較して、若年者に発生する傾向が認められた。

主訴は無痛性乳房腫瘍が12例中11例(91.7%)に認められた。また乳房超音波検査やマンモグラフィ検査でも MFH に特徴的な所見に乏しく診断は病理組織学的検査に頼らざるをえない。

手術術式に関しては単純乳房切断術から拡大乳房切断術まで施行されているが、所属リンパ節転移は認められていない。また Browder ら¹⁵⁾もリンパ行性転移はほとんど無く、血行性転移が主であると報告し、単純摘出術または単純乳房切断術を推奨している。本症例はその病理組織学的所見から悪性度は低いと判断し、局所再発に主眼をおいた単純乳房切断術を施行し、所属リンパ節の廓清は施行しなかった。術前術後の抗癌剤の投与は施行せず退院以降外来に於て経過観察中であるが、1年2ヵ月を経過した現在再発の徴候は認め

られない。

一方、放射線治療施行後に誘発される腫瘍としても、malignant fibrous histiocyoma があげられる。特に乳癌手術後の補助療法として放射線治療を施行後 malignant fibrous histiocyoma が発生したとの報告がある¹⁶⁾¹⁷⁾。今後、乳腺の縮小手術が増加するにしたい放射線治療の機会が多くなると思われるが、照射部位の malignant fibrous histiocyoma の発生に対し注意が必要と思われる。

結 語

今回われわれは、31歳男性の右側乳房原発の malignant fibrous histiocyoma の1症例を経験し、きわめて稀な症例と思われたので若干の文献的考察を加えて報告した。

文 献

- 1) O'brein JE, Stout AP: Malignant fibrous xanthomas. Cancer 17: 1445—1455, 1964
- 2) 乳癌研究会編: 臨床・病理. 乳癌取り扱い規約, 第10版, 金原出版, 東京, 1989
- 3) 小林 晏, 北村 且, 弥生恵恵司他: 乳腺原発 Malignant Fibrous Histiocyoma の1症例, 癌の臨 23: 1085, 1977
- 4) Hanada M, Maeda T, Takeuti N: Cystsarcoma phyllodes of the breast with features of malignat fibrous hitiocyoma. Acta Pathol Jpn 30: 91, 1980
- 5) 中村 毅, 藤田忠雄, 藤原 順他: 乳腺に原発した Inffimatory malignant fibrous histiocyoma の1治験例, 日臨外医会誌 42: 146, 1081

- 6) 小笠原弘二, 陸川容亮, 奈良田光男他: 乳腺原発の malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日臨外会誌 43: 1285, 1982
- 7) 清松一郎, 青柳和彦, 岩田正一朗他: 乳腺の悪性繊維球腫 Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日癌治療会誌 43: 1285, 1983
- 8) 林 嘉繁, 田島 滋, 辻沖康伸他: 悪性線維性組織球腫の 1 例, 日癌治療会誌 18: 1213, 1983
- 9) 小山博記, 和田富雄, 高橋良和他: 乳腺原発 Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日癌治療会誌 18: 1213, 1983
- 10) 牛島 聡, 皆川真樹, 清原 薫他: 乳腺原発 Malignant fibrous histiocytoma, 日外会誌 88: 119—122, 1987
- 11) 高島成光, 棚田 稔, 土井原博義他: 術後早期に肺転移原発 Malignant fibrous histiocytoma (MFH) の 1 例, 癌の臨 33: 1718—1725, 1987
- 12) 貝塚広史, 鎌田國尋, 金森 裕他: 乳腺原発 Malignant fibrous histiocytoma (MFH) の 1 例, 道南医会誌 23: 185—187, 1988
- 13) 森 俊治, 安藤幸史, 古田凱亮他: 乳腺原発 Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日臨外医会誌 44: 1809—1813, 1989
- 14) 吉田晃治, 野中道康, 原口周一他: 乳腺 Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日臨外医会誌 51: 2426—2431, 1990
- 15) Browder W, McQuitty JT, McDonald JC, et al: Malignant cystsarcoma phyllodes, treatment and prognosis. Am j Surg 136: 239, 1978
- 16) 乾 浩三, 森本忠興, 駒木幹正他: 乳癌放射線照射後に発生した Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 日外会誌 89: 1722—1725, 1988
- 17) 松川 中, 石井 宏, 坂井重信他: 放射線照射が関与したと思われる Malignant fibrous histiocytoma の 1 例, 皮膚臨 31: 541—545, 1989

A CASE OF MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA ARISED IN THE MALE BREAST

Kazuyoshi SUGIYAMA, Makoto KAWABATA, Toshiaki IBA, Toshio KIKUTCHI, Masaki FUKUNAGA,
Akio KIDOKORO, Takashi TANI and Yoshihiro YAGI

Department of Surgery, Urayasu Hospital, Juntendo University School of Medicine
(Chief: Yoshihiro YAGI)

Hiroshi SHIMOTA and Kazuhisa ISHI

Department of Clinical Laboratory, Urayasu Hospital, Juntendo University

A recent case of malignant fibrous histiocytoma arised in the male breast is reported with a review of the literaure. A 31-year-old man, who underwent resection for a tumor in the right breast 10 years before, again found a slightly enlarging, painless tumor 3 × 2 cm in size in the inside (D) region of the right breast. Excisional biopsy revealed grayish white tumor with a clear margin. Histologically, the tumor was composed of spindle shaped cells of a storiform pattern, which was diagnosed as malignant fibrous histiocytoma of the breast. Simple mastectomy was added to this patient. The tumor invaded the fat tissues. No postoperative adjuvant chemotherapy was given. The patient made an uneventful recovery and is now free of disease one year and two months the patient after surgery.