原 著

n (—)・se 胃癌の臨床病理学的検討

—リンパ節郭清縮小の可能性—

弘前大学医療技術短期大学部

杉 山 護

弘前大学第2外科 (主任：今 充教授)

小 堀 宏 康 羽 田 隆 吉 鈴 木 純 伊 藤 卓
三 上 泰 徳 森 田 隆 幸 鈴 木 英登士 今 充

深達度 se の胃癌 (以下 se 胃癌) でもリンパ節転移がみられない症例 (以下 n (—)) があり、もし術前、術中にこのことが判明すれば、リンパ節郭清を縮小し、主な死亡原因の腹膜播種に対して積極的な対処が可能となる。そこで第2群以上のリンパ節郭清 (以下 R₂以上) を行った se 胃癌157例を対象に、n (—) 24例 (A 群) とリンパ節転移陽性の n (+) 133例 (B 群) の2群に分け、術前、術中に判明した所見の中で n (+) あるいは n (—) に特徴的なものがあるか否かを検討した。その結果、リンパ節転移の肉眼判定には信頼がおけず、わずかに B 群に癌型で3型が、また腹膜播種性転移陽性例の多いことが判明したが、この他にはリンパ節郭清縮小が可能なことを示唆するような臨床的特徴はみだせなかった。se 胃癌にリンパ節郭清の縮小を目指すには広範な Bursectomy と R₂以上を行い、胃摘出直後に第1群リンパ節の迅速凍結標本を作成、組織学的診断に頼るのが一つの方法と思われた。

索引用語：se 胃癌，n (—) 胃癌，n (+) 胃癌，リンパ節郭清の縮小，腹膜播種

緒 言

組織学的深達度 se の胃癌 (以下 se 胃癌) の手術成績は、リンパ節郭清の拡大にもかかわらず、明らかな遠隔成績の向上は得られていない。その最大の原因は腹膜再発であり、これらの症例に対してはリンパ節郭清に加え、腹膜播種に対する適切な予防措置が必要とされている^{1)~4)}。一方、se 胃癌でありながら組織学的リンパ節転移が認められない症例 (以下 n (—)) が20~26% 程みられるという¹⁾²⁾。最近治癒切除可能と判断される漿膜面露出 (以下 S (+)) 胃癌に対しては、大動脈周囲のリンパ節 (以下 No. 16リンパ節) を郭清する (以下仮称 R₄) 施設が多くなってきた。S (+) 胃癌のうち、癌組織が漿膜面に明らかな浸潤を認める S₂ は組織学的には se 胃癌に相当するが、もし n (—) であればリンパ節郭清よりも腹膜播種に対する対策こそが治療上より重要となる。しかし、リンパ節転移の有無を術前、術中に正確に識別することは困難である。そこで

第2群以上のリンパ節郭清 (以下 R₂以上) を行った se 胃癌を対象に、術前・術中所見を中心に n (—) を予測させる臨床的特徴があるか否かについて検討した。

研究対象及び方法

1976~1988年までに弘前大学第2外科で胃切除を施行した se 胃癌は222例で、リンパ節郭清程度は R₂以上157例70.7%，R₂未満65例23.9%であった。以下の検討は R₂以上を行った157例を対象にした。157例の組織学的リンパ節転移程度 (以下 n) 別頻度をみると、n (—) は24例15.3%にすぎなかったのに対し、第1群、第2群、第3群リンパ節 (以下 n₁，n₂，n₃) および第3群より以遠 (以下第4群) のリンパ節 (以下 n₄) のいずれかに転移を認めた症例 (以下 n (+)) は、133例84.7%に及んだ。その内訳は n₁ (+) 49例31.2%，n₂ (+) 58例36.9%，n₃ (+) 18例11.5%，n₄ (+) 8例5.1%であった。そこで対象とした157例を n (—) の A 群24例と n (+) の B 群133例の2群に分け (表1)，それらの臨床的特徴を2群間で比較、検討した。なお、所見の記載は胃癌取り扱い規約改定第11版に準拠、統計学

表 1 対象(R₂以上 se 胃癌)

A 群(n(-))	24例(15.3)
B 群(n(+))	133 (84.7)
n ₁	49(31.2)
n ₂	58(36.9)
n ₃	18(11.5)
n ₄	8(5.1)
計	157 (100)

()内: %

的处理には χ^2 検定を用い、累積生存率の算出は Kaplan-Meier 法で行った。

成 績

1. 肉眼的リンパ節転移程度(N)とnの一致率(N判定の正確度)

A 群は N と n が一致したもの(N=n), すなわちリンパ節転移なし(以下 N(-))と肉眼判定したものはわずか24例中5例20.8%にすぎず、圧倒的多数の19例79.2%は転移陽性と判定した読み過ぎ(N>n)であった。B 群では N と n が一致したものは133例中69例51.9%と半数を占め、読み過ぎは40例30.1%, 読み不足(N<n)は24例18.0%であった。その内訳は n₁ 49例では第2群以上に転移あり(以下 N₂以上)と判定した読み過ぎが26例53.0%と半数を占め、一致19例38.8%がこれにすぎ、N(-)と判定した読み不足はわずかに4例8.2%であった。n₂ 58例では一致が36例62.1%と最も多く、第3群以上に転移あり(以下 N₃以上)と判定した読み過ぎが13例22.4%, 第1群にのみ転移ありと判定した読み不足が9例15.5%であった。n₃ 18例では半数を超える10例55.6%が一致し、次いで N₂までと判定した読み不足が7例38.9%, 第4群まで転移あり(以下 N₄)と判定した読み過ぎ1例5.5%であった。n₄ 8例では N₄と判定した一致、N₃までと判定した読み不足がそれぞれ4例50.0%であった(表2)。なお、B 群133例中4例3.0%に跳躍リンパ節転移を認めた。その内訳は n₁ (-)・n₂ (+)・n₃ (-) が2例1.5%, n₁ (+)・n₂ (-)・n₃ (+) が2例1.5%であった。従って n₁ (-)・n₂ (+)・n₃ (-) の2例を省くと、残りの131例はいずれも n₁ (+)であった。この n₁ (-) の2例の転移状況は n₁ 0/48, n₂ 1/49, n₃ 0/3および n₁ 0/42, n₂ 3/15, n₃ 0/14であった。

2. 癌型

A 群では3型が8例33.4%と最も多く、次いで4型6例25.0%, 2型5例20.8%, 5型3例12.5%の

表 2 肉眼的リンパ節転移程度(N)と組織学的リンパ節転移程度(n)の一致率

	一 致 (N=n)	読み過ぎ (N>n)	読み不足 (N<n)	計
A 群	5(20.8)	19(79.2)		24(100)
B 群	69(51.9)	40(30.1)	24(18.0)	133(100)
n ₁	19(38.8)	26(53.0)	4 (8.2)	49(100)
n ₂	36(62.1)	13(22.4)	9(15.5)	58(100)
n ₃	10(55.6)	1 (5.5)	7(38.9)	18(100)
n ₄	4(50.0)		4(50.0)	8(100)

()内: %

表 3 癌型

	A 群	B 群
1 型	2 (8.3)	5 (3.8)
2	5(20.8)	17(12.8)
3	8(33.4)	85(63.8)
4	6(25.0)	17(12.8)
5	3(12.5)	9 (6.8)
計	24(100)	133(100)

()内: %

順で、1型は2例8.3%にすぎなかった。B 群でも3型が85例63.8%と最も多く、4型、2型がおのおの17例12.8%, 5型9例6.8%, 1型5例3.8%であった。A 群に比べB 群では3型の頻度が高く、4型、2型、5型および1型の頻度が低かったが、統計学的には両群間に有意差はなかった(表3)。

3. 腫瘍面積

A 群では50cm²未満14例58.3%, 50~100cm²未満8例33.3%, 100cm²以上2例8.4%であった。B 群では50cm²未満78例58.6%, 50~100cm²未満28例28.6%, 100cm²以上17例12.8%とA 群とほぼ同様の頻度であり、両群間に有意差はなかった。

4. 漿膜面浸潤の程度(S)と深達度seの一致率

A 群では se に相当すると考えられる癌組織が漿膜面に明らかに出血している S₂と判定した一致率が24例中20例83.3%, 癌組織の浸潤が他臓器まで及ぶ S₃と判定した読み過ぎが1例4.2%, 癌組織が漿膜面にまったく出ていないかようやく出ていると思われる S₀, S₁と判定した読み不足が3例12.5%であった。B 群では S₂は133例中95例71.4%とA 群に比べ低く、読み過ぎの S₃は22例16.5%と高く、読み不足の S₀, S₁は16例12.1%であり、A 群とB 群の間に有意差を認めなかった(表4)。

表4 漿膜面浸潤の程度(S)と深達度seの一致率

	一致 (S ₂)	読み過ぎ (S ₃)	読み不足 (S ₀ , S ₁)	計
A群	20(83.3)	1(4.2)	3(12.5)	24(100)
B群	95(71.4)	22(16.5)	16(12.1)	133(100)

()内: %

5. 腹膜播種性転移の程度(P)

A群では播種性転移をまったく認めないP₀が24例中22例91.7%, 播種を認めるP₁₋₃(以下P(+))が2例8.3%であった。B群ではP₀が133例中114例85.7%, P(+)が19例14.3%とA群に比べP₀が少なくP(+)が多かったが, 統計学的に有意差はなかった。

6. 肝転移の程度(H)

A群では肝転移をまったく認めないH₀が24例中23例95.8%を占め, 肝転移を認めるH₁₋₃(以下H(+))は1例4.2%にすぎなかった。B群でもH₀が133例中128例96.2%, H(+)が5例3.8%とA群とほぼ同頻度であった。

7. 組織型

便宜上pap, tubを分化型(48例), por, muc, sigを未分化型(105例), as, sq, cd, ud, msなどの特殊型をその他(4例)として検討した。A群では分化型5例20.8%, 未分化型18例75.0%, その他1例4.2%であった。B群では分化型43例32.3%, 未分化型87例65.4%, その他3例2.3%でA群に比較し分化型が多く, 未分化型が少なかったが2群間に有意差はなかった。なお, 組織型別リンパ節転移率は, 分化型のn(-)10.4%(5/48), n(+)89.6%(43/48)に比べ, 未分化型ではn(-)17.1%(18/105), n(+)82.9%(87/105)とn(-)がやや多かったが有意差はなかった。また, Pは分化型のP₀93.8%(45/48), P(+)6.2%(3/48)に比べ, 未分化型ではP₀82.9%(87/105), P

図1 累積生存率: 累積5年生存率は全症例で48.7%で, A群の82.2%に比べB群では42.7%と有意($p < 0.001$)に低かった。

(+) 17.1%(18/105)とP(+)が多かったが有意差はなかった。Hは分化型のH₀93.8%(45/48), H(+)6.2%(3/48)に比べ, 未分化型ではH₀97.1%(102/105), H(+)2.9%(3/102)とほぼ同頻度であった。

8. 予後

R₂以上を行ったse胃癌157例の累積5年生存率は48.7%で, A群の82.2%に比べB群では42.7%と有意($p < 0.001$)に低かった(図1)。A群の死亡例6例の原因は原病死, 他病死とも3例50.0%であったが, 原病死3例の再発形式は全て腹膜再発であった。B群の死亡例69例の死亡原因は原病死が60例87.0%, 他病死9例13.0%で原病死が圧倒的に多かったが, A群に比

表5 延べ再発形成(B群)

	腹膜	胸膜	肝	肺	骨	脳	皮膚	局所	(複 合 型)
n ₁	17	2	2			1		2	(腹膜・胸膜2, 肝・脳1)
n ₂	27		7	3	2	1	2	2	(腹膜・肺3, 肝1, 骨1, 皮膚1, 肝・皮膚1, 局所1)
n ₃	6		4	1	2				(腹膜・骨1, 肝・肺・骨1, 肝・局所1)
n ₄	6								
計	56	2	13	4	4	2	2	7	14
	(93.3)	(3.3)						(11.7)	(23.3)

()内: %

べ統計学的には有意差を認めなかった。B 群の原病死 60 例の再発形式の中では腹膜再発が 56 例 93.3% と大半を占め、肝、肺、骨、脳、皮膚などの血行性再発も 25 例 41.7% と高かった。次いで局所再発 7 例 11.7%、胸膜再発 2 例 3.3% などがみられた。なお、B 群の症例で腹膜と他臓器、あるいは肝と他臓器などの複合型再発の占める割合は、14 例 23.3% であった (表 5)。

考 案

進行胃癌のリンパ節郭清の縮小について触れた報告は稀である。僅かに貝原ら³⁾が se 胃癌では R_2 と第 3 群リンパ節を郭清する R_3 との間に 5 年生存率に差がないと述べ、S (+) 胃癌では No. 12 リンパ節郭清を含めた R_2 手術に縮小し、これに腹膜再発防止対策を講じること示唆しているにすぎない。著者らの se 胃癌の再発形式をみても腹膜再発が A 群で 100%、B 群で 93.3% と圧倒的に多く、この腹膜再発防止が se 胃癌手術成績向上の鍵を握っているのが良く分かる。S₂, S₃ 胃癌に対する拡大リンパ節郭清と他臓器合併切除のみでは、遠隔成績の向上に繋がらないというのが、現在のほぼ一致した見解である⁵⁾⁶⁾。

No. 16 リンパ節を郭清する仮称 R_4 手術を行うと、se 胃癌の 23.1~33.9% に No. 16 リンパ節転移陽性 (以下 No. 16 (+)) が認められるという^{7)~9)}。著者らが対象とした症例は、No. 16 リンパ節に対しサンプリング程度の郭清しか行っていなかった時期の症例が大半なこともあり、転移陽性例は 5.1% にすぎなかった。仮称 R_4 手術は一定の治療効果を上げているが、手術時間の延長、術中出血量や術後合併症の増加などのため、適応はある程度限定すべきであるとするものが多い。すなわち、北村ら⁹⁾は ss, N_2 (+) 以上、梅野ら⁷⁾は S_2 か、 S_0 または S_1 で N_2 (+) の場合に適応があるとしている。佐々木ら⁸⁾は R_2 , R_3 で十分と考えられる症例に対する No. 16 リンパ節の重点的予防的郭清の重要性を強調している。高橋¹⁰⁾は仮称 R_4 を行わないと真の治療判定は難しく、 n_3 (-), No. 16 (+) にこそリンパ節郭清の意義があると述べている。いずれにしても、仮称 R_4 手術は治療切除が目指せる症例を対象とすべきものと思われる。

また、梅野ら⁷⁾、北村ら⁹⁾によると、No. 16 (+) は全例 n_1 (+)・ n_2 (+) であったという。逆に考えると、 n_1 (-)・ n_2 (-) であれば No. 16 (-) である可能性が高いということにもなる。高橋¹⁰⁾は仮称 R_4 を行った 129 例中 25 例に No. 16 リンパ節転移を認めたが、そのうち n_1 (-)・ n_2 (+) のもの 1 例、 n_1 (+)・ n_2 (-)

のもの 2 例を認めたと述べている。しかし、著者らの成績では n_1 (-) で n_2 (+) の症例を 133 例中 2 例に認めたが、他の 131 例は全て n_1 (+) であり、 n_1 (-) で n_3 (+) や No. 16 を含めた n_4 (+) の症例はまったくみられなかった。以上の点を考え合わせると、 n_1 (-) であれば n (-) の se 胃癌である可能性が極めて高いことになり、もしこれらの症例を術前、術中に識別できれば、患者に余分な侵襲を与える広範なリンパ節郭清を省略して、S (+) 胃癌の再発形式のうちでもっとも多い腹膜再発に対する予防措置に全力を傾けることが可能となろう。

術前、術中に得られるデータの中でもっとも問題になるものに N と n の一致率 (N 判定の正確度) があるが、前述した如く A 群では 20.8% と極端に低く、B 群でも 38.8~62.1%、平均 51.9% と一致、不一致が相半ばし、術前、術中の転移判定はリンパ節郭清程度決定の材料としては不十分であることが分かった。そこで他の肉眼的所見、すなわち癌型、腫瘍面積、S, P, H に着目したが、A 群に比べ B 群に 3 型が多い傾向にあること、P (+) が多い傾向にあることを省けば、これらのなかに n (-) を推定させる特徴的要素となりうるものはみいだせなかった。また、組織型をみても n (-) と関連する特徴的なものは認められなかった。その他 ly , v , INF , 間質量などについても通常の術前内視鏡的生検で得られる標本からの判定は困難であり、従ってリンパ節転移有無の判定の補助手段として役立てることは、不可能に近い。

著者らの se 胃癌では n_1 (-) で n_2 以上 (+) の症例が 2 例しかなかった。このことから術中に n_1 (-) であることが確認できれば、リンパ節郭清縮小の可能性も生まれるものと考えられる。実際には臨床的に n (-) を思わせる特徴をみいだせない現状では、胃を摘出した段階で第 1 群リンパ節の迅速凍結標本を作製、組織学的に判定するのが一つの方法であろう。しかし、術中に行う検査としてはリンパ節の数によっては検体数が非常に多くなること、胃が摘出される時間によっては検査が制限される可能性があること、迅速凍結標本とホルマリン固定標本との組織学的所見の不一致など、今後解決しなければならない問題は多い。手術は n_1 (-)・ n_2 (+) 症例の存在を念頭に入れ、腹膜再発予防のため広範な Bursectomy と共に R_2 以上を行い、症例によっては腫瘍の局在に応じて第 3 群リンパ節郭清 (以下 R_3) を重点的に追加する。すなわち、上腹部腹膜の切除とその手術操作に伴うリンパ節郭清を行

い、 $n_1(-)$ であればこの時点でリンパ節郭清を終了する。 $n_1(+)$ で治癒切除可能と判断される場合は、 R_3 に加え重点的に仮称 R_4 を行う。いずれの際にも腹膜再発予防のため、CDDP の腹腔内投与や持続温熱腹膜灌流療法¹¹⁾を行うのが良いと思われる。

結 語

R_2 以上を行った *se* 胃癌157例のうち、 $n(-)$ 症例の臨床的特徴を調べ、逆に臨床的特徴からリンパ節郭清縮小を決定することが可能か否かを検討した。その結果 $n(-)$ と強く関連する臨床的特徴は認められず、術中のリンパ節の迅速凍結標本作成による組織学的判定が、問題点が多いものの、現在とりうる一つの方法と考えられた。

文 献

- 磯崎博司, 岡島邦雄, 草島康雄他: 組織学的漿膜浸潤陽性 (*se*) 胃癌の検討—リンパ節転移程度, 漿膜浸潤面積の大小と遠隔成績について—. 日臨外医学会誌 53: 789—795, 1992
- 孝富士喜久生, 橋本 謙, 安元健二他: *ss* 胃癌の臨床病理学的検討—*pm* 癌, *se* 癌との比較検討—. 日臨外医学会誌 52: 973—978, 1991
- 貝原信明, 前田迪郎, 古賀成昌: 漿膜浸潤陽性胃癌に対する手術の縮小と積極的な腹膜再発防止対策. 日外会誌 89: 1521—1523, 1988
- 貝原信明, 前田迪郎, 清水法男他: 漿膜浸潤胃癌の術後腹膜再発防止対策としての持続温熱腹膜灌流療法. 日消外会誌 22: 1001—1004, 1989
- 種村廣巳, 鷺尾博司, 木田 恆他: 肉眼的漿膜面因子陽性胃癌の臨床的評価—治癒切除例からの検討—. 日臨外医学会誌 48: 1977—1983, 1987
- 中根恭司, 今林伸康, 岡本真司他: 肉眼的漿膜浸潤胃癌における外科治療の限界—治癒切除例からの検討—. 日消外会誌 22: 1755—1760, 1989
- 梅野寿夫, 篠原貫之, 鳥谷 裕他: 胃癌における腹部大動脈周囲リンパ節転移例の検討. 日臨外医学会誌 53: 2047—2051, 1992
- 佐々木壽英, 梨本 篤, 筒井光広他: 胃癌大動脈周囲リンパ節郭清の適応. 日消外会誌 22: 1749—1754, 1989
- 北村正次, 荒井邦佳, 宮下 薫: 胃癌における大動脈周囲リンパ節転移に関する臨床病理学的検討. 日消外会誌 24: 1905—1910, 1991
- 高橋 滋: 腹部大動脈周囲リンパ節郭清例からみた胃癌リンパ節転移の検討. 日外会誌 91: 29—35, 1990
- 杉山 譲, 鈴木英登士, 羽田隆吉他: 進行胃癌に対する全身温熱療法と持続温熱腹膜灌流療法. 癌と化療 18: 619—624, 1991

CLINICOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF *se* GASTRIC CANCER WITHOUT LYMPH NODE METASTASIS —POSSIBILITY OF MORE CONSERVATIVE NODE DISSECTION—

Yuzuru SUGIYAMA, Hiroyasu KOBORI*, Ryukichi HADA*, Jun SUZUKI*,
Takashi ITOH*, Yasunori MIKAMI*, Takayuki MORITA*,
Hidetoshi SUZUKI* and Mitsuru KONN*

Allied Medical Science, Hirosaki University and Second Department of Surgery, Hirosaki University School of Medicine*

The results of excision for *se* gastric cancers largely depend on two factors, peritoneal dissemination and lymph node metastasis. Pre- or intra-operative information related to the lymph node involvement may facilitate a more effective, i.e., more biased management against the possible peritoneal dissemination which often leads to a fatal outcome. Clinicopathological features of 24 patients without (Group A) and 133 patients with microscopic lymph node involvement (Group B) having undergone a gastric resection combined with $\geq R_2$ node dissection for a *se* cancer were retrospectively analyzed. There was a wide discrepancy between the pre-/intra-operative (macroscopic) and postoperative (microscopic) judgement on node involvement. No noticeable difference was found between Group A and B except that a type 3 tumor and peritoneal dissemination were more frequent in the Group B patients with positive lymph nodes. To lessen the degree of node dissection, thereby more concentrating on the management of peritoneal dissemination, intraoperative frozen section histology for node metastasis seemed mandatory.