原 著

高齢者大腸癌手術症例の検討 —術前術後合併症から見た高齢者の位置付け—

高山赤十字病院外科

二 村 学 横 尾 直 樹 北 角 泰 人 山 口 哲 哉
白 子 隆 志 米 山 哲 司 森 茂 東 久 弥
米 沢 圭 清 水 謙 司

今回われわれは大腸癌手術症例で、年齢層別比較検討を加え、高齢者の位置付けを明らかにし、周術期留意点について言及した。1990年から1994年に経験した大腸癌手術症例155例を、80歳以上のA群：26例、70～79歳のB群：40例、70歳未満のC群：89例に分け、術前術後合併症、手術術式、麻酔法などを比較検討した。術前合併症保有率はA・B群で有意($p<0.01$)に高率で、特に脳血管障害、呼吸器疾患、低蛋白血症が高率であった。術後合併症発生率も、A群・B群で有意に高率で、特に呼吸器合併症、精神障害が高率であった。手術術式、出血量、手術時間、麻酔時間は高齢者群ほど有意($p<0.05$)に縮小傾向がみられた。A群・B群で腰椎・硬膜外麻酔の採用される傾向があった。術前術後合併症は70歳から急増し、現段階では70歳以上を高齢者と位置付けられるものとする。特に呼吸器合併症、精神障害に細心の注意を払うべきと考えられた。

索引用語：高齢者大腸癌，術前術後合併症

はじめに

高齢化社会の進展と医療技術の進歩を反映して、各医療機関における高齢者手術症例は増加しており、当科でも同様の傾向がみられるが、これは合併症との戦いであると言っても過言ではない。高齢者を対象とした各種疾患の外科治療に関する報告は多々見られ、最近85歳以上あるいは90歳以上のいわゆる、超高齢者の話題も聞かれるようになってきている。今回筆者らは当院における大腸癌手術症例を取り上げ、年齢層別比較検討を加え高齢者の位置付けを明らかにすると共に、周術期管理における留意点について言及した。

対象および方法

1990年1月から1994年12月までの5年間に当科で手術を施行した大腸癌症例は155例であった。これを80歳以上のA群、26例(16.8%)、70～79歳のB群、40例(25.8%)、69歳以下のC群、89例(57.4%)の3群に分け、術前合併症保有率、手術術式、出血量、手術・麻酔時間、離床・入院日数、麻酔法、術後合併症発生率、予後について比較検討した。なお各群間の有意差

Table 1 Patients profile

	Group A (%)	Group B (%)	Group C (%)
Mean age	83.5	75.2	60.3
Male	11 (42.3)	21 (52.5)	52 (58.4)
Female	15 (57.7)	19 (47.5)	37 (41.6)

NS

判定にはchi-square test, Fisher's exact probably test, Unpaired t-test, Mann-Whitney U-testを用い、危険率 $p<0.05$ をもって有意差ありとした。

結 果

1. 年齢・性別 (Table 1)

全症例の年齢は41～98歳にわたり、平均68.0歳であった。各群の平均はA群83.5歳、B群75.2歳、C群60.3歳であった。性別ではA群で女性の比率が高かったが各群間に有意差はなかった。

2. 占居部位および組織型 (Table 2)

結腸癌の占める割合をみると、A群22例(84.6%)、B群30例(75.0%)、C群54例(60.7%)でC群に比しA群で有意に高率であった。組織型では中・高分化型

1995年12月13日受付 1996年3月26日採用

Table 2 Location and histology

	Group A n=26 (%)	Group B n=40 (%)	Group C n=89 (%)
Location Colon Total	22** (84.6%)	30 (75.0%)	54 (60.7%)
C	3	8	8
A	5	10	8
T	5	7	9
D	0	1	4
S	9	8	25
Rectum Total	4** (15.4%)	10 (25.0%)	35 (39.3%)
Rs	1	4	11
Ra	2	2	6
Rb	1	4	18
P	0	0	0
Histology Differentiated type	25 (96.2%)	37 (92.5%)	80 (89.9%)
Undifferentiated type	1 (3.8%)	3 (7.5%)	7 (7.9%)
Unknown	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.2%)

**p<0.01 vs. Group C

Table 3 Preoperative complications

	Group A n=26 (%)	Group B n=40 (%)	Group C n=89 (%)
Total	25** (96.2)	34* (85.0)	57 (64.0)
Cerebrovascular diseases	5** (19.2)	4** (10.0)	0 (0.0)
Respiratory dysfunction	8** (30.8)	16** (40.0)	4 (4.5)
Hypoproteinemia	7** (26.9)	8* (20.0)	3 (3.4)
Cardiac dysfunction	12#** (46.2)	8 (20.0)	8 (9.0)
Renal dysfunction	7* (26.9)	8 (20.0)	8 (9.0)
Anemia	10* (38.5)	8 (20.0)	11 (12.4)
Diabetes mellitus	1 (3.8)	8* (20.0)	5 (5.6)
Liver dysfunction	1 (3.8)	1 (2.5)	6 (6.7)
Hypertension	7 (26.9)	8 (20.0)	13 (14.6)

p<0.05 vs. Group B

**p<0.01, *p<0.05 vs. Group C

の割合は、A 群25例 (96.2%)、B 群37例 (92.5%)、C 群80例 (89.9%) で各群間に差は認めなかった。

Fig. 1 Operative method

Fig. 2 Mode of anesthesia

3. 術前合併症保有率 (Table 3)

術前何らかの合併症を有していたのは、A 群25例 (96.2%)、B 群34例 (85.0%)、C 群57例 (64.0%) であり、A・B 群はC 群に対して有意に高率であった。個別には脳血管障害 (A 群19.2%、B 群10.0%、C 群0.0%)、呼吸器疾患 (A 群30.8%、B 群40.0%、C 群4.5%)、低蛋白血症 (A 群26.9%、B 群20.0%、C 群3.4%) が70歳以上のA・B 群で高率であった。心疾患、腎障害、貧血の合併率は加齢と共に増加傾向を示し、糖尿病はB 群で有意に高率であった。肝疾患、高血圧では各群間に差は見られなかった。

4. 手術術式 (Fig. 1)

非切除に終わったのは、C 群の2例のみであった。郭清度がD0-1の縮小手術はそれぞれ、A 群10例 (38.5%)、B 群4例 (10.0%)、C 群12例 (13.5%)、D2-3の拡大手術はA 群16例 (61.5%)、B 群36例 (90.0%)、C 群75例 (84.3%) であり、A 群はB・C 群に比べ縮小手術が採用されていた。しかし治癒切除率は、A 群73.0%、B 群87.5%、C 群80.9%で各群間に差は認めなかった。

5. 麻酔法 (Fig. 2)

全身麻酔 (気管内挿管を行ったもの) は、A 群21例 (80.8%)、B 群38例 (95.0%)、C 群88例 (98.9%)、脊椎あるいは硬膜外麻酔 (気管内挿管を行わなかったもの) はA 群5例 (19.2%)、B 群2例 (5.0%)、C 群1

Table 4 Intra and postoperative factors

	Group A	Group B	Group C
Bleeding (ml)	246.2±295.8**	303.2±345.8*	459.4±448.0
Operative time (min)	142.8±62.0**	154.4±73.6**	196.2±100.7
Anesthesia time (min)	199.3±74.7**	211.6±81.8*	255.1±109.8
Lying in bed (days)	4.9±3.8	4.1±2.8	4.1±8.0
Hospital stay (days)	31.8±21.3	33.7±18.0	42.6±55.8

**p<0.01, *p<0.05 vs. Group C

Table 5 Postoperative complications

	Group A n=26 (%)	Group B n=40 (%)	Group C n=89 (%)
Total	19** (73.1)	27** (67.5)	32 (36.0)
Respiratory dysfunction	11** (42.3)	11* (27.5)	10 (11.2)
Mental disorders	12** (46.2)	12** (30.0)	5 (5.6)
Wound infection	3 (11.5)	5 (12.5)	14 (15.7)
Ileus	4 (15.4)	6 (15.0)	13 (14.6)
Anastomotic insufficiency	1 (3.8)	2 (5.0)	1 (1.1)
Intraabdominal abscess	1 (3.8)	2 (5.0)	7 (7.9)
Anastomotic stenosis	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)

**p<0.01, *p<0.05 vs. Group C

例 (1.1%) であり、加齢と共に脊椎あるいは硬膜外麻酔の割合が増加し、A 群は C 群より有意に高率であった。なお脊椎あるいは硬膜外麻酔は年齢を問わず多数の術前合併症併存例であった。

6. 出血量、手術・麻酔時間、離床・入院日数 (Table 4)

出血量は、A 群246.2ml、B 群303.2ml、C 群459.4 ml、手術時間は、A 群142.8分、B 群154.4分、C 群196.2 分、麻酔時間は、A 群199.3分、B 群211.6分、C 群255.1 分といずれも加齢と共に低値を示しており、A・B 群共に C 群との差を認めた。この結果は A 群に縮小手術採用が多く見られた事と、C 群に直腸癌手術症例が多かった事を反映しているものと考えられた。離床日数は、A 群4.9日、B 群4.1日、C 群4.1日、入院日数は、

Fig. 3 Relationship between anesthesia time and postoperative complications

A 群31.8日、B 群33.7日、C 群42.6日であり、各群間に差は見られなかった。

7. 術後合併症発生率 (Table 5)

術後何らかの合併症が発生したのは、A 群19例 (73.1%)、B 群27例 (67.5%)、C 群32例 (36.0%) であり、A・B 群は C 群に対して有意に高率であった。特に呼吸器合併症 (A 群42.3%、B 群27.5%、C 群11.2%)、精神障害 (A 群46.2%、B 群30.0%、C 群5.6%) は70歳以上の A・B 群に高率であった。創感染、イレウス、縫合不全、瘻孔形成、吻合部狭窄について

Fig. 4 Relationship between lying in bed and postoperative complications

Table 6 Prognosis

	Group A n=26 (%)	Group B n=40 (%)	Group C n=89 (%)	
Operative death	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)	NS
Hospital death	1 (3.8)	2 (5.0)	2 (2.2)	NS

は、各群間に差は認めなかった。

8. 術中および術後因子と術後合併症の関係 (Fig. 3, 4)

術後合併症の中で、有意差の認められた呼吸器合併症および精神障害について見ると、麻酔時間が120分以上、離床日数が2日以上になると、70歳以上のA・B群において、両合併症は増加していた。これに対しC群では、麻酔時間210分以上で両者は増加していた。なお出血量、手術時間、入院日数と両合併症との明らかな関係は見い出せなかった。

9. 予後 (Table 6)

手術死亡はC群の1例のみ、入院死亡は、A群1例(3.8%)、B群2例(5.0%)、C群2例(2.2%)で各群間に差は見られなかった。

考 察

厚生省によると、1994年のわが国の平均寿命は男性76.57歳、女性82.98歳まで延び、長寿社会は更に進行している。脳血管障害の絶対的減少と相まって、悪性腫瘍と高齢者の問題について、より現実的な対応が重要になって来ている。中でも胃癌、大腸癌、肺癌など頻度の高い悪性腫瘍に対しては、その生物学的特徴が明らかになりつつあると共に、実際臨床におけるstrategyも確立されつつある。今回筆者らは大腸癌を取り上げ、外科治療上の周術期管理の問題点と注意点について考察した。

一般に高齢者大腸癌の特徴として、(1) 直腸よりも結腸、特に右側結腸の割合が高い、(2) 腫瘤型、限局潰瘍型を含めた限局型の割合が高い、(3) 高分化、中分化のいわゆる分化型癌がほとんどである、(4) slow growingである、(5) 多発癌の割合が高くなる、(6) 宿主免疫能の低下によると思われる転移が多い、などが挙げられている¹⁾²⁾。今回の検討でも加齢と共に結腸優位となり、高齢者では組織型も分化型がほとんどであった。

この様な特徴を踏まえ外科的切除をどの様に行うかについて、最近では全身状態を十分把握し綿密な周術期管理の下に、積極的切除、リンパ節郭清を行う事によって良好な予後が得られる、という見解が多数を占めるようになってきている^{3)~5)}。筆者らの症例では80歳以上ではD0-1郭清の割合が高かったが、本対象期間初期の頃の、高齢者に対する縮小手術の方針を反映した結果と考えられる。現在は周術期管理の中でも特に術後急性期である約1週間をいかに乗り切るかに重点を置きつつ、積極的アプローチに努めている。

さて外科領域における高齢者とは何歳位を呼べばよいのだろうか？ 最近では85歳以上あるいは90歳以上のいわゆる超高齢者についての報告も散見される様になってきているが、平均寿命や総数から見て、70~80歳付近に高齢者の定義を定める事がより現実的かと考える。中野ら⁶⁾は合併症と予後調査から胃癌の高齢者を70歳以上、神田ら⁷⁾は大腸癌の高齢者を手術死亡から75歳以上、溝渕ら⁷⁾は食道癌の高齢者を合併症から75歳以上と定義している。今回の検討より、術前術後合併症、術中術後因子から見た高齢者とは、現段階では70歳以上とするのが妥当と考える。即ち、術前合併症保有率は80歳以上で96.2%、70~79歳で85.0%、69歳以下で64.0%と70歳以上で有意に高率で、特に脳血管障害、呼吸器疾患、低蛋白血症が70歳以上で有意に

増加していた。術後合併症発生率を見てみると、80歳以上で73.1%、70～79歳で67.5%、69歳以下で36.0%と70歳以上で有意に高率で、特に呼吸器合併症、精神障害が70歳以上で増加していた。これらの事から70歳以上は周術期を通じて poor risk であり、現段階における高齢者として位置付けされるものと考えらる。

われわれの高齢者に対する術前合併症保有率、術後合併症発生率は一見高率な様であるが、術前合併症保有率において、石神ら⁸⁾は大腸癌症例で、80歳以上は89.2%、70～79歳は91.4%、69歳以下は58.5%、大谷ら⁹⁾も80歳以上の胃癌症例で95%、中本ら¹⁰⁾は80歳以上の消化器手術一般で87.9%と筆者らの結果同様高率であった。そして術前合併症の中で多いのが、循環器、呼吸器、低蛋白血症、貧血であった。術後合併症発生率についても、石神ら⁸⁾は80歳以上で73.0%、70～79歳で62.6%、69歳以下で50.8%とやはり筆者らのデータと同様であった。一方、友田ら¹¹⁾は80歳以上の大腸癌症例で42.3%、神田ら⁴⁾は75歳以上の大腸癌症例で39.6%、中本ら¹⁰⁾は80歳以上の消化器手術症例で41.1%、横島ら¹²⁾は80歳以上の消化器手術症例で40%、桜本ら¹³⁾は80歳以上の胃癌症例で、42.3%、大腸癌症例で54.5%、胆石症例で54.5%と比較的低値な術後合併症発生率を示しており、合併症の定義に違いがあるにせよ更なる周術期管理の工夫の必要性を痛感した。いずれも合併症の内容として呼吸器合併症と精神障害が最も代表的であり、筆者らの症例において、80歳以上で40%以上、70～79歳でも30%前後見られ極めて高率であった。木多ら¹⁴⁾も80歳以上の全身麻酔開腹症例では31.6%に呼吸器合併症が見られたと言っている。

術中術後因子との関係について見てみると、筆者らの検討ではこの2つの合併症は70歳以上は麻酔時間120分以上、離床日数2日以後で増加していた。その一方で出血量、手術時間、入院日数、麻酔法との関係は今回明らかには出来ず、今後更に検討を要すると考える。中本ら¹⁰⁾は70歳以上の胃癌症例で手術時間3時間以上で呼吸器合併症が倍増したと述べ、大谷ら⁹⁾は80歳以上の胃癌症例で術後合併症発生例の大半は手術時間4時間以上、出血量500ml以上であったという。また横島ら¹²⁾は80歳以上の開腹手術症例で手術時間120分以上のものは呼吸器合併症が3倍にも増加したという。

麻酔法に関しては、NLA (neuroleptanalgesia) が有意に循環器合併症の発生を抑制したり¹²⁾、硬膜外麻酔の併用にて呼吸器合併症^{13)~15)}あるいは虚血性心疾

患¹⁶⁾の予防になったとする報告や、高原ら¹⁷⁾の高齢者のイレウス緊急手術例による全身麻酔例と持続腰椎麻酔例の比較で後者の方が有意に循環・呼吸器合併症の発生率が低かったという報告もあり、手術内容や麻酔法についても十分な検討が必要である。

筆者らは高齢者の周術期管理として具体的には以下の方針で対処している。まず、合併症対策は術前から始まっており、詳細な全身のチェックが必要である事は言うまでもない。呼吸機能低下例に対しては、トリフローを使ったり、砂嚢を前胸部に置いて深呼吸をさせたりして、呼吸筋を鍛える簡便な呼吸練習を最低3日、できれば1週間は続けている。咳嗽、ネブライゼーションも1日最低3～4回を同様に行っている。心機能の評価に対しては全例に心臓超音波検査を行い、更に虚血性心疾患の強く疑われる症例には心臓カテーテル検査を行っている。輸液管理面では高齢者と言うだけで輸液を控えめにすることなく、一方では refilling の時期を見逃さない様に細心の注意を払いつつ、適正輸液を心掛けている。溝渕ら⁷⁾も高齢者食道癌術後の輸液管理に際して、術直後から極端に輸液を少なくする事には問題があり、refilling の時期までは適量の輸液を行い体液バランスを保持し、術中術後の血圧を維持する事が大切であると述べている。上述の方針により、術後に致命的な心不全、虚血性心疾患の発生は幸いにも経験していない。なお心機能低下例には CVP (central venous pressure) 測定の他、Swan-Ganz カテーテルによるモニタリングも積極的に採用し、急性期を乗り切るようにしている。その他、血圧、糖尿病などのコントロールを行う事は言うまでもない。しかし緊急手術例では、術前の評価・是正に自ずと制限があることから、術後管理に難渋することも少なくない。

術中は、当然の事ながら手術時間・麻酔時間の短縮、出血量の抑制に極力努めているが、積極的な根治手術を行おうとすれば、時間の延長、出血量の増加は不可避であり、相矛盾する所もある。それ故、手術に際しては慎重な術前評価が重要となる。また術中には定期的な肺膨張、気道浄化¹⁸⁾、抜管直前の肺の十分な膨張を図ると共に、術後硬膜外チューピングによる疼痛除去に努めている。多数の合併症併存例や、気管内挿管によって呼吸器合併症の発生が強く危惧される場合には、気管内挿管を避け、硬膜外麻酔、腰椎麻酔単独で手術を施行する事もある。

術後は呼吸器合併症と精神障害対策が最も重要となる。今回の検討で、離床日数も合併症発生と密接に関

係している事から見ても、疼痛対策はこのほか重要で、前述の持続硬膜外チューピングを頻用している。注入薬剤としては、塩酸モルヒネ、ブプレノルフィン、局麻剤を適宜使用しているが、高齢者は血圧低下や呼吸抑制を来しやすく、注意深い観察が必要である。これによって早期離床が可能になり高齢者とも言えども術後第2病日までには歩行可能になる例が多い。一方で早期離床がどうしてもうまく行かない場合には、術後もトリフローを活用し深呼吸練習をしたり、喀痰の排出が困難な場合には躊躇なくトラヘルパーの早期挿入を行い、無気肺の治療と予防および肺炎の重症化の予防に努めている。高齢者の場合、入院や周術期の束縛に加え生活のリズムの乱れから、精神障害を来しやすい¹⁹⁾。そのため、日常の生活リズムを出来るだけ守りながら、刺激を常に与える様に努めている。医療スタッフや家族の協力の下、患者と積極的なコミュニケーションを図りつつ、早期離床に努めている。また術前の患者背景を良く理解したうえで、可能であれば新聞、テレビ、ラジオを第1病日からでも接する様にさせている。これらが黒澤ら²⁰⁾の言ういわゆる「心のこもったケア」に相当するものと考ええる。また譫妄状態は昼夜の逆転による夜間不眠・不穏を来しやすく、minor tranquilizerのみでは無効なことも多々みられ、結果として夜間興奮状態が強くなったり、日内リズムの更なる変調を来しかねない事から、使用量に注意しつつmajor tranquilizerも積極的に使用する様にしている。輸液回路、ドレーン、NGチューブについても可及的早期の抜去を心掛けている。逆にこれらの長期留置の可能性の高い場合には、あらかじめ胃瘻や腸瘻を造設している。今回の検討により、術後2大合併症の予防には共通の対策が重要である事を再認識した。

適切な手術と周術期管理によって、良好な予後の期待できる高齢者大腸癌の治療に際しては、まさしく周術期をいかに乗り越えるかが最重要課題といえる。筆者らの手術死亡率および入院死亡率は、80歳以上で0.0%と3.8%、70~79歳で0.0%と5.0%であり、極めて低値である。高齢者に対しては前述の如く簡単に行い得る事を根気よく実践する事こそが綿密な周術期管理であり、良好な結果に繋がるものと考ええる。

結 語

1. 最近5年間に経験した大腸癌手術症例155例を対象に各種因子について年齢層別比較検討を加えた。

2. 高齢者の大腸癌は結腸優位であった。

3. 術前合併症保有率は70歳以上で有意に高率で

あった。

4. 術後合併症も70歳以上で有意に高率で、呼吸器合併症、精神障害に顕著であった。

5. 主な合併症は麻酔時間120分以上、離床開始が第2病日以後で増加した。

6. 現段階では70歳以上を高齢者として位置付け、血量の抑制、手術・麻酔時間の短縮、麻酔法の工夫、早期離床を始めとする綿密な周術期管理の重要性を再認識した。

文 献

- 1) 安富正幸, 喜多岡雅典, 久保隆一他: 特集. 高齢者手術をめぐる諸問題. 大腸癌. 外科治療 72: 39-45, 1995
- 2) 及川隆司, 長谷川正義, 中西昌美他: 70歳以上高齢者大腸癌の臨床病理学的検討. 日消外会誌 20: 1732-1738, 1987
- 3) 大久保靖, 嘉和知靖之, 今城真人他: 高齢者大腸癌の合併症と予後. 日消外会誌 20: 2435-2438, 1987
- 4) 神田 裕, 蜂須賀喜多男, 山口晃弘他: 高齢者大腸癌の臨床的特徴と risk factor. 日消外会誌 19: 2121-2124, 1986
- 5) Hobler KE: Colon surgery for cancer in the very elderly. Cost and 3-year survival. Ann Surg 203: 129-131, 1986
- 6) 古河 洋, 岩永 剛, 平井国夫他: 高齢者胃癌手術の問題点とその予後について. 日外会誌 83: 1073-1076, 1982
- 7) 溝淵俊二, 加藤抱一, 日月裕司他: 高齢者食道癌—食道癌手術における高齢者の定義—. 日消外会誌 27: 2376-2383, 1994
- 8) 石神純也, 山田一隆, 朝沼 榎他: 高齢者大腸癌の外科治療について. 日消外会誌 27: 1961-1967, 1994
- 9) 大谷吉秀, 戸倉康之, 山藤哲也他: 高齢者(30歳以上)胃癌切除例の検討—遠隔成績からみた外科治療上の問題点—. 日臨外医会誌 55: 547-554, 1994
- 10) 中本光春, 裏川公章, 植松 清: 80歳以上の消化器疾患手術例の術後合併症と予後. 日消外会誌 23: 2604-2609, 1990
- 11) 友田博次, 中村吉孝, 古澤元之助他: 80歳以上の高齢者大腸癌手術症例の検討. 外科 50: 686-689, 1988
- 12) 榎島敏治, 遠藤 健, 喜島健雄: 80歳以上の高齢者

- の消化器手術における術後合併症。日臨外医会誌 51: 239—243, 1990
- 13) 桜本邦男, 岡島邦雄, 富士原彰他: 80歳以上高齢者腹部外科手術例の検討。日臨外医会誌 51: 1855—1860, 1990
- 14) 木多秀彰, 富田利夫, 門脇 淳他: 高齢者における術後肺合併症の検討。日臨外医会誌 51: 2119—2124, 1990
- 15) 福井 聖, 竹山栄子: 80歳以上の開腹手術の心・肺合併症に対する硬膜外麻酔の影響。臨麻 14: 1023—1024, 1990
- 16) 松下昌裕, 蜂須賀喜多男, 山口晃弘他: 75歳以上の高齢者胃癌手術後の早期心肺合併症とその予防対策としての硬膜外麻酔の効果。臨外 44: 385—389, 1989
- 17) 高原秀典, 曲淵達夫: 高齢者の緊急手術例における麻酔方法による術後合併症の比較。日臨外医会誌 55: 1137—1142, 1994
- 18) 清水由美子, 土谷晃子: 高齢者開腹術の麻酔—100例の経験から—。臨麻 33: 1159—1163, 1978
- 19) 武市昌士: 手術後の精神医学的問題点。外科 49: 552—556, 1987
- 20) 黒澤 尚, 吉河達祐: 手術後の精神障害とその対策。臨外 44: 191—196, 1989

CLINICAL FEATURES AND MANAGEMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER

Manabu FUTAMURA, Naoki YOKOO, Yasuhito KITAKADO, Tetsuya YAMAGUCHI, Takashi SHIROKO, Tetsuji YONEYAMA, Shigeru MORI, Hisaya AZUMA, Kei YONEZAWA and Kenji SHIMIZU

Department of Surgery, Takayama Red Cross Hospital

One hundred and fifty five patients had been operated on for colorectal cancer in our hospital between 1990 and 1994. They were classified into three groups according to age: 26 patients over 80 years old (Group A); 40 patients from 70 to 79 years old (Group B); and 89 patients less than 69 years old (Group C). Preoperative total complication rates were higher in Groups A and B than in Group C ($p < 0.01$). Cerebrovascular diseases, respiratory dysfunction and hypoproteinemia occurred frequently in Groups A and B. Postoperative total complication rates were also higher in Groups A and B. Respiratory dysfunction and mental disorders were common. Operation methods and time, anesthesia time and the amount of bleeding decreased in the elderly patients ($p < 0.05$). Limited operations and spinal or epidural anesthesia tended to be accepted treatments for Groups A and B.

Because of a rapid increase in pre and postoperative total complication rates among patients over 70 years old, we now categorize patients over 70 years old as elderly for surgical treatment. We must be especially careful of postoperative respiratory dysfunction and mental disorders in surgical treatment for elderly patients.