症 例

頸部腫瘤により発見された甲状腺オカルト癌の2例

国立高崎病院外科

塩谷 恵一 石田 常博 草場 輝雄 勅使河原 修

頸部リンパ節転移より発見された甲状腺オカルト癌の2例を報告する。症例1は鎖骨上腫瘤の穿刺吸引細胞診(ABC)で悪性腫瘍の転移が疑われ、生検にて甲状腺乳頭癌の転移と診断された。症例2は外側頸部腫瘤のABCにて穿刺液中のサイログロブリンが高値であり、甲状腺癌の転移と考えられた。2例とも術前に甲状腺腫を触れず、また超音波検査やシンチグラフィーでも腫瘤を検出できなかった。甲状腺亜全摘・郭清を行い、微小乳頭癌で多発病巣を認め、リンパ節転移は各々1/19, 2/22に陽性であった。腫大した頸部リンパ節を触知する場合には、頸部リンパ節転移の可能性も考慮して、ABCないし生検で確定診断を下す必要がある。

索引用語：甲状腺オカルト癌、頸部腫瘤、微小乳頭癌

はじめに

頸部リンパ節腫大や側頸部腫瘤を初発症状として、生検によって初めて甲状腺癌の転移と判明されるいわゆる甲状腺不顕性癌がある。甲状腺癌取り扱い規約¹⁾では、諸臓器転移巣による臨床症状が先行し、原発巣を検索したが発見されず、その後原発巣として甲状腺に癌が発見されるものを甲状腺オカルト癌(occult carcinoma)と規定している。最近、頸部リンパ節転移により発見された甲状腺オカルト癌で原発巣が1cm以下の微小癌であった2症例を経験したので、文献的考察を加え報告する。

症 例

症例1：42歳、女性。

主訴：右鎖骨上腫瘤。

既往歴：1992年4月(38歳時)、他院で胃癌のため胃切・郭清を施行(腺癌、H0, P0, n0)。

現病歴：胃癌の手術を受けた頃より右鎖骨上に腫瘤があったが、放置していた。最近になり増大傾向がみられたため当科を受診した。

来院時現症：右鎖骨上部に3.3×2.3cm大、弾性硬、表面平滑な可動性良好の腫瘤を触知したが、嚥下との共動は認められなかった。その他にリンパ節の腫大はなく、甲状腺にも腫瘤を触知しなかった。

血液生化学的検査所見：TSH 1.97 μ U/ml, FT₃ 2.1 pg/ml, FT₄ 1.2ng/mlと甲状腺機能に異常は認めら

れなかったが、血中サイログロブリンは154ng/mlと高値を示した。CEAは1.2ng/mlであり、その他の血液生化学検査に異常は認められなかった。

画像診断：頸部CTと超音波検査では、胸鎖乳突筋下で右内頸静脈の外側に腫瘤を認めたが、甲状腺腫は検出できなかった。

経過：悪性腫瘍のリンパ節転移を疑い穿刺吸引細胞診を施行したところN/C比が高い密な配列を示す上皮の集塊がみられ(図1a)、腺癌の転移が疑われた。胃癌ないしその他の悪性腫瘍の頸部リンパ節転移と考え、原発巣を明らかにする目的で1995年9月7日生検を施行した。腫瘤は右内頸静脈に接しており、摘出標本は3.8×2.4×2.1cm大で、断面は黄褐色と黒色の部

図1 a：症例1の右鎖骨上腫瘤の穿刺吸引細胞診所見：腺癌の転移。b：腫瘤摘出標本断面(3.8×2.4×2.1cm)

1996年5月16日受付 1996年9月4日採用

図2 右鎖骨上腫瘍の組織像：乳頭状構造を呈し、一部にコロイドを含む甲状腺乳頭癌のリンパ節転移を示す (HE, ×200)。

図4 症例1の腫瘍組織像：高分化型乳頭癌を示している (HE, ×200)。

図3 症例1の甲状腺切除標本：右葉上極に0.7×0.6×0.2cm, 右葉中下部にも0.3×0.3×0.2cmの小腫瘍を認める。

分が混在する充実性、細顆粒状のものであった (図1b)。病理組織像は腫瘍細胞が乳頭状に増殖し、一部にはコロイドを含有する濾胞がみられ (図2)、甲状腺乳頭癌のリンパ節転移と診断された。

手術所見：1995年9月18日手術を施行し甲状腺右葉上極に大豆大の腫瘍を認め、甲状腺全摘・郭清術を行った。

腫瘍剖面所見：右葉上極に0.7×0.6×0.2cmの限局性の腫瘍と、右葉中下部に0.3×0.3×0.2cmの硬い腫瘍を認めた (図3)。

病理組織学的所見：いずれも腫瘍細胞が腺腔を形成

し、一部にコロイドを貯し乳頭状に増殖する高分化型乳頭癌であった (図4)。リンパ節転移は郭清した18個には認められず、先に生検した1個 (右下内深頸リンパ節) のみであった。

術後経過：術後経過は順調で、10日目に退院し、現在外来にて甲状腺剤を投与しながら経過観察中である。

症例2：56歳、女性。

主訴：左側頸部腫瘍。

既往歴：虫垂炎 (15歳)。子宮筋腫 (54歳)。

現病歴：平成7年5月左中耳炎で治療中左側頸部腫瘍に気付いた。当院耳鼻科を受診し、精査目的で当科に紹介された。

来院時現症：左側頸部 (上内深頸部) に2.3×2.0cm大、弾性硬、可動性のあるリンパ節を触知したが、甲状腺には腫瘍を触知しなかった。

血液生化学的検査所見：TSH 0.22μU/ml, FT₃ 3.1 pg/ml, FT₄ 1.0ng/ml と甲状腺機能に異常は認められなかったが、血中サイログロブリンは48.8ng/ml とやや上昇していた。CEA は1.2ng/ml でその他の血液生化学検査に異常は認められなかった。

経過：初診時、頸部腫瘍の穿刺吸引細胞診を施行した。2mlの暗緑色の液体が吸引され、甲状腺癌の転移を疑い、吸引液中のサイログロブリンを測定した。細胞診は陰性であったが、サイログロブリンは160ng/ml と高値を示したため、甲状腺癌の転移と考えられ、1995

図5 症例2の甲状腺切除標本：左葉上極に $1.0 \times 0.7 \times 0.5$ cm, 右葉峡部に $0.9 \times 0.7 \times 0.6$ cmの腫瘤を認める。

図6 症例2の甲状腺腫瘍の組織像：乳頭状、濾胞状、索状構造を示す乳頭癌を示している（HE, $\times 200$ ）。

年11月27日手術を施行した。

手術所見：甲状腺左葉上極に 1.0×0.7 cm大, 右葉峡部より 0.9×0.7 cm大の硬い腫瘤が認められ, 甲状腺全摘・郭清を施行した（図5）。

病理組織学的所見：2個の結節はいずれもスリガラス様の核と円柱状胞体を有する腫瘍細胞の腺管状・乳頭状増殖が認められ（図6）、石灰沈着を伴っている乳頭癌であり、一部低分化の像もみられた。リンパ節転移は郭清した22個中2個に認められ、術前に触知したものは左上内深頸リンパ節で石灰化を伴う乳頭癌の転移であった（図7）。

術後経過：術後経過は順調で、7日目に退院し現在

図7 左上内深頸リンパ節の組織像：一部に砂粒腫小体を伴う乳頭癌の転移を示している（HE, $\times 100$ ）。

外来にて甲状腺剤を投与しながら経過観察中である。

考 察

甲状腺癌取り扱い規約では、転移巣から原発巣の局在が明らかにされ、術前に原発巣が明らかにされないような癌をオカルト癌と呼び、一般の臨床癌と区別している¹⁾。本症例の場合、リンパ節転移巣の病理組織学的検査ないし穿刺吸引液中のサイログロブリン値により甲状腺癌の転移と診断されたが、術前に原発巣は触知されず、超音波検査で明らかなものは描出できず、手術によって初めて原発巣が確認されたので、甲状腺のオカルト癌と診断した。

甲状腺オカルト癌の頻度は報告により差はあるが $0.1 \sim 1.2\%$ であり^{2)~4)}、比較的稀である。組織型は通常の甲状腺癌と同様に大部分が乳頭癌であり、80%以上を占めている^{2)~5)}。発見契機としてはリンパ節転移と遠隔臓器転移（血行性転移）とがあるがリンパ節転移で発見されることが多い²⁾。一般に乳頭癌はリンパ節転移をきたしやすく、濾胞癌は血行性転移をきたしやすいと言われている²⁾³⁾。遠隔臓器転移としては脊椎⁶⁾、肺³⁾、胸骨⁶⁾、肋骨⁷⁾などが報告されている。本症例は2例とも頸部リンパ節転移により発見されており、組織型もいずれも乳頭癌で、腫瘍の大きさは 0.7×0.7 cm大と 1.0×0.6 cm大と1cm以下の微小癌であった。微小癌では、リンパ節転移は70%にみられるが⁸⁾、本例の症例1では郭清した18個のリンパ節中1個のみ転移陽性であり、症例2では22個中2個のみ転移陽性であり、

オカルト癌ではリンパ節転移個数はむしろ少ないといえる。すなわち、リンパ行性転移がブロックされて、そこで発育・増大を示していると考えられる。また、2例とも主病変の他に、腺内転移ないし多発癌を認めた。術前の超音波で癌巣を描出できなかったが、最近の専用プローベを用いた精度の良いものであれば0.3 cm 以上あれば検出可能とされている⁵⁾。ただし、超音波検査ではその存在診断はできるが、確定診断はやはり穿刺吸引細胞診などの病理組織学的検査によることになる。また、吸引細胞診にて暗緑色(あるいは褐色)の液体が吸引された場合、吸引液中のサイログロブリンの存在は甲状腺癌の有力な所見となる⁹⁾¹⁰⁾。宮内ら¹¹⁾は穿刺液の性状が正中頸嚢胞では透明ないし褐色粘性、側頸嚢胞では黄褐色、上皮小体嚢胞では水様透明であったと報告している。

オカルト癌の治療はリンパ節転移の場合は通常の分化癌と同様に甲状腺亜全摘・郭清(R1)が行われているが、術中腫瘍を触知しない例や腺内転移の広く認められる例では全摘術が行われている³⁾⁸⁾¹²⁾。また遠隔臓器転移の場合は濾胞癌のことも多く、全摘後に放射性ヨードを用いた内照射が有効である²⁾。本例は腺内転移ないし多発癌巣を認めたが、これらを含めた亜全摘・郭清を行い、術後は甲状腺剤によるTSH抑制療法を行っている。

結 語

頸部リンパ節転移により発見された甲状腺オカルト癌の2例を経験した。2例とも微小癌であり、腺内転移ないし多発癌巣を示す乳頭癌であった。頸部リンパ

節腫脹が認められた場合、甲状腺オカルト癌も念頭に置いて精査する必要があると考えられた。

文 献

- 1) 甲状腺外科検討会編：外科・病理。甲状腺癌取扱い規約。第5版，金原出版，東京，1996，p3
- 2) 黒住昌史，石田常博，石北敏一他：脊椎転移によって発見された甲状腺不顕性癌の1例。北関東医40：337—342，1990
- 3) 佐々木悠，白日高歩，鈴木九五他：孤立性肺転移で発見された不顕性甲状腺乳頭癌の1例と文献的考察。日内分泌会誌 67：655—665，1991
- 4) 牧内正夫，矢川寛一：甲状腺微小癌。ホルモンと臨32：727—736，1984
- 5) 相吉悠治，田中秀行，植野 映他：1cm 以下の甲状腺癌：どのようにして発見されたか。内分泌外科 9：1—6，1992
- 6) 青柳和彦，木村信良，飯塚益生他：甲状腺微小癌の検討。外科 46：506—511，1984
- 7) 村田俊夫：甲状腺微小癌の臨床病理学的研究。日内分泌会誌 45：80—89，1968
- 8) 野口昌邦，宮崎逸夫：微小甲状腺癌の臨床。外科診療 26：898—902，1984
- 9) 万代光一，森脇昭介，佐伯俊昭他：リンパ節転移性腫瘍の臨床病理学的検討—原発不明癌と関連して—。日癌治療会誌 29：978—988，1994
- 10) 田中克浩，三木仁司，大下和司他：則頸部嚢胞性腫瘍を主訴とした非触知甲状腺癌の2手術例。内分泌外科 10：177—180，1993
- 11) 宮内 昭，高井新一郎，森本茂人他：頸部リンパ節転移を初発症状とした微小甲状腺癌の検討。日臨外医会誌 48：1953—1956，1987
- 12) 岩本 勲，綾部公範，川原克信他：頸部リンパ節転移を初発症状とした微小甲状腺癌の検討。日臨外医会誌 48：1953—1956，1987

TWO CASES OF OCCULT CARCINOMA OF THE THYROID PRESENTING WITH A CERVICAL MASS

Keiichi SHIOYA, Tsunehiro ISHIDA, Teruo KUSABA and Osamu TESHIGAWARA

Department of Surgery, Takasaki National Hospital

Two patients with occult carcinoma of the thyroid presenting with cervical lymph node metastases are reported.

Patient 1 was suspected of malignancy in the supraclavicular mass by aspiration biopsy cytology (ABC) and diagnosed as nodal metastasis of carcinoma of the papillary thyroid by biopsy. Patient 2 had a cystic lateral cervical mass within a high level of thyroglobulin, suggesting a metastatic node of thyroid cancer. In both cases, no tumor was palpable in the thyroid and was visualized with echography and scintigraphy. Subtotal thyroidectomy with lymph node dissection was carried out. Two cases showed minimal papillary carcinoma with multiple foci and metastatic nodes (1/19 and 2/22 respectively). When an enlarged lymph node in the neck is palpated, ABC or biopsy should be done for definitive diagnosis entertaining a possibility of nodal metastasis.