症 例

腹部外傷患者に発生した壊死性筋膜炎の1例

館林厚生病院外科

清水 公裕 勅使河原 修 高野 晃 寧

群馬大学第2外科 (主任: 森下靖雄教授)

大和田 進 森下 靖雄

壊死性筋膜炎は比較的稀な筋膜炎、皮膚軟部組織の感染症で、主に重症外傷の合併症として発症することが多い。開腹術後の合併症としての報告もあるが、本疾患に対する認識が乏しく、予後不良である。今回、腹部外傷患者に発生した本疾患の1例を経験し、かつ、救命し得たので報告する。症例は60歳の男性外傷による腸管損傷にて開腹術を施行した。術後2週より、創部とは無関係の左上腹部に発赤、水疱を形成し、6日後には皮膚壊死に陥った。皮膚症状の進行と共に全身状態も悪化し、発赤より6日後にはショック状態となった。発症10日後、壊死性筋膜炎の診断をもとに debridement を行った。その後、全身状態は激的に改善し、病変部も治癒に向かった。抗生物質の発達した現在でも本疾患の死亡率は高く、早期診断と外科的治療が治療経過の改善につながる。

索引用語: 腹部外傷, 壊死性筋膜炎 (Necrotizing fasciitis)

はじめに

壊死性筋膜炎 (necrotizing fasciitis) は比較的稀な筋膜炎、皮膚軟部組織の感染症で、主に重傷外傷の合併症として発症することが多い。開腹術後の合併症としての報告もあるが、一般に本疾患に対する認識が乏しく、早期の診断治療が困難で予後も不良である。今回、腹部外傷患者に発生した本疾患の1例を経験し、かつ救命し得たので若干の文献的考察を加えて報告する。

症 例

患者: 60歳, 男性。

主訴: 腹部外傷。

既往歴: 特記事項無し。

現病歴: 1994年6月、木材置場で作業中、木材により腹部を打撲した。救急車で来院し、同日緊急入院した。

入院時現症: 意識状態は清明であったが、腹部の筋性防御が著明で、木材の衝突によると思われる紫斑、筋挫滅が見られた。眼瞼結膜には、高度の貧血を認めた。理学的所見上、胸部に異常を認めなかった。

入院時検査成績: 赤血球数は $278 \times 10^4/\text{mm}^3$ 、ヘモグロビンは 8.7g/dl 、ヘマトクリットは26%、血小板数は

$14.9 \times 10^4/\text{mm}^3$ と、高度の貧血を認めた。白血球増多 (白血球 $5,900/\text{mm}^3$) はなかった。血液生化学検査において、総蛋白が 5.5g/dl と低値を示したが、GOT は37 IU/L, GPT は18 IU/L, LDH は494 IU/L, アミラーゼ値は193 IU/L とほぼ正常範囲であった。

外傷性汎発性腹膜炎の診断で、同日緊急開腹術を施行した。

手術所見: 腹部正中切開で開腹すると、腹腔内には約1,500mlの出血があり、小腸に2カ所、S状結腸に1カ所の腸管断裂と腸間膜の損傷を認めた。肝臓、脾臓、胃に損傷はなかった。断裂箇所の小腸とS状結腸をそれぞれ切除後、端々吻合した。

術後経過: 術後2週より、創部とは無関係の左上腹部に発赤を来した。2日後には同部に水疱を形成し、6日後には皮膚壊死に陥った。壊死部を試験切開したところ、茶褐色、漿液性の滲出液が多量に見られ、筋膜がゼリー状に融解壊死していた。同部の組織を細菌培養検査、病理組織検査に提出した (図1a)。

皮膚症状の進行と共に全身状態も悪化し、局所の発赤より6日後には精神症状を伴う敗血症性ショック状態に陥り Dopamin (DOA $3 \sim 10\mu\text{g/kg/min}$) の使用を必要とした (図2)。

壊死部の細菌培養では緑膿菌とクレブシエラが検出

図 2 臨床経過

図3 病理所見：筋膜の壊死と皮下組織への好中球の浸潤が見られる（HE 染色，図上×10，図下×100）。

された。病理組織検査では筋膜の壊死と皮下組織への好中球の浸潤が見られた（図3）。

発症10日後、壊死性筋膜炎の診断をもとに局所麻酔下で debridement を行った。試験切開時に皮膚潰瘍の下方に見られた発赤部にもやはり筋膜，皮下組織の壊死は進んでおり，広範囲の debridement を要した（図1b）。抗生剤は発症当初 Aspicillin (ASPC) 2g/day（3日間）を投与していたが，症状の改善がないため Imipenem/Cilastatin (IPM/CS) 1g/day に変更し10日間使用した。

debridement 後，全身状態は激的に改善し，局所の

感染も徐々に始まり，創の洗浄化を待つて，発症より3カ月後に大腿部よりの植皮を行った（図1c）。植皮部も良く生着し，植皮後10日で独歩退院した。

考 察

壊死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）は広汎な皮下組織，浅筋膜の壊死を特徴とする重傷皮膚軟部組織感染症である¹⁾。急速な経過をとって進行し，敗血症などの重篤な合併症を伴うことが多く，その死亡率は30～50%に達する²⁾³⁾。本疾患は，1924年に Meleney⁴⁾が hemolytic streptococcus gangrene と報告したのが最初で，その後 gangrenous erysipelas, acute streptococcal gangrene, necrotizing erysipelas などの数多くの名称で報告されてきた。1952年に Wilson⁵⁾が本疾患に特徴的で普遍的な所見である浅筋膜の壊死を重視して necrotizing fasciitis と呼ぶことを提唱し，現在ではこの名称が一般化している。

壊死性筋膜炎は男性に多く，部位的には，四肢が多い。原因としては，掻破，刺傷，打撲などの小外傷や整形外科領域における重傷外傷，腹部手術後などが多い。しかし，外傷の既往がない症例や，原因が不明な症例の報告も多数みられる⁶⁾。自験例の発生原因は，腹部手術後であるが，発症部位が創部と離れており，腹腔内の感染巣に起因したのか，又は打撲外傷に起因したのかは不明である。

壊死性筋膜炎の病原菌としては， β -溶血性連鎖球菌，ブドウ球菌，グラム陰性腸内細菌の頻度が高い。とくに開腹術後の起因菌としては消化管由来のものが多く，大腸菌，Proteus 属，Pseudomonas 属の順で検出されている。しかし今日のように，抗生剤が頻用されている現状では，必ずしも検出菌が起因菌とは断定できない。自験例においても細菌培養では緑膿菌とクレブシエラが検出されているが，抗生剤投与後に細菌培養に提出しているため起因菌とは断定できない。

基礎疾患としては，糖尿病や動脈硬化を有する症例が多く，そのような例では重症化しやすく，また死亡率も高い⁷⁾。

局所所見としては，初めは境界不明瞭な発赤，浮腫，強い圧痛が見られ，1～2日で急激に拡大進展し，2～3日で水疱，血疱，びらんを形成する。1週間前後で皮膚が暗赤色を帯び壊死に陥り，壊死部が分画されてくる。全身症状としては，本症例のごとく39℃以上にもなる高熱が続き，敗血症状態に陥り，種々の程度の精神症状を呈する。病勢は急速に進行し，治療の時期を失すると敗血症性ショック，播種性血管内凝固症

表1 診断基準 (Fisher et al⁹⁾)

1. 皮下を這って拡がる広汎な浅筋膜と周囲組織の壊死
2. 精神症状を伴う、中等度ないし高度の全身性中毒反応
3. 筋層が侵されない
4. 創および血液中に clostridia が証明されない
5. 大血管の閉塞がない
6. 病理組織検査で、高度の白血球浸潤、筋膜と周囲組織の壊死、微小血管の血栓がみられる

候群 (DIC) を引き起こし高率に死の転機をとる。

診断基準として、Fisher らが⁹⁾ 6項目を満たすものを本症としている (表1)。

臨床的に重要な鑑別すべき疾患としては、丹毒とガス壊疽がある。丹毒では主病変が真皮であり、紅斑の境界は鮮明で全身症状も軽度で抗生剤に良く反応する。ガス壊疽は主病変が筋層にあり、蜂窩織炎状に腫脹した病変部の皮下にガスを発生して稔髪音が証明され、分泌物のネズミ糞臭や局所からのガス壊疽菌と総称される嫌気性菌が証明されることから鑑別できる⁹⁾。壊死性筋膜炎は切開すると漿液性の滲出液が排出されるが、膿の貯留はほとんど見られない。また、皮下組織に出血は見られず、浅筋膜は壊死に陥ってぼろぼろの線維状を呈する。本症例も切開時に悪臭や膿の貯留は認めず、これも鑑別に有力な所見といえよう。

治療としては、可及的早期に壊死に陥っている皮下組織や筋膜をすべて切除 (surgical debridement) することが必要である¹⁰⁾。抗生物質の単独投与や小切開による排膿のみでは壊死の進行を止められないのみならず生命予後を不良にする。ある程度創が清浄となれば、感染を抑制する目的で、網状植皮で再建するのが最適である。そのタイミングはケースバイケースであるが、自験例は debridement 後、創の清浄化を待って、約3ヵ月後に植皮を行った。debridement と同時に植皮を行い良好な生着をしたとの報告もある¹¹⁾。その他、高圧酸素療法の有用性も報告されているが評価は一定していない^{12)~14)}。

予後は発症から診断治療までの時間や基礎疾患、特に糖尿病の有無に大きく左右される。壊死性筋膜炎は比較的稀な疾患であるため、最初は診断がつきにくく

抗生剤の投与や小切開が繰り返され、壊死が広範囲に陥り、全身状態が悪化してから診断されることも少なくない。自験例は発症から治療開始まで約1週間経過しているが、外科的治療後は全身症状の改善が見られ、debridement が病勢を抑えたものと考ええる。抗生物質の発達した現在でも本疾患の死亡率は高く、早期診断と外科的治療が本疾患の治療経過の改善につながる。

文 献

- 1) 水野 章, 桜井 敏, 保里恵一他: 外科領域における重症壊死性筋膜炎。化療の領域 5: 1307—1315, 1989
- 2) 小西富夫: 開腹術後の壊死性筋膜炎。臨外 46: 244—245, 1991
- 3) 斉藤朗子, 広瀬孝宗, 中川博美他: 壊死性筋膜炎が疑われた2例。救急医 14: 371—375, 1990
- 4) Meleney FL: Hemolytic streptococcus gangrene. Arch Surg 9: 317—364, 1924
- 5) Wilson B: Necrotizing fasciitis. Am J Surg 18: 416—431, 1952
- 6) 川口新暉, 松山友彦, 日野治子他: Necrotizing fasciitis の2例。皮膚臨床 34: 747—752, 1992
- 7) William J, Rea MD, Walter J, et al: Necrotizing fasciitis. Ann Surg 172: 957—964, 1970
- 8) Fisher JR, Conway MJ, Takeshita RT, et al: Necrotizing fasciitis. Importance of roentgenographic studies for soft-tissue gas. JAMA 241: 803—806, 1979
- 9) 吉川庚之, 長谷川隆哉, 佐藤守弘他: 壊死性筋膜炎の1例。臨皮 48: 71—75, 1994
- 10) 品川長夫: 蜂窩織炎, 壊死性筋膜炎と類症。皮Mook 17: 103—110, 1990
- 11) 藤田龍哉, 高見佳宏, 七戸康弘他: 多発外傷患者に発生した Necrotizing fasciitis の1例。形成外科 35: 93—96, 1992
- 12) 古川英樹, 川島眞人, 田村裕昭他: 壊死性筋膜炎。整形と災外 30: 1675—1681, 1987
- 13) Giulano A, Lewis FJ, Hadley K, et al: Bacteriology of necrotizing fasciitis. Amer J Surg 134: 52—57, 1977
- 14) 升田好樹, 萩原 隆, 吉川修身他: Necrotizing Fasciitis 症例の経験。臨麻 13: 1520—1522, 1989

NECROTIZING FASCIITIS FOLLOWING ABDOMINAL BLUNT TRAUMA
—A CASE REPORT—

Kimihiro SHIMIZU, Osamu TESHIGAWARA and Akiyasu TAKANO

Department of Surgery, Tatebayashi Public Hospital

Susumu OHWAD and Yasuo MORISHITA

Second Department of Surgery, Gunma University School of Medicine, Maebashi

Necrotizing fasciitis is a relatively uncommon infection of the fascia and soft-tissue. It is often associated with severe injuries. Sometimes it has been reported as a complication after laparotomy when we surgeons tend to lack of understanding about the infection and the prognosis of such patient is poor. This time we experienced a case of necrotizing fasciitis following an abdominal blunt trauma.

A 60-year-old man was admitted to the hospital because of an abdominal external injury. An emergency abdominal exploration revealed approximately 1500 ml of blood in the abdominal cavity, and the ruptured jejunum and sigmoid colon. Two weeks after the operation redness developed to form bullae in the left upper quadrant where was not injured site. Six days later the skin lesion started to necrose. With an advance of necrosis, the patient fell into septic shock. The diagnosis of necrotizing fasciitis was made by clinical findings and histological features. Surgical debridement of necrotic tissues was repeated every day. The patient was discharged from the hospital 5 months after the emergency laparotomy. Early diagnosis and rapid initial surgical debridement of necrotizing fasciitis which can be fatal even by today's advanced chemotherapy are important to save patients.