症 例

大量下血を生じた小腸重複症の1例

八千代病院外科

橋 本 瑞 生 秋 田 幸 彦 北 川 喜 己 伊 藤 直 人
佐々木 英 二 芥 川 篤 史 七 野 滋 彦 佐 藤 太 一 郎

症例は14歳男性，主訴下血。来院時ショック状態であった。上腸間膜動脈造影にて小腸に接する濃染像を認め，アンギオ CT で内部に空気像を持った周囲腸管より強く濃染される腫瘤像を認めた。手術施行し，空腸の間膜側に約8cmの囊状腫瘤を認めた。小腸部分切除術施行。腫瘤内腔は全て胃粘膜で覆われ12×13mmの穴で小腸と交通していた。壁の筋層は小腸から連続していた。開口部の小腸粘膜側に長さ15mmの白苔を伴ったU-I-IIIの線状潰瘍を認め，ここが出血源と考えられた。以上より異所性胃粘膜を有した小腸重複症と診断した。異所性胃粘膜を伴った小腸病変で，血管造影の有用性が示唆された。

索引用語：小腸重複症，異所性胃粘膜，大量下血

はじめに

大量下血症例では早急に出血源を見つけ対処しなければならぬが，小腸病変の場合発見は容易でない。血管造影で発見できた，異所性胃粘膜を有する小腸重複症を経験したので文献的考察を含めて報告する。

症 例

患者：14歳，男性。

主訴：下血。

既往歴，家族歴：特記すべき事なし。

現病歴：平成5年11月末頃より間歇的な心窩部痛があった。食後に強かったと言う。平成5年12月4日，午前3時トイレに行こうと起きて，大量に下血し動けなくなり，救急車で来院。

表1 入院時検査成績

WBC	12,900 /mm ³	GOT	24 IU/L
RBC	281×10 ⁴ /mm ³	GPT	7 IU/L
Hb	8.4 g/dl	LDH	241 IU/L
Ht	25.1 %	T.Bil	0.3 mg/dl
Plt	220×10 ³ /mm ³	BUN	34.2 mg/dl
TP	5.0 g/dl	Cr	0.53 mg/dl
Alb	3.4 g/dl	Na	140 mEq/l
		K	4.8 mEq/l
		Cl	111 mEq/l

図1 上腸間膜動脈造影：矢印で腫瘍濃染部位を示す。

1996年2月13日受付 1996年6月20日採用

入院時現症：意識清明，血圧86/38mmHg，脈拍81/分，眼瞼結膜に貧血著明であった。腹部は平坦軟，腫瘤触知せず。6時頃再度大量に下血があり，意識消失した。輸液にて意識回復，以後循環動態安定した。緊急に内視鏡検査施行した。

入院時血液生化学検査成績：Hb 8.4g/dl，Ht 25.1%と貧血であった。WBC 12,900/mm³，TP 5.0 g/dlであった（表1）。

上部消化管内視鏡検査：異常を認めず。

大腸内視鏡検査：大腸内は多量に血液が充満しているのみ，出血源はわからなかった。

注腸検査：12月8日施行。異常所見認めず。

上腸間膜動脈造影：12月10日施行。空腸動脈の末梢に腫瘤様の濃染を認めた（図1）。それは小腸に接し小腸と血管を共有していた。中心部には染まりの悪い部分が存在した（図2）。

アンギオCT：内部に空気像を持った周囲腸管よりも強く enhance される腫瘤像を認めた（図3）。

以上より小腸腫瘍を疑って12月14日手術施行した。

手術所見：Treitz 靱帯より120cmの小腸の間膜側に小腸内腔と交通のある径約75×50mmの囊状腫瘍を

認めた（図4）。腫瘍の壁は隣接する空腸よりやや厚めだが腸管と同じ性状であった。腸間膜リンパ節は広範囲にわたり，炎症性と考えられる弾性軟の腫脹を呈していた。腸管重複症の診断で小腸部分切除術施行した。

切除標本所見：囊状腫瘍は12×13mmの穴で小腸内腔と交通していた。開口部の小腸粘膜側に長さ15mmの白苔を伴った線状潰瘍を認め，ここが出血源と考えられた（図5）内腔は胃の胃底腺領域粘膜と類似していた（図6）。

病理組織学的所見：囊状腫瘍内面は全て胃底腺型胃粘膜組織で覆われており，壁は小腸から連続した平滑筋層を有していた（図7）。潰瘍は筋層まで達しておりU1-IIIであった。以上より異所性胃粘膜を有した小腸の腸管重複症と診断した。

術後経過順調でその後下血は生じていない。

考 察

消化管重複症は舌根から肛門のいずれの部位の消化管にも発生しうる先天性疾患でLadd & Gross¹⁾が提唱した総称名であり，1) 平滑筋によって覆われていること，2) 内面に消化管粘膜を有すること，3) 消化管のある部分に密着して存在すること，を定義として挙

図2 上腸間膜動脈造影（病変部）

A：動脈相早期，B：動脈相後期，C：毛細血管相，D：静脈相

図3 アンギオ CT

図4 術中写真：小腸より連続し隣接する嚢状腫瘍を認める。

図5 切除標本(小腸側からの腫瘍の開口部)：矢印は開口部小腸粘膜の線状潰瘍を示す。

げている。一般的に、重複腸管は腸間膜付着側に位置し、平滑筋層は本来の腸管から連続しており、その腸管と共通の血管で支配されている。しかし、腸管に隣接せず筋層を共有しない例もみられ²⁾、Ladd & Grossが挙げた定義を広義に解釈して腸管重複症とするのが現在の趨勢である。

発生部位は諸家の報告³⁾⁴⁾では小腸(回盲部を含む)に発生するものは、全消化管重複症のおよそ半数を占める。

重複腸管の形態には球状と管状があるが、本症例は、短い隣接する腸管壁に接して広がる内腔を持っており管状型と判断した。全消化管の重複症の中で球状のものは7割を占め⁴⁾、特に小腸では80%が球状である⁵⁾。

隣接腸管との交通は、球状ではわずかに4.7%、管状のものでは85%にみられた⁴⁾。

異所性胃粘膜(胃部発生例は除く)を有する頻度はGross¹⁾らは30.8%、長嶺ら⁴⁾が10.3%、池田ら²⁾は

図6 切除標本(嚢状腫瘍内腔)：胃底線粘膜面と類似している。

14.9%と報告している。異所性粘膜を有する例は管状のものに多い。結腸には管状型の重複症が多いが、異所性胃粘膜の発生は極めて稀のようで梅本ら⁹⁾によれば、胃粘膜1例、気道様粘膜1例しか異所性粘膜の報告はない。

本症例の粘膜は胃底型の粘膜であったが、島津ら⁷⁾によれば異所性胃粘膜は多くは幽門型であり、胃底型は稀である。

症状、診断に関しては、腸閉塞、腸重積、腹部腫瘍とされることが多く、術前に正診されることは少ない。腸出血の原因として石田ら⁸⁾によれば1) 胃粘膜迷入による場合、腸管と交通を有する管状重複症の分岐部に潰瘍が発生するため、2) 圧迫、循環障害により隣接腸管に潰瘍が発生する場合の2つを挙げており、本邦

では後者が多い。

当院では大量下血症例に対して、上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査施行して出血源がわからなければ、腹部血管造影を施行することになっている。大量に出血している場合、造影剤の腸管内への漏出像を認めるはずであり、出血が止まっても腫瘍性病変によるものであれば、腫瘍濃染、圧排像、血管の異常所見などが認められるわけで、出血源を指摘できた例を経験している。

本症例の場合も血管造影で病変部位を診断できた。血管造影で重複腸管が濃染されたのは、異所性胃粘膜を有していたために正常腸管よりも血流が豊富であったためと考えられる。血管造影の報告例は少ないが、大量下血を生じるようなものは潰瘍を生じる異所性胃粘膜が存在するはずであり、このような場合、血管造影も診断に有用と言える。

アンギオCTでは腫瘍の内腔に空気像を確認することができ、充実性の腫瘍ではなく腸管様のものと判断できた。

結 語

小児の間歇的大量下血を生じた小腸の腸管重複症を経験したので報告した。異所性胃粘膜を伴う病変の発見には血管造影の有用性が示唆された。

尚本論文の要旨は第23回日本腹部救急医学会総会にて発表した。

文 献

- 1) Ladd WE, Gross RE: Surgical treatment of duplications of the alimentary tract. Surg Gynec Obstet 70: 295—307, 1940

図7 病理組織像(HE染色, ×20倍)：右側が腫瘍内腔, 左側が小腸粘膜。腫瘍内腔は胃粘膜像と同じ。矢印の範囲が平滑筋層。

- 2) 池田光則, 佐藤元通, 東権 広他: 消化管重複症の
2 例—本邦の定義についての考察—. 小児外科
15: 241—245, 1983
- 3) 奥田庚三, 下野道広, 小林顕彦他: 重複十二指腸の
1 例と本邦消化管重複症の文献的考察. 京都医大
誌 84: 179—187, 1975
- 4) 長嶺信夫, 宮城 靖, 遠藤 巖他: 消化管重複症—
症例報告ならびに本邦文献報告180例の統計的観
察—. 外科診療 19: 466—471, 1977
- 5) 柴田明彦, 田中徳太郎, 馬場原吾他: 新生児回腸重
複症の1 治験例, ならびに新生児消化管重複症本
邦報告例の検討. 日小児外科医誌 15: 761—767,
1979
- 6) 梅本俊治, 小平 進, 寺本龍生他: 大腸重複症—症
例報告並びに本邦報告例の統計的考察—. 日本大
腸肛門病会誌 43: 438—442, 1990
- 7) 島津栄一, 安藤充晴, 嘉屋和夫他: 胃底型粘膜の異
所発生を伴える重複腸管—これを核とした腸重複
症の1 乳児例—. 外科 31: 167—170, 1969
- 8) 石田正統, 土田嘉昭, 斉藤純夫他: 消化管重複症—
症例報告並びに本邦文献報告例の統計的観察—.
外科診療 9: 216—226, 1967

A CASE OF DUPLICATION OF THE SMALL INTESTINE WITH MASSIVE ANAL BLEEDING

Mizuo HASHIMOTO, Yukihiko AKITA, Yoshimi KITAGAWA, Naoto ITO, Eiji SASAKI,
Atsushi AKUTAGAWA, Shigehiko SHICHINO and Taichiro SATO
Department of Surgery, Yachiyo Hospital

A 14-year-old male was admitted to the hospital because of sudden onset of massive anal bleeding. He was in shock state. Superior mesenteric angiography revealed a tumor like stain next to the small intestine. Arterial CT enhanced the tumor hyperdensity, and detected air within the tumor. A laparotomy was done, and a saciform tumor 8 cm in diameter was growing out of the jejunum's mesenteric side was found. Partial resection of the small intestine was carried out. Gastric mucosa spreaded with the entire lumen of the tumor. The lumen of the tumor communicated with the small intestine's via an opening 12 × 13 mm in diameter. The muscle layer of the tumor wall continued to the small intestine's. UI-III ulcer 15 mm in length was found on mucosa of the small intestine beside the opening. We think that the ulcer was the bleeding site. The patient was diagnosed as having duplication of the small intestine with ectopic gastric mucosa. The superiority of angiography in detecting a small bowel lesion with ectopic gastric mucosa was demonstrated. An angiography is effective to detect the small intestinal tumor having the gastric mucosa.