症 例

持続的外来腹膜透析中に生じた *Aeromonas hydrophila* 敗血症の1例

東海大学第2外科

徳 永 信 弘 貞 廣 莊太郎 安 田 聖 栄 西 隆 之
木 村 富 彦 中 崎 久 雄 田 島 知 郎 三 富 利 夫

Aeromonas hydrophila は免疫能の低下した患者に敗血症を引き起こす比較的稀な原因菌として知られている。持続的外来腹膜透析 (CAPD) 中の患者に *Aeromonas hydrophila* 敗血症を来した1例を経験したので報告する。

症例は多嚢胞腎による慢性腎不全のため CAPD を行っていた50歳の男性で右上腕部痛を主訴に来院した。右上腕には有痛性の紅斑の中に黒い壊死がみられる皮疹が認められた。経過と共に皮疹は右前胸部にまで拡がり来院24時間後に死亡した。剖検所見では右上腕から前胸部、両側下肢の皮膚、軟部組織および筋肉に高度の浮腫、出血、壊死がみられ、多臓器に微小膿瘍および菌塊の形成が認められた。同様な経過の症例は本邦において5例報告されており、肝硬変、腎不全、悪性腫瘍など免疫能の低下する患者に急激に増悪する軟部組織感染症をみた場合には、本症を考慮する必要があると思われた。

索引用語: *Aeromonas hydrophila*, 敗血症, 持続的外来腹膜透析

はじめに

Aeromonas hydrophila は肝硬変、腎不全、悪性腫瘍など免疫能の低下した患者に敗血症を引き起こす比較的稀な原因菌として知られている。持続的外来腹膜透析 (CAPD) 中の患者に軟部組織の広範な浮腫、出血、壊死を来した *Aeromonas hydrophila* 敗血症の1例を経験したので報告する。

症 例

患者: 50歳, 男性。

主訴: 右上腕部痛。

既往歴: 1981年多嚢胞腎が指摘された。1985年多嚢胞腎のための腎機能障害により慢性腎不全と診断され、1987年 CAPD が導入された。

家族歴: 特記すべき事なし。

現病歴: 1992年8月14日に右上腕部痛を自覚するが自制範囲内の痛みであったため放置していた。翌8月15日、右上腕部の痛みが増悪し右手首にしびれを感じた。さらに右肘内側に皮疹が出現し右上腕が腫脹したため8月16日午前1時当院を受診し右上腕の壊死性筋膜炎の診断で緊急入院となった。

入院時現症: 身長163.7cm, 体重55.4kg, 体温

図1 右肘の皮疹: 紅斑の中に黒い壊死中心がみられる。

35.8°C, 血圧108/60mmHg (左上肢で測定), 脈搏数100/分整。眼瞼結膜に貧血を認めず。眼球結膜に黄疸を認めず。表在リンパ節触知せず。心, 肺に異常所見認めず。肝を触知せず。

右肘内側に有痛性の紅斑が認められ, この中心には悪い壊死がみられた(図1)。右上腕に著明な腫脹を認めたが, 右前腕には腫脹は認められなかった。また右上腕に握雪感はなかった。

入院時検査所見: 表1

1996年6月7日受付 1996年10月21日採用

表1 入院時検査成績

	正常値	
WBC (/mm ³)	(4,000-8000)	27,900
RBC (×10 ⁴ /mm ³)	(410-530)	494
Hb (g/dl)	(13.5-17.5)	14.3
Ht (%)	(40-48)	42.9
Plt (×10 ⁴ /mm ³)	(14-40)	14.0
<hr/>		
Glu (mg/dl)	(70-110)	57
BUN (mg/dl)	(8.7-20.6)	55
Cre (mg/dl)	(0.7-1.1)	11.2
GOT (U/L)	(11-29)	417
GPT (U/L)	(9-37)	342
AMY (U/L)	(41-125)	70
CPK (U/L)	(48-187)	3622
Na (mEq/l)	(136-144)	138
K (mEq/l)	(3.4-4.8)	4.3
Cl (mEq/l)	(99-109)	94
Ca (mEq/l)	(4.3-5.0)	5.1

表2 術後の100%酸素条件下の血液ガス

FiO ₂	1.0
pH	7.43
PCO ₂ (mmHg)	35.1
PO ₂ (mmHg)	80.0
BE (mmol/l)	+0.3
HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	23.5

入院後経過：Pentazocine 30mg を静注したにもかかわらず右上腕部の痛みは軽減せず、右肘内側の皮疹の範囲は時間の経過とともに急速に広がった。両上肢および両下肢の血圧測定では右上肢に有意な血圧の低下はなかった（右上腕116mmHg, 左上腕128mmHg, 右足背140mmHg, 左足背120mmHg）。単純X線写真上右上肢にガス像は認められなかった。抗生剤（PCG 2,400万単位, IPM/CS 2g 1日量）の投与を開始したが右上腕の腫脹が増悪したため、入院してから6時間後の8月16日午前7時全身麻酔下に筋膜切開術を施行した。

術中所見：右肘部を弧状に切開した。同部の皮下組織および上腕二頭筋は壊死に陥っていた。

術後経過：術後呼吸状態は悪化し100%酸素の呼吸条件下でもPO₂は80mmHgであった（表2）。また、両膝部にも右肘部にみられたものと同じ皮疹が出現しているのが認められた。右上腕および両下肢の皮疹の範囲は拡大し、術後2時間経過した同日午前10時頃より次第に血圧が低下し始め、代謝性のアシドーシスが増悪した。術後15時間後の同日午後11時頃には血小板が2.6万にまで低下、右上腕の創部より出血が見られるようになり、来院24時間後の8月17日午前1時50分死亡した。

剖検所見：右上腕から前胸部、両側下肢の皮膚・軟部組織および筋肉に高度の浮腫・出血・壊死が認めら

図2 右上腕二頭筋部の病理組織学的所見：グラム陰性桿菌の菌塊を認める（↑部）（H.E. 染色, ×720）。

れた。これらの部位では、比較的炎症細胞浸潤は乏しく、壊死組織中にグラム陰性桿菌を散見した（図2）。また、肝、腎、前立腺、直腸、睪丸においては微小膿瘍の形成が認められた。術前採血した動脈血および術中採取した皮膚、筋肉の培養から *Aeromonas hydrophila* が同定された。

考 察

Aeromonas hydrophila は水系の常在菌で自然環境に広範囲に分布しており下痢の原因菌として知られている^{1)~3)}。グラム陰性、通性嫌気性桿菌に分類され、ビブリオ菌属と類似の生化学的性状を有するが、発育に食塩を必要としない点が異なる⁴⁾。この菌はまた腸管外感染症として肝硬変患者、腎不全患者、悪性腫瘍患者などの免疫能の低下した患者にときに敗血症を引き起こすことが報告されている^{5)~8)}。感染経路については明らかでない場合が多いが、腸管の微細病変、あるいは気にも止めないような小さな外傷が経路として考えられている。CAPD 施行中の患者では腹膜炎からの *Aeromonas hydrophila* 敗血症も報告されているが⁹⁾、本例においては感染経路は明らかでなかった。

理学所見上皮膚に *Aeromonas hydrophila* の外毒素によるとされる壊疽性膿瘍がみられることが本症の特徴であり¹⁰⁾、本例でも入院時より有痛性の紅斑の中に黒い壊死中心がみられる皮疹が右上肢にみられた。

Aeromonas hydrophila の抗生剤に対する感受性は、アミノグリコシド系抗生剤、第3世代のセファロsporin、クロラムフェニコール、テトラサイクリン系抗生剤に高く、ペニシリン系抗生剤に低い¹¹⁾¹²⁾と報告されている。このため、ペニシリン系抗生剤が有効であるグラム陽性菌による壊死性筋膜炎や嫌気性感染

表3 急激な経過をとった *Aeromonas hydrophila* 敗血症報告例

報告者	性,年齢	基礎疾患	入院から死亡までの時間
藤井 卓	M,55	肝硬変	24hr
坂巻宏行	M,60	肝硬変	72hr
田辺 潤	M,66	肝硬変	37hr
田辺 潤	M,59	急性骨髄性白血病	10hr
徳永信弘	M,50	腎不全	24hr

症との鑑別が重要となる。本例では当初壊死性筋膜炎を疑ったためペニシリンが投与されていた。

本症の予後は不良であり Davis は57%の死亡率を報告している¹³⁾。本症のなかには急激な経過をとるものがあり、本邦でも発病後48時間以内に死亡した5例が報告されている^{14)~17)}(表3)。いずれも本例と同様肝硬変、腎不全、悪性腫瘍などの基礎疾患を有し、筋肉の壊死を伴う軟部組織感染症として発症していた。

結 語

CAPD 中の患者に生じた *Aeromonas hydrophila* 敗血症の1例を報告した。肝硬変患者、腎不全患者、悪性腫瘍患者などの免疫能の低下した患者の皮膚に壊疽性膿瘍をみた場合、本症を考慮し、グラム染色を行い適切な抗生剤を選択することが重要である。

稿を終えるにあたり、病理診断に際し御指導を頂いた東海大学病理学教室の梅村しのぶ先生に深謝致します。

文 献

- 1) Nishikawa Y, Kishi T: Isolation and characterization of motile *Aeromonas* from human food and environmental specimens. *Epidem Infect* 101: 213—223, 1988
- 2) Holmberg SD, Schell WL, Fanning GR, et al: *Aeromonas* intestinal infections in the United States. *Ann Intern Med* 105: 683—689, 1986
- 3) Echeverria P, Sack RB, Blacklow NR, et al: Prophylactic doxycycline for traveler's diarrhea in Thailand: Further supportive evidence of *Aeromonas hydrophila* as an enteric pathogen. *Am J Epidemiol* 120: 912—921, 1984
- 4) Sakazaki R, Shimada T: O-serogrouping scheme for mesophilic *Aeromonas* strains. *Jpn J Med Sci Biol* 37: 247—255, 1984
- 5) Hariss RL, Fainstein V, Linda E, et al: Bacteremia caused by *Aeromonas* species in

hospitalized cancer patients. *Rev Infect Dis* 7: 314—320, 1985

- 6) Cordingley FT, Rajanayagam A: *Aeromonas hydrophila* bacteremia in haematological patients. *Med J Aust* 1: 364—365, 1981
- 7) Wolff RL, Wiseman SL, Kitchens CS, et al: *Aeromonas hydrophila* bacteremia in ambulatory immunocompromised hosts. *Am J Med* 68: 238—242, 1980
- 8) Ramsay AM, Rosenbaum BJ, Yarbrough CL, et al: *Aeromonas hydrophila* sepsis in a patient undergoing hemodialysis therapy. *JAMA* 239: 128—129, 1978
- 9) Munoz P, Fernandez-Baca V, Palaez T, et al: *Aeromonas peritonitis*. *Clin Infect Dis* 18: 32—37, 1994
- 10) Shackelford PG, Ratazan SA, Shearer WT: Ecthyma gangrenosum produced by *Aeromonas hydrophila*. *J Pediatr* 83: 100—101, 1973
- 11) Fass RJ, Barnishan J: In vitro susceptibilities of *Aeromonas hydrophila* to 32 antimicrobial agents. *Antimicrob Agents Chemother* 19: 357—358, 1981
- 12) Fainstein V, Weaver S, Bodey GP, et al: In vitro susceptibilities of *Aeromonas hydrophila* against new antibiotics. *Antimicrob Agents Chemother* 22: 513—514, 1982
- 13) Davis WA, Kane JG, Garagusi VF: Human *Aeromonas* infections. A review of the literature and a case report of endocarditis. *Medicine (Baltimore)* 57: 267—277, 1978
- 14) 藤井 卓, 高木正剛, 山内秀人他: 上肢静脈血栓様症状で発症した劇症 *Aeromonas hydrophila* 敗血症の1例. *日救急医学会誌* 2: 933—938, 1991
- 15) 坂巻宏行, 荒木長太郎, 菅村洋治他: 急激な経過をとった *Aeromonas hydrophila* 感染症の1例. *感染症誌* 66: 809, 1992
- 16) 田辺 潤, 松島敏春: ガス産生筋肉壊死を伴った *Aeromonas hydrophila* 敗血症の2例. *感染症誌* 61: 1010, 1987
- 17) 垣内秀樹, 日野田裕治, 山根美雪他: 全身性のガス形成と血管内溶血を呈した *Aeromonas hydrophila* 敗血症の1例. *日内会誌* 76: 1701—1705, 1987

AEROMONAS HYDROPHILA SEPTICEMIA IN A PATIENT UNDERGOING
CHRONIC AMBULATORY PERITONEAL DIALYSISNobuhiro TOKUNAGA, Sotaro SADAHIRO, Seiei YASUDA, Takashi NISHI,
Tomihiko KIMURA, Hisao NAKAZAKI, Tomoo TAJIMA
and Toshio MITOMI

Second Department of Surgery, Tokai University School of Medicine

Aeromonas Hydrophila has been occasionally reported as a cause of extraintestinal infection in immunocompromised patients. We report a case of *aeromonas hydrophila* septicemia in a patient undergoing chronic ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).

A 50-year-old man undergoing CAPD for chronic renal failure due to polycystic kidney was admitted to the hospital because of a pain of the right upper limb. Erythematous painful lesions with dark necrotic center were seen in his right upper limb. Laboratory studies revealed a white blood cell count of 27,900/mm³. The hematocrit value was 42.9 percent. Platelets were counted at 140,000/mm³. In the hours after admission hemorrhagic blisters in the lower limbs were noted. He died of septic shock 24 hours after admission. *Aeromonas hydrophila* was isolated from blood and cutaneous lesions. At necropsy there were severe edema, hemorrhage, and necrosis in the skin, soft parts, and muscle ranging from the right upper limb to the anterior thoracic region, and bilateral lower limbs. Microabscesses and bacterial mass were observed in many organs. So far five cases presenting similar clinical course have been reported in Japan. When a rapidly progressing infection of the soft parts occurs in immunocompromised patients with cirrhosis, renal failure, or malignant tumor, a probable diagnosis of the disease should be entertained.