症 例

脱気水注腸 CT が診断に有用であった横行結腸脂肪腫の 1 例

名古屋第二赤十字病院外科

谷 合 央 長谷川 洋 小木曾 清 二
平 松 和 洋 村 田 透 長 澤 圭 一

診断技術の進歩とくに内視鏡検査、超音波内視鏡検査などの進歩によって大腸の粘膜下腫瘍の診断は容易となってきており、近年報告例が増加している。一方、CT は大腸粘膜下病変の描出には比較的不向きであるとされている。結腸内に脱気水を満たして CT をとること（以下注水 CT）によって横行結腸の粘膜下に発生した腫瘍を容易に描出し、CT 値を計測することによって脂肪腫と診断が可能であった症例を経験した。CT は客観的な画像を得ることのできる侵襲の少ない検査であり、注水 CT は大腸粘膜下病変の診断に有用な検査であると思われる。

索引用語：大腸脂肪腫，CT，water-enema 法

緒 言

大腸脂肪腫は比較的稀な疾患であるが、近年大腸内視鏡的切除例や超音波内視鏡による診断報告などで報告例が散見される。今回われわれは、脱気水を注腸の後の CT によって存在診断・質的診断が可能となった症例を経験したので報告する。

症 例

患者：58歳，女性。

主訴：便潜血陽性。

家族歴・既往歴：特記すべきことなし。

現病歴：平成4年8月健診にて便潜血を指摘され、近医にて注腸検査を施行し、当院へ紹介された。

入院時現症：身長157cm，体重52.5kg，血圧120/80 mmHg。

入院時検査成績：血液一般，生化学検査，腫瘍マーカー，血清学的検査などには異常は認めなかった。

注腸造影検査：圧迫像で横行結腸のほぼ中央に直径約45mmの表面平滑な隆起性病変を認めた（図1）。

大腸内視鏡検査：直径40mmの正常粘膜で覆われた，bridging foldを伴った腫瘤を認めた。鉗子で圧迫すると弾性は軟で，cushion signは陽性であった。粘膜の生検では異常所見は認めなかった（図2）。

大腸超音波内視鏡検査：腫瘍は第3層に位置し高エコーを呈していた。第4層以深は腫瘍によると思われる

図1 注腸検査
横行結腸に隆起性病変を認めた（→）。

る減衰のため明らかではなかった（図3）。

CT検査：通常のCT像では横行結腸の腫瘍は描出できなかったため，絶食により前処置をはかり，CTの撮影直前に脱気水1,000mlを注腸して撮影した。脱気水で内腔が占められた脾彎曲部近傍の横行結腸に20×24mmの腫瘍を認めた。腫瘍のCT値は-103HUで脂肪成分と診断した（図4）。

以上より横行結腸の粘膜下に存在する脂肪腫と診断した。広基性のため内視鏡的切除は困難と考え，開腹横行結腸部分切除術を施行した。

術中所見：横行結腸のほぼ中央の腸間膜附着部対側に漿膜面から黄色調に透見できる腫瘍を認めた。同部

図 2 大腸内視鏡検査
横行結腸に bridging fold を伴った腫瘤を認めた。
cushion sign は陽性であった。

図 3 大腸超音波内視鏡検査
第 3 層に high echoic mass を認めた (→)。

位の切除を行った。

摘出標本：腫瘍は広基性で、大きさは $34 \times 28 \times 25$ mm, 表面は正常粘膜に覆われており、その頂部には浅い陥凹を認めた。弾性は軟で、圧迫により容易に変形した。断面は黄色調で粘膜下層に局限していた。浸水超音波検査では超音波内視鏡検査と同様に第 3 層に高エコーな腫瘤として認められた (図 5)。

病理組織像：粘膜下層に局限した腫瘍で成熟した脂肪細胞で構成されており、異型性は認めなかった。肉眼所見で認められた頂部の陥凹は、物理的な接触による糜爛のみで粘膜には悪性所見を認めなかった (図

図 4 腹部 CT 検査 (注水後 CT)
A: 空気, W: 水, T: 腫瘍を表している。

図 5 切除標本
a: 断面, b: 浸水超音波検査像
 $\frac{a}{b}$

6)。

以上より横行結腸粘膜下層に発生した脂肪腫と診断した。

考 察

消化管脂肪腫は比較的稀な疾患であり、Mayo らは

図6 ルーペ像

粘膜下層に局限した脂肪腫を認めた。

消化管良性腫瘍手術症例の約4%にあたり、その4分の3が大腸脂肪腫であったと報告している¹⁾。最近では画像診断の進歩とく到大腸内視鏡や超音波内視鏡検査の普及とともに報告例が増加している。

症状は腹痛、便通異常が多く、本症例のように脂肪腫の表面にびらんや潰瘍を形成して下血を来す症例もあるが、無症状であることが多い。合併症として腸重積の合併が高率に起こると報告されているが²⁾³⁾、近年では腸重積の合併しない脂肪腫の報告が増加し、山本らは合併率22.3%と報告している⁴⁾。

大腸脂肪腫の術前診断は、これまで困難とされていたが、近年内視鏡検査や超音波内視鏡検査の普及とともに容易になってきている。今回集計した181例中術前診断が可能であった症例は、45例であり診断根拠となった検査は、内視鏡が19例、CTが16例、注腸が6例、超音波検査が3例、生検が2例、超音波内視鏡が2例であった（内3例は重複）。

内視鏡検査では粘膜下腫瘍の所見（bridging fold など）や脂肪腫の軟らかさを反映した cushion sign、粘膜と腫瘍の間の層のずれを利用した tenting sign, sliding sensation などが決め手となり、超音波内視鏡が可能ならば第3層（粘膜下層）の highechoic mass で脂肪組織の存在が診断できる。

また、CT 検査は患者の苦痛が少なく、内視鏡検査や超音波内視鏡に比べて術者の技量に左右されない客観的な画像が得られる有用な検査であり、CT で術前診断し得た大腸脂肪腫も報告されている^{4)~6)}。本症例の横行結腸のように移動性の高い臓器に腫瘍が存在する場合や腫瘍が小さい場合には的確に描出することが難しい場合があり、何らかの工夫が必要と考えた。鈴木らは水と脂肪のコントラストの違いを利用した

water-enema 法が有用と報告しており⁷⁾、山本らも同様の微温湯注腸による CT 検査で術前診断が可能であった症例を報告している⁴⁾。われわれの症例も通常の CT では脂肪腫の存在診断・質的診断が不可能であったが、脱気水注腸後 CT により腫瘍の位置診断と CT 値による質的診断が可能となった。

今回の症例は、広基性であったため内視鏡的切除は不可能であったが、脂肪腫は良性腫瘍であり、粘膜下に局限していることから内視鏡的切除の適応となる。また、内視鏡的切除が不可能な場合でも、近年発達した腹腔鏡下手術などで局所切除するなど余分な侵襲は避けるべきである。しかし、そのためには内視鏡検査、超音波内視鏡検査、CT などで正確な術前診断によって悪性腫瘍を除外することが必要である。注水 CT は比較的容易に、特殊な設備を必要とせずに施行でき、患者の苦痛も少なく、客観的な画像を得ることのできる術前診断に有用な検査であると思われる。

結 語

われわれは、注水 CT で術前診断し、切除した横行結腸脂肪腫の1例を経験したので若干の文献的考察を加え報告した。

文 献

- 1) Mayo CW, Pagtalunan RJG, Brown DJ: Lipoma of the alimentary tract. Surgery 53: 598—603, 1963
- 2) 饗場末年, 大西雄太郎, 小西雅宣他: 下行結腸脂肪腫の1例—本邦大腸脂肪腫119例の検討—. 外科診療 27: 250—254, 1985
- 3) 庄司宗弘, 松本孝一, 津泰健治他: 結腸重積症を来した脂肪腫の2例. 日本大腸肛門病会誌 33: 488—493, 1980
- 4) 山本 均, 伊藤真悟, 内田 潔他: 大腸脂肪腫の診断—自験例を含む170例の検討から—. 静岡済生会病医誌 7: 43—49, 1989
- 5) 出口浩之, 関本健一, 深野 茂他: 診断に CT が有効であった横行結腸脂肪腫. 臨外 45: 1025—1028, 1990
- 6) 長友優尚, 杜若陽祐, 高橋二郎他: CT により診断された大腸脂肪腫の1例. Clinical Imagiology 6: 102—104, 1990
- 7) 鈴木 昇, 渡辺 晃, 後藤由夫: 大腸脂肪腫の3例—とくに water-enema 法について. 胃と腸 14: 1249—1254, 1979

A CASE OF LIPOMA OF THE TRANSVERSE COLON DIAGNOSED BY
CT AFTER FILLING WITH WATER

Hisashi TANIAI, Hiroshi HASEGAWA, Seiji OGISO, Kazuhiro HIRAMATSU,
Tohru MURATA and Keiichi NAGASAWA

Department of Surgery, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Colonoscopy and endoscopic ultrasonography have improved the diagnosis of submucosal tumors of the large intestine. Nowadays their importance in the diagnosis of such tumors is often stated, whereas it is said to be difficult to diagnose a submucosal tumor by computed tomography (CT). We have demonstrated with existence and content of a submucosal tumor of the transverse colon by CT after filling the transverse colon with warm water. A CT scan can give us an objective image without the patient's pain, so we may say this is a beneficial examination.