症 例

胃体部大彎の微小病変から進展したと考えられる 進行スキルス胃癌の1例

防府消化器病センター，九州大学第2病理*

松 崎 圭 祐 三 浦 修 川 野 豊 一 戸 田 智 博
南 園 義 一 長 崎 進 西 原 一 善*

症例は52歳男性。主訴は嘔気。平成4年末より食後の嘔気が持続するために平成5年1月18日，受診した。胃透視にて胃体部大彎の皺襞異常を認め，内視鏡検査を施行。胃体部大彎を中心に皺襞の腫大と発赤を認めたのみで2度の生検でも確定診断が得られなかった。透視，内視鏡所見より強くスキルス胃癌を疑い手術を施行するも，既に明らかな漿膜浸潤を認め，癌性腹膜炎にて13ヵ月後に死亡した。摘出標本では体上部大彎の皺襞間に直径2mm大の微小潰瘍性病変を認めた。病理組織学的検索では低分化腺癌が粘膜面に露出しているのは微小潰瘍の潰瘍底のみで，体上部から胃角のほぼ全周にわたりsm～ss，一部seに広範な浸潤を認め，同部位が初発巣と診断された。スキルス胃癌はその好発部位，発育・浸潤形態の特殊性より早期診断が困難とされている。特に体部大彎発生例の早期確定診断には皺襞間の微小潰瘍性病変の有無を内視鏡にて慎重に検索することが重要と考えられた。

索引用語：スキルス胃癌，微小病変，早期診断

緒 言

スキルス胃癌は早期診断が困難で，進行胃癌の形で発見されることが多い。今回われわれは術前確定診断を得ることができず，摘出標本の病理組織学的検索にて胃体部大彎の直径2mmの微小潰瘍性病変から進展したと考えられた進行スキルス胃癌の1例を経験したので報告する。

症 例

患者：52歳，男性。

主訴：嘔気。

既往歴，家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：平成4年末より食後の嘔気が持続するために平成5年1月18日，当センター受診。胃透視にて胃体部大彎の皺襞異常を認め，胃内視鏡検査を施行。胃体部大彎を中心に皺襞の腫大と強い発赤を認めたが，生検による病理組織診断では悪性所見を認めず，1月27日，精査目的で入院となった。

入院時現症：意識清明で体格，栄養ともに良好。脈拍66/分，整で血圧110～60mmHg，体温36.6度，貧血，

黄疸を認めない。腹部は平坦，軟で腫瘤を触知しなかった。

入院時血液生化学検査：貧血なく，軽度の肝機能異常と電解質異常を認めた。腫瘍マーカーには異常を認めなかった（表1）。

胃透視検査：胃体上部大彎の皺襞異常を認めた。皺襞伸展性は保たれており，明らかなニッシェ様病変を認めなかった（図1）。

表1 入院時血液生化学検査

WBC	3,400/mm ³	CHE	70 IU/l
RBC	392×10 ⁴ /mm ³	LDH	314 IU/l
Hb	12.1 g/dl	T-AMY	57 IU/l
Ht	34.9 %	B-Glu	70 mg/dl
Plt	15.5×10 ⁴ /mm ³	BUN	12.7 mg/dl
TP	6.3 g/dl	CRN	0.7 mg/dl
Alb	3.8 g/dl	UA	2.5 mg/dl
T-Bil	1.1 mg/dl	Na	127 mEq/l
T-cho	127 mg/dl	K	4.5 mEq/l
Alp	74 IU/l	Cl	94 mEq/l
GOT	79 IU/l	AFP	3.8 ng/ml
GPT	96 IU/l	CEA	1.3 ng/ml
γ-GTP	96 IU/l	CA19-9	35 U/ml

1996年12月4日受付 1997年4月8日採用

図1 胃透視検査：胃体上部大彎の皺襞異常を認めた。

図2 胃内視鏡検査：胃体部大彎を中心に広範な皺襞の腫大と強い発赤を認めた。

胃内視鏡検査：胃体部大彎を中心に広範な皺襞の腫大と強い発赤を認めたが、明らかな潰瘍性病変はみられなかった(図2)。2度の内視鏡検査にて施行された生検の病理組織診断はいずれも Group I で、悪性所見は認められなかった。

手術所見・術後経過：2度の胃内視鏡による生検でも確定診断が得られなかったが、透視、内視鏡所見よ

図3 切除標本肉眼所見：胃体上部大彎の皺襞間に直径2mm 大の微小潰瘍性病変(矢印)を認めた。点線は粘膜下織以深に癌細胞の浸潤を認めた範囲を示す。

り強くスキルス胃癌を疑い、本人の同意が得られたため2月10日に手術を施行した。開腹すると明らかな漿膜浸潤と横行結腸に小結節を認め、迅速病理にて癌転移と診断された。胃全摘＋脾体尾部・脾合併切除術とD₂リンパ節郭清¹⁾を施行し術後化学療法を行うも、癌性腹膜炎にて13ヵ月後に死亡した。

切除標本肉眼所見：胃体部を中心として皺の肥厚と硬化、皺の腫大が目立ち、体上部大彎の皺襞間に直径2mm 大の微小潰瘍性病変を認めた(図3)。胃粘膜面には他に明らかな病変を認めなかった。

病理組織検査所見：切除胃をほぼ全割して腫瘍細胞の粘膜面、粘膜下織以下への浸潤を検索した。signet-ring cell を混じた低分化腺癌が体上部大彎の微小潰瘍の潰瘍底のみで粘膜面に露出している一方、体上部から胃角部のほぼ全周にわたって粘膜下織から漿膜下織まで、一部漿膜に及ぶ広範な浸潤を認めた。以上の所見より、この微小潰瘍が初発巣であり、粘膜面には広がらずに粘膜下織以深に連続性に浸潤増殖したものと診断された(図4、5、6、7)。

考 察

近年の内視鏡検査の進歩にはめざましいものがあり、胃癌の早期診断法は既に確立された感がある。しかし、一方でその好発部位、発育・浸潤形態の特殊性より早期診断が困難で、発見された時点では極めて予後不良な一群の胃癌があり、スキルス胃癌あるいは Linitis plastica 型胃癌と呼ばれている。今回われわれの経験したスキルス胃癌も2度の内視鏡による生検にても術前確定診断は得られず、開腹時には既に腹膜播

図4 病理組織所見 (HE 染色, ×10): 微小潰瘍の潰瘍底のみに癌組織の粘膜面への露出を認めた。

図5 病理組織所見 (HE 染色, ×100): 潰瘍底には signet-ring cell を混じた低分化腺癌の浸潤・増殖を認めた。

種を併発しており、術後13ヵ月後に癌性腹膜炎にて死亡した。完成された典型的なスキルス胃癌はX線上、著明な変形 (leather bottle 状) と嚢硬化像、特異な悪性レリーフ像等を示し、その診断は容易である²⁾。しかしこのような症例では既に広範な浸潤を伴っており、その予後は極めて不良である。

スキルス胃癌は臨床症状が乏しく、若年女性に多い²⁾ことから一般に進行が早いとされている。川井等³⁾や渡辺等⁴⁾は長期間の逆追跡が可能なスキルス胃癌の検討から、最終段階である胃壁の硬化のみが短時間で完成するのであって、癌の発生からスキルス胃癌として認識される迄の期間は短くないと報告している。中村⁵⁾も病理組織学的解析によるスキルス胃癌の自然史の検討より癌発生から完成までの経過時間は6～8年と報告していることより、決して早期発見の時間的余裕がないわけではないと考えられる。

図6 病理組織所見 (HE 染色, ×25): 腫瘍細胞は結合組織の強い増生を伴って粘膜下組織深層から固有筋層へ連続的に浸潤・増殖していた。

図7 病理組織所見 (HE 染色, ×50): 腫瘍細胞は固有筋層からさらに漿膜下組織にまで、一部漿膜に及ぶ広範な浸潤・増殖を認めた。

それではいかにすればスキルス胃癌の早期発見が可能であろうか。それにはスキルス胃癌の癌発生からの発育過程ならびにその初期像を知ることが不可欠である。中村⁵⁾は胃底腺粘膜から発生した未分化型癌が、その粘膜内癌（原発巣）の潰瘍化に先行して癌の粘膜下組織浸潤が生じたときにスキルス胃癌に進展している、その際の原因の大きさは2cm 以下の場合が多いと述べている。スキルス胃癌の初期像に関しては他にも諸家の報告があるが、いずれも皺襞集中の乏しいIIc型早期胃癌を初期の病変としている⁶⁾⁷⁾。

以上よりスキルス胃癌の早期発見にはスキルス胃癌の形態を示していない初期病変、すなわち胃体部において潰瘍化あるいは皺襞集中のない小IIc病変の発見に全力を尽くすことが必要で、それによりスキルス胃癌の芽を摘むことが可能になるとともに救命につながるものと考えられる。

本症例は既に漿膜浸潤を伴う進行胃癌であり、スキルス胃癌を強く疑って2度の内視鏡検査を行いながら、腫大した皺襞間に存在する直径2mm 大の原発巣病変を発見し得ず、大いに反省させられた症例であった。特に体部大彎の皺襞腫大やびらんを伴った症例ではまずスキルス胃癌を念頭におくことが重要であり、さらに粘液や唾液などを十分に除去した上で皺襞間の微小潰瘍性病変の有無を慎重に検索する努力が必要と感じられた。病理所見より本症例の術前確定診断には

Strip Biopsy による粘膜下層の検索や超音波内視鏡の併用が有用と考えられた。

おわりに

今回われわれは術前確定診断を得ることができず、摘出標本の病理組織学的検索にて胃体部大彎の直径2 mm の微小潰瘍性病変から進展したと考えられた進行スキルス胃癌の1例を経験し、内視鏡検査の際の心構えを再認識させられたので、若干の文献的考察を加え報告した。

なお本論文の要旨は第58回日本臨床外科医学会総会（平成8年10月、京都）にて発表した。

文 献

- 1) 胃癌研究会：胃癌取り扱い規約（改訂第12版）、金原出版、東京、1993
- 2) 西澤 護、細井董三、岡田利邦：診断医からみたスキルス胃癌の早期像。臨外 48：1505—1511, 1993
- 3) 川井啓市：胃硬性癌の早期診断。臨科学 7：1078—1083, 1971
- 4) 渡辺栄伸、八尾恒良：Linitis plastica 型胃癌の病理組織学的研究。胃と腸 11：1285—1296, 1976
- 5) 中村恭一：「スキルス胃癌」の病理とその自然史。消外 7：405—412, 1984
- 6) 群 大裕、竹田 一、川井啓市：胃スキルスの臨床的ならびに病理組織学的考察。胃と腸 11：1327—1335, 1976
- 7) 岩永 剛、熊野健彦：臨床病理学的特徴よりみたスキルス胃癌の初期病型。日臨 30：1568—1574, 1972

A CASE OF SCIRRHUS CARCINOMA OF THE STOMACH PROBABLY DEVELOPED FROM A MINUTE LESION IN THE BODY ON THE GREATER CURVATURE

Keisuke MATSUSAKI, Osamu MIURA, Toyokazu KAWANO, Tomohiro TODA, Yoshikazu MINAMISONO, Susumu NAGASAKI and Kazuyoshi NISHIHARA*

Hofu Institute of Gastroenterology

*Second Department of Pathology, Faculty of Medicine, Kyushu University

A 52-year-old man was seen at the hospital because of nausea after meals lasting for about 19 days. Fluoroscopic examination of the stomach showed abnormal folds in the body on the greater curvature. The definite diagnosis could not be achieved even by biopsies performed two times. With both fluoroscopic and endoscopic findings strongly suggesting scirrhous carcinoma of the stomach, an operation was carried out, which disclosed that marked infiltration into the serosa had already occurred. The patient died of carcinomatous peritonitis after 13 months. Excised specimens revealed minute ulcer lesions 2 mm in diameter between the gastric folds in the upper body on the greater curvature. A histopathological examination showed that a poorly differentiated adenocarcinoma exposed on the mucosal surface involved only the bottom of the minute ulcer, with extensive invasion into sm to ss, and partly into se, covering almost whole-circumferentially from the upper body to angular notch of the stomach. The site was diagnosed as the primary focus. Early diagnosis of scirrhous gastric carcinoma is considered difficult because of the common site and characteristics of growth and infiltration patterns. It is thought that careful endoscopic search for minute ulcer lesions between the gastric folds is important to make an early definitive diagnosis, particularly in cases involving the gastric body on the greater curvature.