原 著

乳癌患者血漿中 matrix metalloproteinase および tissue inhibitor of metalloproteinase の測定意義の検討

横浜市立大学第1外科, 横浜南共済病院外科*

永 野 篤 清 水 哲* 有 田 英 二* 富 田 康 彦*
松 川 博 史* 藤 沢 順* 稲 葉 将 陽 今 田 敏 夫

術前乳癌32症例を対象に、血漿中 MMP-1, 2, 3, 9 および TIMP-1, 2 を one step sandwich EIA 法にて測定し、その臨床的意義について健常女性50例の対照群と比較し検討した。両群の平均値の比較では、MMP-1, MMP-3は差がなかったが、MMP-2, MMP-9は乳癌群において低値であった ($p=0.0032$, $p=0.044$)。また、TIMP-1も乳癌群で有意に低値であった ($p<0.0001$)。そこで MMP と TIMP の量的バランスを反映すると考えられる、MMP の濃度合計を TIMP の濃度合計で除した MMPs/TIMPs 濃度比を算出し、両群を比較検討した結果、乳癌群は 0.857 ± 0.261 、健常群は 0.776 ± 0.182 で、乳癌群で有意に高値であった。さらに乳癌群の TIMP-1はリンパ管侵襲度に負の相関を示し、MMPs/TIMPs 濃度比はリンパ管侵襲度に正相関した。以上より乳癌患者の血漿において、TIMP-1および MMPs/TIMPs は乳癌のリンパ管侵襲度を反映する可能性が示唆された。

索引用語: breast cancer, MMP, TIMP, MMPs/TIMPs 濃度比

緒 言

近年、癌の浸潤・転移に matrix metalloproteinase (以下 MMP) の数種類のファミリーが関与することが証明されている¹⁾²⁾。また tissue inhibitor of metalloproteinase (以下 TIMP) は活性型 MMP に結合し不活化することによって、MMP の働きを特異的に阻害することが知られている³⁾。これまでに乳癌においても、MMP および TIMP の免疫組織化学染色や組織培養液中の定量が検討され、乳癌組織中では、TIMP-1が減少していると報告されているが⁴⁾、今回われわれは乳癌患者の血中 MMP および TIMP を測定し、その臨床的意義について検討した。

対象および方法

対象は1995年6月から12月までに、横浜南共済病院外科において、術前に血中 MMPs および TIMPs を測定した乳癌手術症例32例 (以下乳癌群) である。平均年齢は51歳で、TNM 分類の進行度は Stage I が19例、Stage II が10例、Stage IIIa が3例であった。コントロールは40歳から60歳の健常女性50例 (以下健常群)

とした。

測定項目は MMP-1, 2, 3, 9 および TIMP-1, 2 である。測定方法は、入院時に採取した血清を -40°C にて1ないし2日間保存した後に one step sandwich enzyme immuno-assay 法にて発色させ、吸光度より検量線を用いて血清濃度 (ng/ml) を求めた。ただし、MMP-9は血漿を検体とし、MMP-2および TIMP-1は測定感度の問題より、それぞれ10倍希釈、41倍希釈にて測定した。sample 量は MMP-1, 2, 9は $50\mu\text{l}$ 、MMP-3および TIMP-1は $20\mu\text{l}$ 、TIMP-2は $100\mu\text{l}$ である。吸光度の波長は MMP-1, 2, 9および TIMP-1は 492nm 、MMP-3および TIMP-2は 450nm である。また検体の sample decay の問題に関しては、各項目とも前実験の結果より -40°C では2年の保存安定性が確認されている。

検討方法としては、各測定項目の平均値を乳癌群と健常群の2群間で比較した。また乳癌群の MMPs は cut off 値以上を陽性、TIMPs は cut off 値以下を陽性とし、乳癌群の MMP-1, 2, 3, 9 および TIMP-1, 2 の陽性率をもとめた。さらに血漿中での MMP と TIMP のバランスを総合的に反映させるために、MMP-1, 2,

3, 9合計の総濃度を TIMP-1, 2合計の総濃度で除した MMPs/TIMPs 濃度比を算出し検討した。さらに MMPs, TIMPs の測定値と臨床病理所見との関連性について検討した。検討した病理組織学的因子は、腫瘍径、リンパ節転移度、組織型、リンパ管侵襲度、血管侵襲度、組織波及度、核異型度、Estrogen receptor の 8 項目である。

有意差検定は平均値の比較は Student-t 検定を用い、相関については、偏相関係数を求め、Bartlett の検定を行った。いずれの検定も $p < 0.05$ を有意差ありとした。

結 果

1) MMPs と TIMPs の平均値

乳癌群と健常群における MMP の平均値を比較すると、MMP-1 は $10.381 \pm 7.138 \text{ ng/ml}$, $8.904 \pm 5.440 \text{ ng/ml}$, MMP-2 は $490.594 \pm 112.463 \text{ ng/ml}$, $553.4 \pm 74.850 \text{ ng/ml}$, MMP-3 は $30.156 \pm 20.034 \text{ ng/ml}$, $35.850 \pm 16.786 \text{ ng/ml}$, MMP-9 は $28.367 \pm 17.507 \text{ ng/ml}$, $35.520 \pm 13.577 \text{ ng/ml}$ と、MMP-1 と MMP-3 は両

群間で差はなかったが、MMP-2 と MMP-9 は、乳癌群の方が健常群よりも有意に低値であった ($p = 0.0032$, $p = 0.044$) (Fig. 1)。一方、TIMP を比較すると、TIMP-1 は $144.125 \pm 23.699 \text{ ng/ml}$, $179.700 \pm 29.644 \text{ ng/ml}$, TIMP-2 は $65.594 \pm 15.965 \text{ ng/ml}$, $54.420 \pm 16.504 \text{ ng/ml}$ と、TIMP-1 は乳癌群が健常群よりも有意に低値であったが ($p < 0.0001$)、TIMP-2 は乳癌群が健常群よりも有意に高値であった ($p = 0.0033$) (Fig. 2)。

2) MMPs と TIMPs の cut off 値

健常群の測定値より算出設定した MMPs の上限値 (mean $\pm$ 2SD) は、MMP-1 : 19.7 ng/ml , MMP-2 : 703.1 ng/ml , MMP-3 : 69.4 ng/ml , MMP-9 : 62.6 ng/ml で、TIMPs の下限値 (mean - 2SD) は TIMP-1 : 120.4 ng/ml , TIMP-2 : 21.4 ng/ml であり、それらを cut off 値とした。また健常群の濃度比より算出した cut off 値 (mean $\pm$ 2SD) は 1.140 であった。

3) MMPs と TIMPs の陽性率

MMPs の陽性率をもとめると、MMP-1 : 12.9%,

Fig. 1 Comparison of plasma MMPs levels in two groups (patient group, control group)
p value: Student-t test

MMP-2:3.1%, MMP-3:3.1%, MMP-9:3.1%であった。TIMPsの陽性率は、TIMP-1は15.6%と高率であった。しかしTIMP-2は下限値以下を示すものはなかった (Table 1)。

4) MMPs/TIMPs濃度比

両群の濃度比を比較すると、乳癌群は 0.857 ± 0.261 、健常群は 0.776 ± 0.182 で、乳癌群が有意に高かった ($p=0.0342$) (Fig. 3)。乳癌群のうちMMPs/TIMPsが1.140以上を示した陽性症例の割合は20.7%であった。

5) MMP および TIMP と臨床病理学的因子の関連性

乳癌群のMMPsおよびTIMPsと臨床病理学的因子の関連は、MMPsとTIMP-2は諸因子と相関しなかったが、TIMP-1はリンパ管侵襲度と負の相関を示した ($p=0.047$)。またMMPs/TIMPs濃度比はリンパ管侵襲度と正の相関を示した ($p=0.048$) (Table 2)。

考 察

乳癌細胞が間質へ浸潤し、基底膜、血管壁およびリンパ管壁を破壊し脈管内に侵入し転移するためには、間質成分の細胞外マトリックスの構成成分であるコラーゲン、ラミニン、フィブロネクチンなどを分解しなければならない。その分解作用を担うのが細胞外マトリックス分解酵素つまりMMPである。現在MMPは少なくとも13種類のファミリーが同定されているが⁵⁾、MMP-1, 2, 3, 9は癌の浸潤・転移機構に関与すると考えられている。その中のMMP-1はI, II, III, IV, VII, X型コラーゲンを基質とし、間質線維を分解し、大腸癌や膀胱癌組織の浸潤先進部線維芽細胞で産生が亢進されているといわれている⁶⁾。またMMP-2, 9はゼラチン、プロテオグリカン、IV, V型コラーゲンを基質とし、血管基底膜を分解するといわれている^{7,8)}。MMP-3もプロテオグリカン、フィブロネクチン、II, IV, IX型コラーゲンを基質とし、間質および血管基底膜を分解するが、そればかりでなく、pro-

Fig. 2 Comparison of plasma TIMPs levels in two groups (patient group, control group)

p value: Student-t test

Table 1 Cut off values and positive rates of MMPs and TIMPs in patient group

	MMP-1	MMP-2	MMP-3	MMP-9	TIMP-1	TIMP-2
Cut off value(ng/ml)	19.7	703.1	69.4	62.6	120.4*	21.4*
Positive rate(%)	12.9	3.1	3.1	3.1	15.6	0

*lower limit

MMP-1, 2, 9を活性化する働きがある⁷⁹⁾。MMP は癌細胞だけではなく宿主細胞のマクロファージ、線維芽細胞、血管内皮細胞、さらに末梢血の好中球によっても産生・分泌される⁷⁾。分泌された MMP はすべて不活性型プロエンザイムであるが、プラスミンやカリクレインなどのセリンプロテアーゼあるいは同じファミリーである MMP-3によって活性化を受ける⁹⁾。これを不活化するのが TIMP であり、MMP の基質分解の働きを阻害し、癌の間質への浸潤、脈管浸潤を抑制するといわれている³¹⁾¹⁰⁾。TIMP ファミリーは現在 TIMP-1, 2, 3の3種類が同定されており、分子量がそれぞれ 28kD の糖蛋白, 21.6kD の蛋白, 21kD の蛋白の遺伝子がクローニングされている^{10)~12)}。TIMP-1と TIMP-2はそのアミノ酸配列の構造上、43%の相同性を有する

が、TIMP-1は間質コラゲナーゼである MMP-1を、TIMP-2はゼラチナーゼおよびIV型コラゲナーゼである MMP-2, 3, 9を比較的特異的に阻害するといわれている¹³⁾。よって今回は TIMP-1, 2のみを検討対象とし、TIMP-3は除外した。これまで、動物実験腫瘍やヒトの消化器癌を対象とした in situ hybridization による mRNA の検索や免疫組織化学染色、zymography を用いた酵素活性から MMP・TIMP の発現を評価した報告がある¹¹⁾²⁶⁾¹⁴⁾。そのなかでは転移性未分化型の大腸癌や肺癌組織において、mRNA レベルで MMP-2の高い発現が確かめられている⁶⁾。またヒト乳癌組織培養液の MMPs, TIMPs の定量に関する報告⁴⁾や高転移型乳癌細胞株をラットの乳房脂肪組織に移植すると、血漿中 MMP-9が上昇するという報告がみられる¹⁵⁾。しかしヒト乳癌の血漿中の複数の MMP, TIMP を系統的に測定し検討した報告がないことより、われわれは今回の検討を行った。

その結果、乳癌患者の末梢血において、MMP-1と MMP-3は健常人と差がなかったが、MMP-2と MMP-9は乳癌群で有意に低値であった。Zucker ら¹⁶⁾はヒト乳癌患者血漿中で MMP-9の有意な上昇が認められると報告しており、本検討と逆の結果を示している。しかし、その報告を背景因子別にみると、stage I 症例の MMP-9は control 群よりもむしろ低値で、stage II, III, IV 症例合計で有意な高値を示している。本検討の対象の多くが stage I であることを考慮すると、対象の進行度因子の構成分布の違いが結果の相違に反映したと考えられた。以上のことから、stage I, II の早期の乳癌症例においては、血中の MMPs は必ずしも増加しない可能性が考えられる。

今回の検討で、TIMP-1は乳癌群で低値を示したが、このことは岩田⁴⁾の同様の報告から考えると、乳癌の浸潤に対する宿主の防御反応としての TIMP-1の発現

Fig. 3 Comparison of plasma MMPs/TIMPs ratio in two groups (patient group, control group)

p value: Student-t test

Table 2 Correlation between MMPs, TIMPs and clinicopathological factors in patient group

Characteristics(grade)	MMP-1	MMP-2	MMP-3	MMP-9	TIMP-1	TIMP-2	MMPs/TIMPs
Tumor size (T1, T2, T3, T4)	—	—	—	—	—	—	—
Lymph node metastasis (n0, n1α, n1β, n2)	—	—	—	—	—	—	—
Histological type (pap, solid, sci, special)	—	—	—	—	—	—	—
Lymphatic invasion (ly0, ly1, ly2)	—	—	—	—	0.047	—	0.048
Vascular invasion (v0, v1, v2)	—	—	—	—	—	—	—
Infiltration (g, f, s)	—	—	—	—	—	—	—
Nuclear grade (grade 1, 2, 3)	—	—	—	—	—	—	—
Estrogen receptor (+, —)	—	—	—	—	—	—	—

p value: Bartlett' test n.s.: not significant

—: n.s.

が早期から低下していることが示唆された。逆に TIMP-2 が乳癌群で有意に高値であったことは奇異な結果で、その原因に関しては明らかではない。しかし、TIMP-2 の末梢血中の平均濃度は乳癌群、健常群ともに TIMP-1 の 1～3 % 程度で、測定の正確度に問題がある。この点については、Kleiner ら¹⁷⁾が TIMP-2 は proMMP-2 と複合体を形成しやすいので、測定感度条件の問題から結合型 TIMP-2 の測定ができず、測定可能な TIMP-2 の絶対量が減少するためであると報告している。以上のことから、TIMP-2 よりも TIMP-1 の方を測定する意義があると考えられた。

今回われわれは MMPs/TIMPs 濃度比を一つのパラメーターとして検討した。その理由は、血中 MMP-1, 2, 3, 9 の総量と TIMP-1, 2 の総量のバランスが個体内の MMP 活性を反映すると考えたからである。その結果、乳癌群の MMP-2 と MMP-9 の血中濃度は低下していたにもかかわらず、MMPs/TIMPs 濃度比は健常群よりも有意に高値を示し、リンパ管侵襲度に相関した。これは血中 TIMP-1 が減少し、その反面 TIMP-1 が特異的に阻害する MMP-1 はほぼ変化しないため、MMP-1/TIMP-1 濃度比が上昇したためであると考えられた。従って、血中 MMPs/TIMPs 濃度比上昇の contributing factor は MMP-1/TIMP-1 濃度比であり、なかでも血中 TIMP-1 の減少が乳癌の間質浸潤の進展に影響していると考えられ、術前に乳癌のリンパ管侵襲を知る手段のひとつとして、血中の MMPs/TIMPs と TIMP-1 の測定、特に TIMP-1 の測定は意義があると思われる。

結 語

乳癌患者では、健常人よりも血中 MMPs/TIMPs 濃度比が上昇し、TIMP-1 は低下していた、主に TIMP-1 が MMP 活性を左右し、乳癌のリンパ管侵襲に少なからず関与することが示唆された。

文 献

- 1) 赤木 由人：肝 転 移 に 関 す る Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) の分泌能の研究—ヌードマウス大腸癌自然肝転移モデルによる検討。日本大腸肛門病会誌 47: 552—563, 1994
- 2) 三浦一秀：大腸癌肝転移モデルにおける Matrix Metalloproteinase 9 (MMP-9) および Tissue inhibitor of metalloproteinase 1 の messenger RNA (mRNA) の発現と転移能に関する研究 in situ hybridization を用いて。久留米医学会誌 57: 892—904, 1994
- 3) Schultz RM, Silberman S, Persky B, et al: Inhibition by human amnion invasion and lung colonization by murine B16—F10 melanoma cells. *Cancer Res* 48: 5539—5545, 1988
- 4) 岩田広治：ヒト乳癌組織におけるマトリックスメタロプロテイナーゼとそのインヒビターの解析。名古屋市大医会誌 45: 345—358, 1994
- 5) Imai K, Ohuchi E, Aoki T, et al: Membrane-type matrix metalloproteinase 1 is a gelatinolytic enzyme and is secreted in a complex with tissue inhibitor of metalloproteinases 2. *Cancer Res* 56: 2707—2710, 1996
- 6) Poulosom R, Pignatelli M, Stetler-Stevenson WG, et al: Stromal expression of 7.2 kda type IV collagenase (MMP-2) and TIMP-2 mRNAs in colorectal neoplasia. *Am J Pathol* 141: 389—396, 1992
- 7) 中島元夫：転移における癌細胞と宿主細胞のマトリックスメタロプロテイナーゼの役割。実験医 12: 971—979, 1994
- 8) Woessner JF Jr: Matrix metalloproteinases and their inhibitors in connective tissue remodelling. *FASEB J* 5: 2145—2154, 1991
- 9) 永瀬秀明：プロテアーゼと生体機能。東京化学同人，東京，1993，p56—69
- 10) Stetler-Stevenson WG, Kruttsch HC, Liotta LA: Tissue inhibitor of metalloproteinase. *J Biol Chem* 264: 17374—17378, 1989
- 11) Docherty AJP, Lyons A, Smith BJ, et al: Sequence of human tissue inhibitor of metalloproteinase and its identity to erythroid-potentiating activity. *Nature* 318: 66—69, 1985
- 12) Yang TT, Hawkes SP: Role of the 21-kDa protein TIMP-3 in oncogenic transformation of cultured chicken embryo fibroblasts. *Proc Natl Acad Sci USA* 89: 10676—10680, 1992
- 13) Howard EW, Bullen EC, Banda MJ: Preferential inhibition of 72- and 92-kDa gelatinases by tissue inhibitor of metalloproteinases-2. *J Biol Chem* 266: 13070—13075, 1991
- 14) Lu X, Levy M, Weinstein IB, et al: Immunological quantitation of levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in human colon cancer. *Cancer Res* 51: 6231—6235, 1991
- 15) Nakajima M, Welch DR, Wynn DM, et al: Serum and plasma Mr 92,000 progelatinase

- levels correlate with spontaneous metastasis of rat 13762NF mammary adenocarcinoma. *Cancer Res* 53 : 5802—5807, 1993
- 16) Zucker S, Lysik RM, Zarrabi MH, et al : Mr 92,000 type IV collagenase is increased in plasma of patients with colon cancer and breast cancer. *Cancer Res* 53 : 140—146, 1993
- 17) Kleiner DE Jr, Unsworth EJ, Kruttsch HC, et al : Higher-order complex formation between the 72-kilodalton type IV collagenase and tissue inhibitor of metalloproteinase-2. *Biochemistry* 31 : 1655—1672, 1992

ANALYSES OF PLASMA METALLOPROTEINASES AND TISSUE INHIBITOR OF METALLOPROTEINASES IN PATIENTS WITH BREAST CANCER

Atsushi NAGANO, Satoru SHIMIZU*, Eiji ARITA*, Yasuhiko TOMITA*,
Hiroshi MATSUKAWA*, Jun FUJISAWA*, Masaaki INABA
and Toshio IMADA

Department of Surgery I, Yokohama City University, School of Medicine

*Department of Surgery, Yokohama Minami Kyousai Hospital

To evaluate the clinical significance of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMPs), we analyzed plasma concentrations of MMP-1, 2, 3, 9 and TIMP-1, 2 in patients with breast cancer (patient group) using the enzyme immuno-assay technique. The average levels in 32 patients were compared with the levels of 50 healthy women (control group).

The average levels of all MMPs were no higher in the patient group than in the control group. On the contrary, the average level of TIMP-1 was significantly lower in the patient group than in the control group.

Thus, the total concentration of MMPs divided by the total concentration of TIMPs (MMPs/TIMPs ratio) was elevated in the patient group. Furthermore, the MMPs/TIMPs ratio correlated with the lymphatic permeation. These results suggest that the TIMP-1 and the MMPs/TIMPs ratio correlate with lymphatic permeation of breast cancer.