症 例

胸腔鏡下に切除した食道嚢胞 —特異な MRI 画像所見を呈した 1 例—

横浜市立市民病院胸部外科

坂 本 和 裕* 加 瀬 昌 弘 孟 真 蔵 田 英 志

食道嚢胞は縦隔に発生する稀な先天性嚢胞である。今回、胸腔鏡下に切除した食道嚢胞の 1 例を経験したので報告する。

症例は 36 歳、男性。心電図異常にて当院入院時、胸部 X 線異常影を指摘された。胸部 CT 検査では左後縦隔に 4.8×3.2 cm の腫瘤を認め、胸部 MRI 検査では T1 強調画像で iso intensity, T2 強調画像で low~iso intensity を呈した。神経原性腫瘍の疑いで胸腔鏡下腫瘍切除を施行した。腫瘍の大きさは $6.0 \times 4.0 \times 3.5$ cm で表面平滑、嚢胞壁は厚さ 0.5~2 mm, 内腔は単房性で淡褐色泥状の内容物を有した。病理学的に嚢胞壁内面は重層扁平上皮に覆われ、2 層の平滑筋層を有し、食道嚢胞と診断した。

索引用語：食道嚢胞，胸腔鏡下手術，MRI 検査

はじめに

本邦において先天性縦隔嚢胞は縦隔腫瘍の約 15% を占めるが¹⁾，気管支嚢胞と心膜嚢胞が多く食道嚢胞は稀である²⁾。今回われわれは、術前の画像所見にて神経原性腫瘍を疑い胸腔鏡下手術を施行したところ、食道嚢胞であった 1 例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

症 例

患者：36 歳，男性。

主訴：胸部 X 線と異常影。

既往歴：14 歳時，急性虫垂炎手術。

家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：1998 年 4 月会社検診にて心電図異常を指摘され，6 月当院循環器内科入院。この際の胸部 X 線写真にて異常影を指摘され当科紹介となる。

入院時現症：身長 164 cm，体重 65 kg，血圧 126/66 mmHg，脈拍 66/min 整。貧血，黄疸認めず。胸腹部，四肢ともに身体所見に異常を認めなかった。表在リンパ節も触知しなかった。

入院時検査成績：末梢血，血液生化学検査上異常所見は認めず，腫瘍マーカーもすべて正常範囲内であっ

図 1 入院時胸部 X 線写真

た。

胸部単純 X 線検査：CTR 39%，左下肺野に心陰影と重なり，胸椎陰影に接して 5.5 cm 大の境界明瞭な半球状陰影を認めた（図 1）。

心電図：III 誘導で陰性 T 波， V_{2-5} で ST 上昇を認めた。

胸部 CT 検査：左後縦隔に下行大動脈，胸椎椎体，食

1998 年 12 月 24 日受付 1999 年 5 月 25 日採用

*現：横浜労災病院呼吸器外科

図 2 胸部 CT 検査

図 3 胸部 MRI 検査

A: T1 強調画像 (TR/798, TE/25), B: T2 強調画像 (TR/2458, TE/60).

図 4 術中写真 (T: 腫瘍, LLL: 左肺下葉, Ao: 下行大動脈, P: 心膜, D: 横隔膜).

道に接して, 4.8×3.2 cm の腫瘤影を認めた (図 2). 腫瘍は境界明瞭, 内部は均一で造影効果は認めなかった.

胸部 MRI 検査: 腫瘍は T1 強調画像で iso intensity を呈し (図 3 A), T2 強調画像では low~iso intensity を呈し (図 3 B), Gd-DTPA による造影にても造影されなかった.

入院後経過: 心電図異常に関しては, 循環器内科で心臓カテーテル検査および心筋生検を施行され, 心筋症と診断された. 縦隔腫瘍に関しては, 画像所見より充実性腫瘍すなわち神経原性腫瘍を疑い 7 月 7 日手術を施行した.

手術所見: 分離肺換気麻酔, 右側臥位にて胸腔鏡下に手術を施行した. Trocar は第 7 肋間腋窩中線上, 第 4 肋間腋窩前線やや前方, 第 7 肋間腋窩後線上の 3 カ所から挿入した. 胸腔内は癒着, 胸水はなく, 下行大動脈に接して縦隔胸膜下に球状の腫瘍を認めた (図 4). 縦隔胸膜を切開し迷走神経を taping し温存しつつ, 腫瘍周囲の剥離を行った. 下行大動脈からの剥離は容易であった. 腫瘍と食道との間に索状物を認めたため Endo-loop® を用いて結紮し, 腫瘍を Endo-catch® を用いて胸腔外に摘出した.

切除標本肉眼所見: 腫瘍は大きさ $6.0 \times 4.0 \times 3.5$ cm で表面平滑. 嚢胞壁は厚さ 0.5~2 mm で内容は淡褐色泥状で, 内腔は単房性であった (図 5 A, B).

病理組織学的所見: 嚢胞壁は大部分が重層扁平上皮に覆われ, 一部に線毛円柱上皮が混在しており, 上皮下には 2 層構造を有する平滑筋層と筋層間に僅かに神経叢が認められた (図 6). 気管支軟骨や気管支腺は認められなかった. 以上より食道嚢胞と診断した.

術後経過: 術後経過良好で第 6 病日に退院し, 現在

図5 切除標本剖面

A：腫瘍は淡褐色泥状の内容物を含んでいた。B：内容物除去後。

外来にて経過観察中である。

考 察

1995年の胸部外科学会全国集計¹⁾によると縦隔腫瘍2,238例中、先天性嚢胞は316例(14.1%)であった。正岡らの報告²⁾によると先天性嚢胞332例中気管支嚢胞が184例(55.4%)と最も多く、心嚢嚢胞63例(19.0%)、消化管嚢胞29例(8.7%)の順であった。消化管嚢胞は食道嚢胞、胃性嚢胞、腸性嚢胞に分類され、胸腔内においては食道嚢胞が最も多い。また食道嚢胞は食道良性腫瘍の3~12%³⁾を占め、中尾らの78例の集計によると男女比は49:26と男性に多く⁴⁾、食道周囲に発生し、食道上部40%、食道下部60%とされている⁵⁾。また食道壁内と壁外発生に分けら

図6 嚢胞壁病理像 (HE 染色, ×40)。

れ、その割合にはほぼ同じであったとされている⁶⁾。

診断としては後縦隔に存在することから神経原性腫瘍との鑑別が問題となり両者の鑑別に胸部MRI検査⁶⁾や超音波内視鏡⁷⁾が有用と報告されている。MRI検査では漿液性の嚢胞ではT1強調画像でlow intensity, T2強調画像でhigh intensityを呈し、粘液性の嚢胞ではT1, T2共にhigh intensityを呈するとされている。しかし、われわれの症例においてT1強調画像でiso intensityを呈し、T2強調画像ではlow~iso intensityを呈したため、嚢胞性腫瘍よりむしろ充実性腫瘍と考え、術前には神経原性腫瘍を疑ったため超音波内視鏡も行わなかった。食道嚢胞の内容物は透明な液体であることが多いがときに灰色の液状物であったり粥状物質を含むこともあり⁴⁾⁶⁾、内容物によりMRI所見も当然変わるものと考えられる。本症例は内容物が泥状で均一に充満しており、含有水分量が低かったため上記のMRI所見を呈したものと思われた。

食道嚢胞において、肺や食道内腔への破裂⁷⁾⁸⁾や縦隔内出血⁹⁾の報告もあり、また本症例のように神経原性腫瘍との鑑別が困難な症例もあるため治療としては外科的切除が必要である。最近では縦隔腫瘍に対しても胸腔鏡下手術が盛んに行われており、特に先天性嚢胞などの良性疾患は開胸手術に比べ手術侵襲も少なく胸腔鏡下手術のよい適応である。手術に際しては、食道嚢胞が食道壁内に存在することも多く⁴⁾食道の損傷には細心の注意が必要であり、また術後に偽憩室を生じたとの報告もあり¹⁰⁾¹¹⁾、嚢胞摘出後には食道筋層の修復が必要である。本症例においては食道壁外嚢胞であったため食道壁の損傷はなく修復は必要なかった。

結 語

1) 胸腔鏡下に切除した食道嚢腫の1例を経験した。

- 2) 術前に食道嚢腫の診断が困難であった。
- 3) 後縦隔腫瘍の診断に際しては食道嚢腫も念頭に
入れ胸部 CT 検査, 胸部 MRI だけでなく超音波内視鏡
検査も含めた精査が必要である。

稿を終えるにあたり, 病理学的御指導を頂いた横浜
市立市民病院病理部 中村宣生先生に謝辞を申し上げます。

文 献

- 1) 日本胸部外科学会学術調査委員会：1995 年度（1
月 1 日から 12 月 31 日）日本胸部外科学会学術調
査報告。日胸外会誌 45：109—116, 1996
- 2) 正岡 昭, 山口貞夫, 森 隆他：縦隔外科全国集
計。日胸外会誌 19：1289—1300, 1971
- 3) 内山八郎, 加治佐隆, 是枝誠一郎他：成人における
食道瘻。臨と研 48：1694—1704, 1971
- 4) 中尾健太郎, 窪田敬一, 有園さおり他：超音波内視
鏡によって質的診断を得た食道平滑筋腫 3 例と食
道嚢胞の 1 例の検討。日臨外医会誌 55：921—
926, 1994
- 5) Arbona JL, Fazzi JGF, Mayoral J：Congenital
esophageal cysts：Case report and review of lit-
erature. Am J Gastroenterol 79：177—181, 1984
- 6) 中 英男, 西山保比古, 上杉秀永：消化管症候群
食道・胃・腸・虫垂・こう門 その他の消化管疾
患を含めて 食道 食道先天性嚢胞。日臨（別刷
領域別症候群 5 巻）：188—189, 1994
- 7) Nakahara K, Fujii Y, Miyoshi S, et al：Acute
symptoms due to a huge duplication cyst rup-
tured into the esophagus. Ann Thorac Surg 50：
309—311, 1990
- 8) 戸田千之, 小山 陽, 富士原正保他：縦隔洞のいわ
ゆる食道性嚢腫。胸部外科 13：679—683, 1960
- 9) Gatzinsky P, Fasth S, Hasson G：Intramural oes-
ophageal cyst with massive mediastinal bleeding：
A case report. Scand J Thorac Cardiovasc Surg
12：143—145, 1978
- 10) Cioffi U, Bonavina L, Simone MD, et al：Presenta-
tion and surgical management of bronchogenic
and esophageal duplication cysts in adults. Chest
113：1492—1496, 1998
- 11) 齊藤節子, 田村真子, 北山 徹他：傍食道嚢腫の根
治手術後発生した食道憩室の 1 例。日小児会誌
85：249—250, 1981

ESOPHAGEAL CYST RESECTED UNDER THORACOSCOPIC SURGERY —A CASE REPORT OF ATYPICAL FINDINGS ON MR IMAGING—

Kazuhiro SAKAMOTO, Masahiro KASE, Makoto MO and Hideshi KURATA

Department of Thoracic Surgery, Yokohama Municipal Citizen's Hospital

Esophageal cyst is a rare congenital cystic disease that usually occurs in the posterior mediastinum. Recently we experienced a case of esophageal cyst which was removed under thoracoscopic surgery. A 36-year-old man was admitted to our hospital because of an abnormal electrocardiogram, and pointed out an abnormal shadow on his chest roentgenogram. Chest CT showed a 4.8×3.2 cm oval-shaped tumor in the left posterior mediastinum. Magnetic resonance imaging of the chest revealed that the tumor had iso signal intensity on T1-weighted image and had low to iso signal intensity on T2-weighted image. We surgically removed the tumor with suspicion of neurogenic tumor. The tumor was $6.0 \times 4.0 \times 3.5$ cm in size with smooth surface. The tumor had 0.5—2.0 mm thick wall and structure of unilocular cyst. The content of the tumor was brown dreg-like. Pathologically, the tumor was diagnosed as an esophageal cyst lined by squamous epithelium overlying double smooth muscle layers.