虚血性心疾患の良導絡治療に関する研究

第 1 報

東日良研究班 今 井 力

今年度東日良におきましては虚血性心疾患の研究班ができました。現在迄得られた成績について報告いたします。従来私共は虚血性心疾患なかんずく狭心症に対しまして、薬物療法及食餌指導をやってまいりましたがおのずから限界があります。最近A Cバイパス術という外科療法が発達してまいりました。これによりますと狭窄部位をとびこえて血液をながしてやるのでうまくゆけば半永久的な効果があるといわれて居ります。しかしこれとても適応症があり。手術後30日以内の死亡率4—5%であります。この間にありまして良導絡治療は安全で素早くでき、薬物療法と併用してゆけるので極めて有力な方法と考えます。

図①に示す如くアンケートにより現状把握をこころみ、ついで日本及中国に於ける治療点、更には随時座談会をひらいて議論の後で共同研究用のカルテを作製し、会員の協力によりその効果の集計をこころみている。第②図はアンケート様式であるが、研究会当日会員に用紙をくばり自発的に置いていっていただくという方法であります。8名の方の報告がありましてその

中7名の方は経験なし。1名は効ありという返事をいただきました。効ありという方は発作時1例、慢性2例いずれも労作性狭心症で全身良導絡調整を行い、常用穴としては膻中、巨闕、郄門、神門、内関、心俞、厥陰俞ということでありました。狭心痛（chest pain）は神経痛（neuralgic pain）と異り、現状は意識度がうすいということがわかりました。そこで文献をしらべてみますと第3図の如くになります。そして中谷先生が心疾患のハリ治療点について集められた76論文よりその使用頻度を求めてみますと最下段の如く、心俞—44、郄門—35、巨闕—31、神門—31、膻中—22、の様な順になって居ます。第4図を見ますと最近の中国の治療ですが、500~600例の多数例について調べて居りますが、狭心痛に対しては80~90%の改善率があり、心電図改善例は37.2%~66.89%に得られたとあります。

そこで共同研究用のカルテを理事会で検討の上作製（第5図）し、今年度は狭心痛に対してどの程度効果があるかという点にしばらく集計作業をすすめている。

第 1 図

調 査 方 法

- ① アンケートにより現状把握
(東日良研究会員を対象として)
- ② 文献による治療点の把握
日本 及 中国
- ③ 研究班員による座談会
- ④ 共同研究用カルテの作製

第 2 図

アンケート

氏名 _____
住所 _____
電話 _____

虚血性心疾患の良導絡治療について簡単に次の問いにお答え下さい。
回答するものに○をお付け下さい。 には数字、文字をお入れ下さい。

1 虚血性心疾患(A・B・C・D)に良導絡治療をやったことがありますか。
ある _____ ない _____

2 これからの問は「ある」に○をつけた先生方だけお答え下さい。最近3年間に 発作時 _____ 例
効果があったと幸いです。 慢性 _____ 例
なかったと幸いです。 例中 _____ 例

3 治療方法について
電気針 _____ 中国針 _____ 低周波通電 _____ 薬物 _____ 針絡 _____ 鍼灸ロケット _____
その他 _____

4 治療部位について 経路 _____ 腧所位 _____
金匱導絡調製 基本治療点(1—5) 常用穴 _____
常用穴に○をつけた先生方 お答え下さい。常用穴名(附に先生の好まれる處) _____

5 慢性の場合は週に何回位やりますか
週に _____ 回位 _____

● 虚血性心疾患 (WHOによる分類)
① 労作性狭心症
② 心筋梗塞 (急性、慢性)
③ 安静時、夜間、興奮等の中間型狭心症
④ 無痛性虚血性心疾患

第 5 図

狭心症共同研究用カールテ（虚血性心疾患班）

姓 _____ 年令 _____ 才 _____ 印刷するものに
 〇をつけて下さい。

① 支所
町名 (選別時、定置時、投網時間) _____
基線長 _____ 網長 _____ 網口長 _____ 網口幅 _____
設置場所 _____ 設置高さ _____ どうき _____ いきさけの 程度 _____

② 合併症及嗜好品
高血圧、糖尿病、心臓病、胆石症、腎臓病、

③ 治療方法

④ 食餌療法チャート

H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

④ 金具等組立費 実施 セズ
⑤ 測定方法 電算計 照計 低周波電圧 糸_____
 シヤワ-ロケット・照計 その他_____

④ 使用日期 _____

⑤ 治愈日期 _____

⑥ 使用医院名 _____

④ 胸膈 (胸膈でよい)
 ⑤ 胸膈 (胸心膈) が重鬱又は長期間に改善 重鬱 重鬱 重鬱
 ⑥ その他の重鬱 重鬱 重鬱 重鬱
 ⑦ 二トローニヤム又は補血した

④ 経過時間 血圧 前 _____ 後 _____
治療前後15分 脈拍 前 _____ 後 _____

心電図 前 _____ 後 _____
(_____) (_____)
血液生化学所見 (例, HDL-コレステロール _____)

⊕ 長期(1~3ヵ月)

④ その他医のついた事

中国に於ける最近の治療 (中医臨床創刊号)
1980-6

	治療点	治療結果	心電図改善
全国虚血性 心疾患グループ	心俞・厥陰俞 巨闕・心平 膻中・内関	506 例中 著効43.3% 改善47.8% 無効 8.8%	総有効率 66.89%
北京虚血性 心疾患グループ	膻中・内関 足三里	621 例中 著効47.8% 改善41.4% 無効10.8%	総有効率 53.2%
中医研究院 グループ	心俞・厥陰俞 内関・心平 膻中・巨闕	64 例中 有効91.38%	総有効率 37.26%

Study of Ryodoraku treatment on ischemical heart disease

(first report)

(East Japanese Ryodoraku Association) Tsutomu Imai

In this year, It was made the study group of ischemical heart disease in East Japanese Ryodoraku Association. I wish to write the result, that we acquired until nowadays. At first, we used a questionnaire, in order to know present condition on it, and we have known, that man have very few consciousness. Next, we took statistics of therapoetic points by 76 literature of heart diseases, that Dr. Nakatani collected, namely, a number of times of Shinyu is 44, Gekimon is 35, Koketsu is 31, Shinmon is 31……. We determined the common carte after discussion, and we are studying the effect of ryodoraku treatment mainly against chest pain in this year.