3. 肝疾患と糖蛋白質*

田 岡 賢 雄**

I. 緒 言

糖蛋白質は人体を含めて、あらゆる動物組織、細胞中に見いだされているが、その構造は糖と蛋白が共有結合によって結ばれている複合蛋白である。構成糖の主なものにはヘキソース(ガラクトースとマンノース)、ヘキソサミン(グルコサミンとガラクトサミン)、シアール酸(N-アセチルノイラミン酸)、フコース(メチル・ペントース)などである。血漿蛋白は alb を除いては、ほとんどが糖蛋白であり、その大部分は肝で生合成される。したがって、肝に何らかの病変が存在する場合には、血漿蛋白に大きな変化を生ずる。ヒトの血漿蛋白の基本的な構造は蛋白 core のアスパラギン残基に N-アセチルヘキソサミン(多くの場合、N-アセチル・グルコサミン)がつき、これにさらにガラクトース(またはマンノース)がつき、末端にシアール酸がついている。このほか N-アセチル・ヘキソサミンにマンノースがついているだけのもの、N-アセチル・ヘキソサミンに直接シアール酸のついている糖鎖のあることも知られている。

II. 健常人ならびに 肝疾患患者血清の糖蛋白電気泳動パターン

方法ならびに測定値については Table 1, 2. のごとくである。かように血清糖蛋白(以下 G. P. と略す)の各分画を%として表現しただけでは疾患による変動は意外に少ない。デンストメトリーによって描かれた波形を検討・分析することが大切である。急性ウィールス肝炎にあっては、一般に各泳動帯の境界が不鮮明になることと β -G. P. のピークの増高がみられるのが特徴である。肝炎が治癒傾向に向えば、この特徴は消失する。正常の G. P. パターンは峰の高さからすれば $\alpha_2 > \beta > \alpha_1 > \gamma > \text{alb}$ の順であるが、量的には $\alpha_2 > \gamma > \beta > \alpha_1 > \text{alb}$ の順となる。肝炎が慢性化するにしたがって急性期にみられた α_2 ならびに β -G. P. の増高はなくなり、肝線維化の進行につれて γ -G. P. が増加してくる。慢性肝炎で活動性病

変を伴うものでは β -G. P. の増高がみられる。肝硬変症では、 α_2 や β -G. P. の増加は目立たず γ -G. P. の増高、増幅が著明となる。肝硬変症が進展すると、 β -峰と γ -峰の区別が不鮮明となり、癒合してくる。肝癌においてもっとも特徴的な変化は α_1 -峰の増高である。この変化は肝癌以外の他臓器の悪性腫瘍の場合にもみられる。閉塞性黄疸では、一般に β -峰の増高、増幅がみられるが、良性のもの(例えば胆石症、胆のう炎、胆管炎)の方が悪性腫瘍の合併例に比べて、より顕著である。これは悪性腫瘍合併例では、肝における β -リポ蛋白の形成障害があるためかも知れない。脂肪肝のうち、肥満症に伴い β -リポ蛋白が血清中に増加している症例では β -峰の増高がみられるものが多い。

III. 肝疾患患者血清中の蛋白結合糖質

肝細胞の変性、壊死を伴うようなすべての肝疾患において血清中の蛋白結合ヘキソース、ヘキソサミン、シアール酸の増加がみられる(Fig. 1~3.)。また肝線維化が進行するに従い蛋白結合ヘキソサミンの増加がみられる。肝細胞の変性、壊死の程度とともっともよく並行するのはシアール酸である。血清 GPT 値とシアール酸値(Fig. 5.)、ZnTT 値とヘキソサミン値との間にはある程度の正の相関がある(Fig. 4.)。

血清蛋白結合ヘキソースは、健常人(25例)では 74~158 mg/dl (平均 113.2 mg/dl)、急性ウィールス肝炎(15例)では 90~330 mg/dl (平均 129.9 mg/dl)、慢性肝炎(活動性と非活動性を含めて 24例)では 60~268 mg/dl (平均 153.1 mg/dl) である。血清ヘキソサミンは健常人(20例)では 64~115 mg/dl (平均 90.7 mg/dl)、急性ウィールス肝炎(15例)では 60~264 mg/dl (平均 132.1 mg/dl)、慢性肝炎(24例)では 50~225 mg/dl (平均 120.8 mg/dl) であった。

また、血清シアール酸値は健常人(25例)では 25~66 mg/dl (平均 41.3 mg/dl)、急性ウィールス肝炎(16例)では 62~103 mg/dl (平均 56.3 mg/dl) であり、慢性肝

* Liver diseases and glycoproteins.

** Yoshio Taoka, 東京大学医学部第1内科教室, 東京労災病院内科。

Table 1. Procedure of electrophoresis for serum glycoprotein.

1. Put 1.5 to 2.5 λ of serum on the cellulose acetate membrane.
2. Electric current of 0.8 mA/cm is run in 0.05 M veronal buffer soln. (μ : 0.06, pH: 8.6) for 45 to 60 minutes.
3. After the migration, the membrane is taken out and dried at 110° to 120°C.
4. Immersed in anhydrous alcohol for 15 to 20 minutes.
5. Oxidized in 0.5% periodic acid soln. for 15 minutes.
6. Immersed in Schiff's reagent for 15 to 20 minutes at 20° to 25°C.
7. Put in 0.5% sodium bisulfite soln. for 10 to 15 minutes.
9. Dried in the air at room temperature.
10. Densitometry is carried out.

Table 2. Serum glycoprotein electrophoresis in liver diseases (99 cases, Schiff's staining).

Disease	No. of cases	Serum glycoprotein fraction (%)				
		Alb	α_1	α_2	β	γ
(Normal)	8	8.5 ± 1.1	14.0 ± 1.3	32.0 ± 1.5	21.0 ± 2.0	24.0 ± 2.0
Acute viral hepatitis	7	5.2 ± 1.3	13.7 ± 2.3	34.7 ± 5.1	18.2 ± 7.6	25.1 ± 5.7
Chronic active hepatitis	17	9.3 ± 2.8	13.8 ± 2.6	30.8 ± 5.1	24.0 ± 2.0	22.4 ± 3.6
Chronic inactive hepatitis	23	9.2 ± 2.4	15.6 ± 1.2	±32.1 ± 4.0	21.0 ± 4.1	21.9 ± 0.6
Liver cirrhosis	28	8.6 ± 3.2	13.7 ± 4.7	24.2 ± 7.4	18.2 ± 1.9	34.5 ± 7.3
Fatty liver	7	9.1 ± 3.4	15.4 ± 1.3	30.4 ± 3.3	25.7 ± 4.2	19.2 ± 1.9
Liver cancer	5	6.5 ± 2.2	20.0 ± 4.5	43.2 ± 2.1	11.2 ± 1.9	19.0 ± 1.5
Obstructive Jaundice	4	7.0 ± 2.0	18.7 ± 4.6	27.0 ± 5.5	30.0 ± 4.5	17.2 ± 1.9

Table 3. Serum glycoprotein level in liver diseases.
(Immunodiffusion technique and immunoelectrophoresis)

	α_1 -AG	α_1 -AT	α_2 -HS	α_2 M	Cp	Hp	Tf	IgA	IgG	IgM
Acute viral hepatitis	↑↑~→	↑↑~→	↓~↑	→	↓↓~→	↓↓~↑	↓↓~↑	→	↑~→	↑↑~→
Chronic inactive hepatitis	→	→	↓	↑	↓	→	→	→	↑	→
Chronic active hepatitis	↓	↑	↓	↑↑	↓	↓	↓	→	↑	↑
Liver cirrhosis	↓↓	→	↓↓	↑~↑↑	↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↑	↑↑	↑
Liver cancer	↑↑	↑↑↑	↓↓	→	↑↑	→	↓↓	→	→	→
Fatty liver	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
Obstructive jaundice	→	→	→	→	↑	→	→	→	→	→
Toxic liver injury	→	↑	→	→	↓	↑↑↑	→	↑↑↑	→	→

Fig. 1. Serum protein bound hexose in liver diseases.

Fig. 2. Serum hexosamine in liver diseases.

Fig. 3. Serum sialic acid in liver diseases.

炎 (20 例) では 30~80 mg/dl (平均 53.6 mg/dl) であった。かように血清の蛋白結合糖質の値は、肝細胞の変性、壊死のある場合には一般に増加する傾向にある。

IV. 肝疾患患者血清中の糖蛋白質に関する免疫電気泳動ならびに免疫平板を用いての検討

各種肝疾患患者の血清について寒天-アガロースゲルを用いての免疫電気泳動による検討、ならびに免疫平板を用いての 2 重拡散法による血清蛋白 (G. P.) の subcomponent の定量を試みた。全体をまとめて表示したのが Table 3. であるが、表のごとく急性ウィルス肝炎にあっては α_1 -antitrypsin (α_1 -AT), β -lipoprotein (β -Lp), IgM の増加が目立ち、IgG も増加している。 α_2 -heat stable glycoprotein (α_2 -HS) は増加している場合と減少している場合とがある。 α_1 -acid glycoprotein

Fig. 4. Correlation of serum hexosamine with liver function.

Fig. 5. Correlation of serum sialic acid with liver function.

(α_1 -AG), α_1 -lipoprotein (α_1 -Lp), ceruloplasmin (Cp), haptoglobin (Hp), transferrin (Tf) などは、いずれも著明に減少している。慢性肝炎にあっては α_2 -macroglobulin (α_2 -M), β -Lp, IgG, IgA, IgM などは増加傾向にあり、 α_1 -AT は増加しているときと不変の場合とがあつて一定の傾向がなく、 α_1 -AG はあまり変化しないか、またはやや減少している。 α_2 -HS, Cp, Hp, Tf は減少傾向にある。活動性病変のある場合には α_2 -M, β -Lp, IgG, IgM などが増加している。肝硬変症においては、IgG の著増がみられるほか、 α_2 -M, IgM, IgA も増加している。肝硬変症や慢性活動性肝炎で肝線維化が進行しつつあるような症例において、選択的に α_2 -M が増加していることは特記すべきことである。 α_1 -AT, α_1 -Lp, β -Lp は不変ないしは不定の傾向がある。 α_1 -AG, α_2 -HS, Cp, Hp, Tf は著明に減少している。肝硬変症のある例では IgA の著増しているものがあるが、海外の文献にみられるようにアルコール性の肝硬変のみが著明に増加しているということはないようである。肝癌では α_1 -AG, α_1 -AT が著しく増加しており、Cp も増

加しているが従来の1部の報告にみられるように α_2 -M が増えるということとはなかった。これに比して α_2 -HS, Tf は減少しており, IgG, IgA, IgM は不変である。脂肪肝の場合は成因によって血清 G. P. の subcomponent のパターンも著しく異なるが, 薬剤の中毒に基づく脂肪肝の場合を除いては β -Lp の増加している場合が多い。閉塞性黄疸では β -Lp, Cp が増加している。悪性腫瘍を伴う, あるいはこれに基づく閉塞性黄疸では β -Lp の増加はみられないことが多い。中毒性肝障害では急性障害では IgA の著増しているものがある。また少数例ではあるが, Hp の着増していたものがあることは興味深い。慢性障害では α_1 -AT, α_2 -M, IgA の増加, α_1 -AG, α_1 -Lp, α_2 -HS, IgG など是不変, Cp, Hp, Tf, β -Lp などは僅かながら減少傾向にある。

V. ^{14}C -1-グルコサミンならびに ^{14}C -1-ロイシンを用いてのシロネズミ肝における諸種肝病態時の糖蛋白質の生合成の検討

1. オロチン酸ならびにコレステロール脂肪肝における糖蛋白の生合成

1) 方法

体重約 250 g の Charles River 系の雄性シロネズミを用い, 1%オロチン酸ならびに 1.5%コレステロール含有食餌を2週間任意に与える。2週間後には, オロチン酸ならびにコレステロール含有食餌投与群では, 肉眼的にも, はっきりそれとわかる程度の著明な脂肪肝を生じる。

^{14}C -1-グルコサミン 10 μC , ならびに ^{14}C -1-ロイシン 10 μC をそれぞれ別々に腹腔内に投与し, 投与後 30 分毎に採血ならびに肝を摘出する。肝は摘出する前に生理的食塩水を用いて十分に灌流洗滌する。肝は Hallinan & Munro (1965)¹⁾ の方法により, 細胞亜分画(核, ミトコンドリア, 粗面ならびに滑面小胞体, 遊離のリボゾームなど)に分ける。この方法では, ミトコンドリア分画には lysosome, synaptosome, microbody などが contaminate する可能性があり, 肝細胞膜や Golgi 装置は滑面小胞体の分画(smooth vesicles)中に存在していると思われる。

これら肝細胞の亜分画中の蛋白結合糖(ヘキソース, ヘキソサミン, シアール酸など)の組成, precursor として用いた ^{14}C -1-グルコサミンの蛋白結合ヘキソサミンならびにシアール酸分へのとり込みについてしらべてみた。

肝細胞上清分画 (final supernatant) については, これに含まれる蛋白結合糖と蛋白に結合していない遊離の糖とアミ糖とに分けて定量比較し, また 0.6M 過塩素酸 (HClO_4) 可溶性 G. P. (その大部分は, α_1 -酸性 G. P. と考えられる) についてしらべ, また ^{14}C -1-ロイシンを用い

て, その蛋白部分へのとり込みについて検討を加えた。

ピューロマイシン 15 mg を ^{14}C -1-グルコサミンあるいは ^{14}C -1-ロイシンとともに, 同時あるいはこれらより 30 分前に腹腔内に投与し, これによる in vivo での G. P. 生合成の阻害について, 主として 0.6 M HClO_4 可溶性 G. P. の態度より追究した。蛋白の定量は, Lowry 法,²⁾ ヘキソースは orcinol または anthrone 法, ヘキソサミンは Ellson-Morgan 法, シアール酸は Warren 法³⁾ によって測定した。

2) 成績

肝細胞亜分画中の単位蛋白量当りの蛋白結合糖の値は, オロチン酸ならびにコレステロール脂肪肝群では, 対照に比べて僅かに増加あるいはほとんど変化はないが, 血漿中の蛋白結合糖の値は, 脂肪肝群ではヘキソース, ヘキソサミン, シアール酸ともに対照よりも明らかに高い。また, ^{14}C -1-グルコサミンの肝細胞各分画(とくにミクロソーム分画)中の蛋白結合ヘキソサミンあるいはシアール酸へのとり込みは, 腹腔内投与後 90 分~120 でピークに達するが, そのとり込み(単位ヘキソサミン量あるいはシアール酸量当りの放射能)は, 脂肪肝群では全体として対照に比し, 明らかに増加している。この傾向は蛋白結合ヘキソサミンと蛋白結合シアール酸の両者において共通にみられ, 核やミトコンドリアよりもとくにミクロソーム分画(粗面ならびに滑面小胞体と遊離のリボゾーム)において顕著にみられる。肝上清分画中

Fig. 6. Effect of fatty liver inducing diet on incorporation of glucosamine- ^{14}C into protein-bound sialic acid in rough vesicle and protein-bound hexosamine in smooth vesicle of rat.

Fig. 7. Protein and hexose contents of 0.6 M perchloric acid soluble glycoproteins in liver in rats fed with diets containing 1% orotic acid for 2 weeks and treated with 15 mg of Puromycin. Livers were collected 2 hours after I.P. injection of Puromycin.

N: Normal, C: Control, P: Puromycin treatment, O: Fed with orotic acid containing diet.

に含まれる蛋白結合ヘキソサミンの量は、肝上清中の全ヘキソサミン量（蛋白に結合しているものと結合していない遊離のものごとを全部含めての量）の約1%にすぎないが、肝上清分画中の蛋白結合シアール酸は上清中の全シアール酸量の約10%にも達することがわかった。また、肝上清中のこれらアミノ糖の量は、粒子中に含まれる量に比べて、圧倒的に多いことが証明された。この場合、肝上清分画の蛋白結合ヘキソサミンならびにシアール酸の単位蛋白量当りの量は脂肪肝群では対照に比べて明らかに高い。

つぎに肝細胞の各分画ならびに血漿中の0.6M HClO₄可溶性糖蛋白について検討してみると、オロチン酸やコレステロール脂肪肝群では対照に比して明らかに低下しており、これら脂肪肝群においては、G.P.の蛋白部分の合成が低下していることが示唆される。

つぎに今までに述べてきたオロチン酸ならびにコレス

Fig. 8. Effect of dietary orotic acid on incorporation of leucine-1-¹⁴C into 0.6 M perchloric acid soluble glycoprotein in liver in vivo. Liver was collected 30 minutes after injection of leucine-1-¹⁴C.

テロール脂肪肝におけるG.P.糖部分の生合成の促進作用に対するピューロマイシンのin vivoでの投与の影響について観察した。G.P.の蛋白部分の合成がピューロマイシンの投与によって強く阻害されることは当然であるが、これら脂肪肝群におけるG.P.糖部分の生合成の亢進もピューロマイシン15mgのin vivoでの投与によってある程度の阻害をうける。

この場合、正常肝におけるG.P.糖部分の生合成はピューロマイシンによって阻害をうけない。

2. 低蛋白食飼育ラット肝における糖蛋白の生合成

1) 方法

体重約150gのCharles River系の雄性シロネズミに5%カゼイン食または無カゼイン食（対照は20%カゼイン食）を2週間与える。この場合、ネズミの体重曲線は3群において著しい相異がみられる。低蛋白食、無蛋白食飼育ネズミの肝重量も体重にほぼ比例して、対照に比べ減少しているが、cell populationには変化がみられない。つまり組織学的には、核には変化はみられず、細胞質だけが萎縮し、核胞体比が増大している。以下1,1)の場合に準じて実験を行なった。

2) 成績

シロネズミに低蛋白食を投与すると、血漿蛋白量は低下するが、蛋白結合糖質については、ヘキソサミンの減少、シアール酸の増加がみられる。このことは単位蛋白量当りの蛋白結合糖質の値としてもいい得る。換言すれば比較的にシアール酸含量の多い、ヘキソサミン含量の少ない糖蛋白が形成され、血漿中に出現している可能性がある。この点を追求するために、肝細胞の各分画中の蛋白結合糖質について検討したところ、同様にヘキソ

Fig. 9. Incorporation of glucosamine-1- ^{14}C into the protein-bound hexosamines of liver endoplasmic reticulum fractions. Each point represents the mean value for four to six rats killed at each time interval after receiving labeled glucosamine.

0 : casein-free, 5% : 5% casein diet, 20% : 20% casein diet for 2 weeks.

サミンの減少とシアール酸の増加がみられた。しかしながら ^{14}C -1-グルコサミンの肝細胞の亜分画ならびに血漿中の蛋白結合ヘキソサミンならびにシアール酸画分へのとり込みについてしらべてみると、ヘキソサミン、シアール酸ともに低蛋白食飼育群では対照群に比して明らかに増加しており、G.P. 中のヘキソサミンならびにシアール酸の生合成はいずれも促進されていることが示唆された。

0.6 M HClO_4 可溶性 G.P. については、低蛋白食飼育群では対照群に比し、その蛋白含量は単位肝湿重量当りで低下しているが、その糖含量は（ヘキソースとして換算）逆に増加している。

^{14}C -1-ロイシンのとり込み率よりみた、 HClO_4 可溶性 G.P. の蛋白部分の生合成の割合は、低蛋白食（無蛋白食を含む）投与群では対照に比べ、明らかに亢進している。

さらに、*in vivo* でのピュロマイシン（15 mg）の投与（腹腔内）では、低蛋白食飼育群にみられた、G.P. 糖部分の生合成の促進は、ピュロマイシンによって明らかに阻害を受けることが認められた。

以上結論として、低蛋白食飼育シロネズミでは、肝における糖蛋白糖部分の合成は促進されており、その生合成の行なわれる場は、主として粗面および滑面小胞体で

Fig. 10. Incorporation of glucosamine-1- ^{14}C into the protein-bound sialic acids of liver endoplasmic reticulum fractions. Each point represents the mean value for four to six rats killed at each time interval after receiving labeled glucosamine.

0 : Casein-free, 5% : 5% casein diet, 20% : 20% casein diet fed for 2 weeks.

あることが明らかとなった。そしてピュロマイシンの *in vivo* での投与はこれを阻害する。また、この場合、比較的ヘキソサミン含量の少ない、そしてシアール酸含量の多い G.P. が肝で産生され、血漿中に release される可能性がある。

3. CCl_4 障害シロネズミ肝における糖蛋白の生合成

1) 方法

体重 200~250 g の Charles River 系雄性シロネズミの腹腔内に CCl_4 を体重 100 g 当り、0.05 ml 週 3 回注射する。対照群のほか、注射後 1 週、2 週ならびに 8 週の群に分け、おのおのの肝組織について、組織学的ならびに組織化学的に G-6-Pase, β -グルクロニダーゼなどの染色を行ない検討した。また、この場合の血漿 G.P. の動きを電気泳動の面よりしらべ、ヒトの肝障害のばあいの血漿 G.P. 各分画の電気泳動、免疫電気泳動ならびに免疫平板法（Ouchterlony 法）による測定との比較において検討した。その他の点については 1, 2 に準ずる。

2) 成績

i) CCl_4 障害シロネズミの肝では、投与後 1 週目にすでに、肝小葉中心部を結んで帯状に肝細胞内 G-6-Pase 活性の低下がみられ、この時期に一致して肝の中心静脈を結ぶ線上に狭細な線維の伸張がみられる。さら

にこの線維束の部分に間葉系細胞の集簇がみられ、その細胞質には PAS 強陽性の顆粒を認める。この顆粒は β -グルクロニダーゼの活性も強く、1種の G.P. あるいは μ コ多糖と蛋白の複合体と推定される。この一連の組織化学的な変化は、投与後2週においてさらに顕著となる。

ii) この場合の血漿 G.P. について検討するため、まず電気泳動を行なってみたところ、主として α_2 -G.P. が増加していた (β および γ -G.P. も多少増加している)。また、血漿中の蛋白結合糖質についてしらべてみると、投与後1~2週では、蛋白結合ヘキソース、ヘキソサミン、シアール酸のいずれもが単位容積当りに増加している。これを単位蛋白当りで換算してみても、蛋白結合糖質の明らかな増加が認められ、相対的に糖部分の多い G.P. が血漿中に増加しているものと思われる。しかるに投与後8週になると、血漿中の蛋白結合糖は単位容積当りでは逆に減少してくるが、単位蛋白当りでは、むしろ増加している。

iii) 一方、投与後1~2週における肝細胞の各亜分画ならびに血漿中の蛋白結合ヘキソサミンならびに蛋白結合シアール酸分画への ^{14}C -1-グルコサミンのとり込みを経時的に (腹腔内に ^{14}C -1-グルコサミン、10~12.5 μC を注射し、注射後30分毎に3時間まで採血ならびに肝を摘出) 追究してみると、肝細胞のいずれの分画においても、 CCl_4 投与群では対照群に比べて明らかな取り込みの低下がみられる。このとり込みの低下は投与後8週群において一層明らかとなる。

iv) 以上の成績より、概ね以下の結論に達した。

シロネズミの CCl_4 障害の初期には、血漿中の G.P. は増加しているが、その起源は多分破壊された肝細胞中に保有されていたもので、これが流血中に放出されたものと思われる。また、この時期においてある種の G.P. は積極的に肝の間葉系の細胞で作られ、血漿中へ放出されている可能性もある (α_2 -M?)。しかし、この場合、肝における全体としての G.P. (その大部分は血漿 G.P. となる) の生合成は低下している、(蛋白部分も糖部分ともに)。とくに α_1 -acid glycoprotein, haptoglobin, ceruloplasmin, α_2 -heat stable glycoprotein, transferrin などの生合成が低下している可能性がある。

また CCl_4 投与後、8週では血漿 G.P. は逆に減少してくるが、これは肝細胞における生合成の低下が、量的にみて肝細胞より血漿中への放出を上廻る結果と思われる。また、 CCl_4 障害のあらゆる時期において、相対的に糖部分の多い G.P. が血漿中に増加していることが認められた。

VI. 考案と総括

血漿蛋白は alb を除いては、ほとんどが構造的には G.P. であり、その大部分は肝において生合成される。

ヒトのウィールス性肝炎やアルコール性の肝障害などにさいしては、一般に血清中の G.P. は増加している。増加している G.P. について免疫電気泳動や免疫平板法 (Ouchterlony 法) を行なって検討してみると、主として増加している G.P. の subcomponent は α_1 -antitrypsin, α_2 -macroglobulin, β -lipoprotein, IgG, IgA, IgM などであることがわかる。これらが血清中に増えてくるその起源は、1部は肝細胞、1部は間葉系細胞であろうと推定され、主として肝細胞中に保有されているこれらの G.P. が肝細胞の変性破壊によって流血中に遊出してきたものと考えられる。しかしこの場合、肝細胞における G.P. の合成そのものはむしろ低下していると思われる。動物実験で CCl_4 障害 シロネズミ 肝において、早期より G.P. の蛋白部分も糖部分ともに、その合成が低下しているのは、このことを示唆している。

このような場合、血清中の α_1 -acid glycoprotein, α_2 -heat stable glycoprotein, haptoglobin, ceruloplasmin などが減少しているのは、これらの subcomponent が肝細胞において産生されていることを示すものであろう。また、ウィールス性、アルコール性、中毒性などの肝障害の場合に、肝の間葉系の細胞が増殖してくることがあり、これらの細胞質中には PAS 強陽性で β -グルクロニダーゼ活性の強い顆粒が保有されていることがある。このものは、ある種の G.P. であることが想定され、その1部は流血中に放出されている可能性もある。

一方、ある種の肝障害の場合には、G.P. の蛋白部分の合成は低下しているが、糖部分の合成は逆に亢進している。オロチン酸やコレステロール投与によって、もたらされた脂肪肝の場合がこれである。

低栄養とくに低蛋白食投与のばあい、肝における G.P. の蛋白部分の合成はむしろ亢進しているが、蛋白の素材が少ないために結果的には構造蛋白、血漿蛋白の低下を招く。そして、このようなばあい、比較的に糖成分の多い G.P. が肝において産生され、流血中に放出されている可能性がある。このような肝における G.P. 糖部分の合成の促進は、L-thyroxine, testosterone, estradiol などのホルモンの in vivo における投与時にも認められ、この3者の中では L-thyroxine がもっとも強力である。そして、この場合には、G.P. 糖部分の合成の促進とともに蛋白部分の合成も促進されているのが特徴である。

最後に、G. P. 糖部分の合成促進のメカニズムについては、G. P. 糖部分の合成経路の neck になっているいくつかの key enzymes, たとえば fructose 6-phosphate-L-glutamine transamidase や UDP-N-acetyl hexosamine transferase, CMP-NANA (N-acetyl-neuraminic acid) transferase (sialyl transferase) などの活性の増加, また一方 phosphofructokinase の活性の低下が考えられる。

また UDP-N-acetyl glucosamine より fructose-6 P $\rightarrow$ D-glucosamine-6 P への, また CMP-NANA より UDP-N-acetyl glucosamine $\rightarrow$ N-acetyl-mannosamine へ至る feed back mechanism の障害が起っている可能性もある。今後、検討を要する問題である。

〔附記〕本研究の1部は著者が在米留学中、ボストン大学医学部生化学教室において Louis C. Fillios 教授とともに行ったものである。⁴⁾ また、本研究の1部は第6回日本肝臓学会シンポジウム,⁵⁾ 第7回日本肝臓学会シンポジウム, 第12回日本消化器病学会秋期大会,⁶⁾ 第57回日本消化器病学会総会,⁷⁾ 第43回日本生化学会大会,⁸⁾ 第3回結合組織研究会において、それぞれ発表、報告した。

〔質問〕小藤田和郎(千葉大・医・第1内科)

胆道系の疾患の場合は勿論、肝疾患についても、黄疸の有無によって、そして、それも肝細胞障害性の場合と胆汁うっ滞性の場合とで、 α_1 - および α_2 -G. P. の態度に差があると思うがどうか。

〔答〕田岡賢雄

一般的に言えば、胆汁うっ滞を伴って血清のアルカリ性フォスファターゼが増加しているような症例では β -G. P. が増加し、 β -峰の増高、増幅がみられる。急性肝炎で黄疸の強いものと黄疸のない症例の間には泳動パターンの上で特別の差異は見られなかった。

文 献

- 1) Hallinan, T., and H. N. Munro : Quart. J. Exp. Physiol. **50**, 93 (1965).
- 2) Lowry, O. H., N. J. Rosebrough, A. L. Farr and R. J. Randall : J. Biol. Chem. **193**, 265 (1951).
- 3) Warren, L. : J. Biol. Chem. **234**, 1971(1959).
- 4) Taoka Y. and L. C. Fillios : J. Nutrition **101** (1), 93 (1971).
- 5) 田岡賢雄ほか：肝臓 **12** (6), 320 (1971).
- 6) 田岡賢雄ほか：日消誌 **68** (6), 589 (1971).
- 7) 田岡賢雄ほか：日消誌 **68** (9), 1022 (1971).
- 8) 田岡賢雄ほか：生化学 **42** (8), 419 (1970).

自記濃度計 メディコード ES-8型

セルローズアセテート
濾紙電気泳動図測定用

¥480,000

■仕様

光学部

- ①新方式光学楔平衡型光電池複光路
- ②光源：タングステン12V 20W
- ③フィルター：挿入式430 470 500 570 600m μ 5種附属
- ④スリット：0.5×16 0.5×10 0.5×7mm 3種附属
- ⑤受光部：光電池
- ⑥測定範囲：D = 0 ~ 1.5 D = 0 ~ 0.6 2段切換

増巾部

高感度サーボ増巾4段

記録部

- ①記録紙搬送：50mm/min(50サイクル)
60mm/min(60サイクル)
- ②試料搬送：記録紙速度と同速及び1/3速 2速切換
- ③記録紙：JIS A4 250×181 1mm方眼紙
- ④記録ペン：濃度、積算共 YEN ガラスペン
- ⑤目盛：0~0.6 0~1.5 ダブルスケール
- ⑥試料ラック：セルローズアセテート用 紙用各1枚

電源

100V 50/60 $\sim$

光源用定電圧装置：ソリッドステーツDC方式
精度85V~110V ± 0.4 V DC

株式会社 夏目製信所

東京都文京区湯島2丁目18番6号
電話 (03) 831-3251 (代表)