[シンポジウム]

小脳可溶性蛋白質に関する研究

高橋康夫, 山国 徹*

1975年 O'Farrell によって2次元電気泳動法が報告された時、我々はその分解能のよいことに注目し、これを使用して脳組織の蛋白質組成を明らかにすることができないかと考えた。

そこで先ず脳の可溶性蛋白質の2次元電気泳動パターンが脳の各部位により、また発達段階によってどのように変化するかを検討した¹⁾。ラット脳を大まかに大脳皮質、小脳、脳幹の3部位に分け夫々を胎仔、新生仔、10日、90日の4つの発達段階に分けて脳の可溶性蛋白質を抽出し2次元電気泳動法によって分析した。我々はその時点では未だ銀染色が開発されていなかったもので、クマシーブルーによる染色を使用して何れの場合でも約150の蛋白質スポットを検出することができた。大脳皮質、脳幹、小脳の夫々の4発達段階により少しずつ異なる泳動パターンを示したが、これらのスポットの中特にスポットの大きさと変化の強さに注目して36個の蛋白質を選び出しこれを模式的に示したのが Fig. 1a である。この36個のスポットの部位別発達段階別の変化を比較検討したところ Spot 35と名付けた蛋白質が小脳特に90日の小脳にのみ存在し、他の部位では認められないことを見出した。そこでこの蛋白質の特異な存在に注目し、これを分離精製し、その性質を明らかにしようと考えた。

我々が最終的に使用した分離精製法は次に述べる如くである²⁾。即ち、小脳ホモジネートを100,000×g, 90分遠心して得られた上清を硫酸分画法で85%飽和~100%飽和で沈殿する分画をとり、DEAE Sephadex A-50 カラムクロマトグラフィーを2回くり返すと殆ど完全に精製されるが、なお約10%の不純蛋白質を含んでいるので、この蛋白質分画(1.0~1.5mg)を調製用

SDS-PAGE (12.5%) にかけてスポット35蛋白質に相応するバンドを切出し、電気泳動的に蛋白質を抽出した。Fig. 1b に精製したこの蛋白質の2次元電気泳動パターンを示している。この蛋白質は分子量27k ダルトン、pI5.3の単一スポットとして認められる。この蛋白質を家兎に Freund の complete adjuvant と一諸に注射し、抗血清を得ることができた。この抗血清を得ることができたので、これを使うことにより以後 immunoaffinity カラムクロマトグラフィー法により容易にこの蛋白質を精製することができた。

次にこの蛋白質及び抗血清の性質及びその応用について述べることにしたい。先づこの蛋白質と抗血清の同定を確かめるために Western blotting を行った。Fig. 1c の如く牛小脳の可溶性蛋白質の電気泳動的 blotting を行ったものをクマシーブルーで染色すると左の如き蛋白質のパターンが得られるが、これを PAP 染色すると右の様に丁度スポット35蛋白質に相応する位置に単一スポットとして検出されてくる。明らかに単一の蛋白質として得られることがわかったので次にアミノ酸組成の分析を行った。この成績は Table 1 の如くでありグルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシンなどのアミノ酸の含量が高く酸性蛋白質であることを証明している。更に我々は S-100, calmodulin などの Ca 結合蛋白質について⁴⁵Ca の結合実験を試みていたので、丸山の方法による⁴⁵Ca の結合実験をこの蛋白質にも応用してみた。その結果は Fig. 2 の如くであった。牛のものも、ラットのものも calmodulin と同様にオートラジオグラムで明らかなバンドとして検出された。それ故酸性 Ca 結合蛋白質であることが明らかになったわけである。

次に我々は抗体について検討を行った。この抗体を

Soluble proteins in cerebellum.

* Yasuo Takahashi and Tôru Yamakuni, 新潟大学脳研究所神経薬理 Department of Neuropharmacology, Brain Research Institute, Niigata University, Niigata-shi, Niigata 951, Japan.

Fig.1. O'Farrell two-dimensional electrophoretic patterns and Western blotting of the soluble proteins from cerebellum.
a : two-dimensional gel electrophoretic pattern of major soluble proteins of the rat brain (schema). b : two-dimensional gel electrophoretic pattern of spot 35 protein isolated from the bovine cerebellum. c : western blotting of the soluble proteins of the bovine cerebellum. Left, Coomassie blue staining ; right, PAP staining.

Table 1. Amino acid composition of bovine spot 35 protein

	Residue/mol ^a	mol%
Asp	31.7	13.4
Thr	11.1	4.7
Ser	10.6	4.5
Glu	37.1	15.7
Pro	4.0	1.7
Gly	17.4	7.4
Ala	14.8	6.2
Cys	4.6	1.9
Val	9.0	3.8
Met	5.0	2.1
Ile	9.9	4.2
Leu	32.1	13.6
Tyr	3.8	1.6
Phe	11.8	5.0
Trp	(+) ^b	
Lys	21.6	9.1
His	4.4	1.8
Arg	7.8	3.3
Total	236.7	100

^aA mol.wt. of 27,000 was used.

^bPresent but could not be quantitated.

Fig.2. ⁴⁵Ca autoradiography of spot 35 protein.
(1) Bovine brain calmodulin. (2) rat spot 35 protein.
(3) bovine spot 35 protein. (4) molecular mass markers.

使用して小脳のどの部分にこの蛋白が局在するかを検討した結果は Fig. 3 の如くであり、PAP 染色で弱拡大で Purkinje 細胞とそのデンドライト、軸索がよく染まっており、他の部分は全く染まっていない。拡大を強

拡大してみると Purkinje 細胞の細胞質、ボタンなどの染色されているのがよくわかる。この様にスポット 35 蛋白は小脳 Purkinje 細胞に局在している。

そこで小脳の発達によるこの免疫組織化学的パター

Fig.3. Immunohistochemical localizations of spot 35 protein in the rat cerebellar section. a : low magnification, $\times 125$. b : higher magnification of the immunoreactive cells in the rat cerebellar section ($\times 270$). c : control cerebellar section with antigen-absorbed serum ($\times 270$).

ンの変化を観察してみた。その結果は0日、4日、9日、12日のラットで成長につれて Purkinje 細胞の分化につれてこの蛋白の染色も強くなることが明らかになった。デンドライトの発達もこの抗体により非常に明らかにわかる様になった。そこでこの免疫組織化学的方法を臨床的に応用しようと考え人間の屍体脳の観察を行った³⁾。例えば小脳脊髄変性症や人間の胎児或いは100歳以上の老齢の小脳などの Purkinje 細胞の興味ある変化をこの抗体を使用して観察することができた。小脳脊髄変性症では Purkinje 細胞の脱落や崩壊がこの抗体で鮮やかに認められるが、また細胞体の形態はそのままであるのにその染色性が著明に低下しているものも認められ、この病気の検索に大きな問題を提起した。

更に丸山ら⁴⁾によるとスポット35蛋白を電気泳動的に注入すると Purkinje 細胞の自発放電に抑制的に作用することが明らかになった。しかしこの蛋白と抗血清を混ぜて注入するとこの抑制は認められない。また、Norepinephrine の電気泳動的注入により認められる

Purkinje 細胞の discharge の抑制はそこにスポット35を更に投与することによりより強く抑制が起ることが明らかになった。この他にもスポット35蛋白は Purkinje 細胞の電気的活動に何らかの意味で関与しているのではないかということを示すデータはいくつか観察されており、今後の研究の発展がまたれる。

我々の教室ではその頃 mRNA の翻訳実験を頻回に行っていたのでこの蛋白についてもこの方向の研究を行った⁵⁾。大脳皮質の poly (A) RNA をフェノール・クロロホルム抽出後 oligo (dT) セルローズクロマトグラフィーで精製し家兎網状赤血球無細胞系で翻訳させてみると前述のクマシーブルーによる染色の場合よりはるかに多いスポットが2次元電気泳動上で認められるがその数は大体500以上になると思われる。この方法でも大脳の poly (A) RNA ではスポット35蛋白は合成されなかった。この方法で小脳の poly (A) RNA を翻訳させて、2次元電気泳動-オートラジオグラフィー法で検索するとスポット35蛋白も合成されてくる。そこで主要な蛋白のスポットを切り抜きカウントする方法で調べて

Fig.4. Fluorogram of translation products in a reticulocyte lysate directed with adult rat cerebellar mRNA.

(a) One-dimensional gel electrophoresis of total translation products (lane 1) and the immunoprecipitates from the total translation products (lane 2), and (b) two-dimensional gel electrophoresis of the immunoprecipitates from the translation products.

みるとこのスポット35の mRNA レベルは明らかに生後10日過ぎから急速に上昇していることが明らかになった。そこでこの点を抗体を使ってより明確に実験しようと考えて以下の実験を行った⁷⁾。即ちラット小脳から poly (A) RNA を分離し、網状赤血球無細胞系で翻訳させた後、その産物を SDS-PAGE で分析すると Fig.4の如くになり a 1 の如く高分子の蛋白も合成されるが、スポット35に対する抗体で沈降させたものを電気泳動した結果は a 2 の如くで単一のバンドになり、その分子量は2.7kであった。また2次元電気泳動でもこの沈降産物は単一スポットとして検出された(b)。同じ分子量のコンタミネーションは認められないので1次元の SDS-PAGE で発達時の大脳、小脳のスポット35蛋白の mRNA のレベルを観察できると考え、実験を行った結果が Fig.5である。

この様に2, 3, 4, 5では大脳 poly (A) RNA の翻訳産物は全く検出されないのに、6, 7, 8, 9の小脳 poly (A) RNA の翻訳産物は10日以後30日、90日とバンドはこくなっておりこの間に mRNA レベルが急上昇することがよくわかり免疫組織化学での処見による

スポット35蛋白の発達による変化は mRNA のレベルで調節されていることが明らかになった。

そこで我々はこの蛋白の1次構造の検討と更に遺伝子の検討をしようと考え、我々が既にニューロン特異エノラーゼ (NSE) の mRNA の精製を行った時応用した抗体による精製法をこの蛋白の mRNA の精製に応用した。その結果は非常によく十分に精製された mRNA が分離されたので、この mRNA を template として cDNA 合成を行い、Okayama-Bergの方法でクローニングを行った。精製した蛋白を CNBr で切断したフラグメントをガス相シーケンサーで分析して得たアミノ酸配列に相応した deoxynucleotide を合成し、これを ³²P でラベルしてプローブとして、Colony hybridization を行った結果3,000個のコロニーの中の14個の陽性クローンを得ることができた。この中、最長のもを抽出分離し制限酵素マップを作製した。また得られた cDNA insert について Maxam-Gilbert 法で塩基配列を決定した。現在のところ、なお一部分未決定の部分があるのでこの論文では記載しないがガス相アミノ酸シーケンサーで決定したアミノ酸配列と一致した reading frame を作製した結果 N 末端と考えられるメチオニンを見出すことができた。今後、全アミノ酸配列を決定した後、calmodulin や小脳 Ca 結合蛋白などの相同性を比較検討したいと考えている。

しかしながら、cDNA が得られたのでこれをプローブとして若干の実験を行うことができた。牛及びラットの小脳の poly (A) RNA の Northern blot 分析を行って見たところ夫々 cDNA と反応する1本のバンドが認められたがそのサイズはラットでは1,900塩基位であり牛ではそれより少し長かった。これはこの蛋白の分子量が27kであるから、coding region が800塩基位であると考えられるので約1 kbの長い noncoding region をもつこととなる様に思われる。我々は更に cDNA をプローブとして dot blot hybridization 法によりこのスポット35蛋白 mRNA の小脳発達による変化を調べてみた。その結果は Fig.6 の如くであり、前

Fig.5. Developmental changes in the fluorogram of translation products.

(1) Total translation products (500 000 cpm) with cerebellar poly(A) RNA; (2-5) fluorogram of immunoprecipitates from the total translation products with cerebral poly(A) RNA; (2) newborn, (3) 10-day-old, (4) 30-day-old, (5) 90-day-old; (6-9) Fluorograms of immunoprecipitates from the total translation products with cerebellar poly(A) RNA; (6) newborn, (7) 10-day-old, (8) 30-day-old, (9) 90-day-old.

Fig.6. Developmental changes of spot 35 protein mRNA in the rat cerebellum.

述の翻訳の結果とよく一致しており, 明らかにこの蛋白の小脳内濃度の上昇はこの転写レベルで調節されていることを示している. 大脳及び対照の rRNA は全く検出されていない. また, 脳の部位別の mRNA レベルでも dot blot hybridization 法で検索したが小脳以外の大脳皮質, 海馬, 線状体は rRNA と同様に全く検出されなかった.

以上我々がこれまでに得たスポット 35 蛋白についての実験成績を簡単にまとめて報告した.

今後なお多くの検討すべき問題があり, これからの研究に期待をかけている.

文 献

- 1) Yoshida, Y. & Takahashi, Y. : Neurochem. Res, **5**, 81 (1980)
- 2) Yamakuni, T. et al : Neuroscience Lett, **45**, 235 (1984)
- 3) 大浜栄作 他 : 神経病理学会抄録集 (1984, 1985)
- 4) Maruyama, S. et al : Eur. j. Pharm, **108**, 309 (1985)
- 5) 荒木一明 他 : 神経化学, **20**, 164 (1981)
- 6) Yamakuni, T. et al : FEBS Lett, **188**, 127 (1985)