[シンポジウム：癌、肝炎および動脈硬化症における病態解析法の進歩]

SCC 腫瘍マーカーの発現とその機能解析

縄田修吾*・加藤 紘*・中村和行**

SUMMARY

Recently, tumor markers, which have been developed for the diagnosis and evaluation for cancer, are regarded as new key tools to study the malignant behavior of cancer, and therefore, much attention has been focused on their biological functions. Squamous cell carcinoma (SCC) antigen is a tumor marker of SCC arising in various sites. We have investigated the biological function and heterogeneity of this tumor marker by electrophoretic methods. In this paper, we report that SCC antigen belongs to the inhibitory type of serine protease inhibitor family, indicating that SCC antigen may affect malignant behavior such as tumor invasion. We also describe the different pattern of SCC antigen by two-dimensional electrophoresis in normal and cancer tissues, and indicate that the heterogeneity of SCC antigen results mainly from the presence of two homologous genes, *SCCA 1* and *SCCA 2* gene.

Key words: electrophoresis, tumor marker, SCC antigen, serine protease inhibitor family, heterogeneity.

はじめに

癌における病態を把握する方法の一つとして当初開発された腫瘍マーカーのうち、いくつかのものについては最近その生物活性が明らかにされ、癌の性質を説明する糸口として新しい観点から注目されている。腫瘍マーカーの一つである SCC 抗原は、1977 年に、加藤により、子宮頸部扁平上皮癌組織から精製された扁平上皮癌関連蛋白であり¹⁾、その血中濃度の測定は、子宮癌、肺癌、食道癌など種々の扁平上皮癌に対する、治療効果の判定、あるいは、再発のモニターとして臨床的に広く用いられている²⁾。今回、SCC 抗原の発現とその機能について、電気泳動法を用いて解析してきた結果を中心に報告する。

SCC 抗原の機能

SCC 抗原は、癌のみならず、正常でも皮膚等の扁平上皮に特異的な発現を認めており、なんらかの生理学的役割を有しているものと推測される³⁾。しかしながら、実際、SCC 抗原が、いかなる蛋白質で、いかなる機能を有しているかについては明らかではなかった。1991 年に、住浪、加藤らは、SCC 抗原 cDNA のクローニングに成功し、SCC 抗原は 1170 bp の DNA 塩基でコードされる 390 個のアミノ酸から構成され、serine protease inhibitor (serpin) family に属することが判明した³⁾。Serp family とは、アミノ酸配列上、高いホモロジーを有する一群の蛋白質で、例えば plasminogen activator inhibitor-2 (PAI-2), alpha 1-antichymotrypsin (ACT) など、おのおの特異的

Electrophoretic analysis of expression and function of tumor marker, SCC antigen.

* Shugo Nawata, Hiroshi Kato; 山口大学医学部産科婦人科学教室

** Kazuyuki Nakamura; 同, 第一生化学教室

Correspondence address: Shugo Nawata, Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi University School of Medicine, 1144, Kogushi, Ube 755-8505, Japan.

第 48 回日本電気泳動学会春季大会・シンポジウム

な serine protease を阻害する inhibitory serpin として重要な機能を有していると考えられているが、なかには、ovalbumin などのように、protease inhibitor としての活性を有していない、いわゆる non-inhibitory serpin も存在する⁴⁾。そこで、SCC 抗原の生物活性を明らかにする上で、まず、SCC 抗原が inhibitory serpin か、non-inhibitory serpin かについて検討した。

1. SCC 抗原は inhibitory serpin か

一般に、serpin は C 末端近くで分子表面にループ (reactive site loop, RSL) を形成しており、この中の reactive site, P1-P1' が、target protease との反応に重要と考えられている⁴⁾。すなわち、inhibitory serpin は serine protease 活性を阻害する際、この部位で complex を形成し、その特徴として SDS-PAGE では SDS-stable serpin-protease complex として検出される。そこで、大腸菌によって発現させた recombinant SCC 抗原が、種々の serine protease と complex を形成し、その活性を阻害するか否かについて SDS-PAGE を用いて解析した⁵⁾。Chymotrypsin は基質 fibronectin を分解するが、SCC 抗原存在下では、serine protease inhibitor の PMSF や inhibitory serpin の ACT 添加時と同様、chymotrypsin による fibronectin 分解は阻害された (図 1 A)。また、抗 chymotrypsin 抗体による免疫染色では、SCC 抗原あ

るいは ACT 添加により chymotrypsin は高分子量領域に移動し、おのおの complex を形成して chymotrypsin の活性を阻害すると考えられた (図 1 B)。すなわち、SCC 抗原は ACT と同様に inhibitory serpin に属することが判明した。ただし、他の chymotrypsin-like protease である cathepsin G, PSA に対しては SCC 抗原の阻害活性は認めなかった。

2. SCC 抗原の cross-class inhibition の検討

近年、serpin が serine protease 以外の protease を阻害する、いわゆる、cross-class inhibition が注目されている⁴⁾。例えば、ウシポックスウイルス由来の serpin である CrmA は、cysteine protease である ICE を阻害し⁶⁾、ACT も cysteine protease である pro-hormone thiol protease を阻害する⁷⁾。そこで、SCC 抗原の cross-class inhibition の可能性を解析した⁸⁾。図 2 A に示すように、cysteine protease の代表である papain を gelatin zymography にて解析すると、papain は gelatin を分解するので蛋白染色で染まらずに透明なバンドとして検出されるが、SCC 抗原存在下では papain のバンドは検出されず、SCC 抗原が cysteine protease を阻害すると考えられた。また、zymography でゲルの incubation の時間を延長すると、SCC 抗原添加では高分子量領域に papain のバンドを認め、モノクローナル抗体 Mab 13 を用いた免疫染色では同部位に SCC 抗原を検出し、SCC 抗原-papain complex が確認された。興味深いことに、papain と SCC 抗原の反応生成物を SDS-PAGE で解析すると (図 2 B)、SCC 抗原と chymotrypsin の反応で認められたような SDS-stable complex は認めず、P2-P1 の Gly-Ser が切断されて生じる分子量 40,000 と低分子量の特異的なバンドを認めた。また、免疫染色では、抗 SCC 抗原ポリクローナル抗体 (ATR 15) ではこれらのバンドはともに染まるが、モノクローナル抗体 Mab 13 では分子量 40,000 のバンドしか染まらなかった。Zymography では、SCC 抗原-papain complex はモノクローナル抗体 Mab 13 で染色されたので、少なくとも分子量 40,000 の分画が、papain と complex を成しているものと思われた。さらに、SCC 抗原は、Gly の C 末端側を特異的に切断する cysteine protease である papaya protease IV (PPIV) と lysosomal cysteine protease の一つである cathepsin L を阻害した⁸⁾。以上をまとめると、図 3 に示すように、SCC 抗原は、cysteine protease と反応する際、RSL の中の P2-P1 の Gly-Ser を pseudosubstrate として認識する protease と

図 1. SDS-PAGE を利用した SCC 抗原による chymotrypsin 阻害作用の検討。

(A)

(B)

図2. SCC抗原とpapainとの相互作用の解析.

(A) SCC抗原のpapain阻害作用を表すgelatin zymography. (B) SCC抗原とpapainとの反応生成物のSDS-PAGE.

complexを形成することにより、その活性を阻害する。その際、SDS sample bufferを加えboilingすることで、これらのバンドがSDS-PAGE上で検出されるものとする。また、例えばpapainはequimolarのSCC抗原では完全には阻害されないことから、他のserpinの報告と同様に一部は基質として切断されるのではないかと考えている。

3. 2種類のSCC抗原遺伝子の存在

最近、SCC抗原遺伝子地図が明らかになり⁹⁾、SCC抗原遺伝子は、18q21.3に存在し、同じ染色体座位には、serpin遺伝子familyであるPAI-2、maspinが認められる。驚くべきことに、SCC抗原には非常にhomologyの高い2種類の遺伝子SCCA 1、

SCCA 2が存在することが確認された。つまり、SCCA 1遺伝子が今まで検討してきたSCC抗原を、SCCA 2遺伝子がそれとアミノ酸レベルで92%と高い相同性を有するSCC抗原-2をコードしている。今まで検討してきたSCC抗原-1と新たに確認されたSCC抗原-2のserpin活性を表1にまとめると、配列から予想されるreactive siteは、SCC抗原-1がSer-Serで、cysteine proteaseとの反応ではGly-Serであるが、SCC抗原-2のLeu-Serと異なっており、target proteaseが異なる可能性が考えられる。現在まで、当教室では、大腸菌で発現させ精製した遺伝子組み換え蛋白を用い、serine proteaseではSCC抗原-1がchymotrypsinを阻害するのに対し、SCC抗原-2は

図3. SCC 抗原による papain 阻害機構.

表1. SCC 抗原-1, SCC 抗原-2 の serpin 活性の相違.

	Reactive site (P1-P1')	Serine protease	Cysteine protease
SCC antigen-1	Ser-Ser	chymotrypsin	papain, PPIV, cathepsin L
SCC antigen-2	Leu-Ser	chymotrypsin, cathepsin G	none

chymotrypsin, cathepsin G を阻害することを確認した。一方, cysteine protease では SCC 抗原-1 が papain, PPIV, cathepsin L を阻害したのに対し, SCC 抗原-2 は cysteine protease とはならぬ相互作用を示さなかった。おそらく, 生体内で SCC 抗原-1, SCC 抗原-2 とともに protease inhibitor としてこれらの特異的な protease 活性を調節しているものと考えられる。

SCC 抗原の多様性

カラム等電電気泳動法により, SCC 抗原には, いくつかの等電点の異なる亜分画が存在し, 特に癌では正常とは異なる亜分画が増加することが報告されてきた²⁾。そこで, 組織中でどのような分子種の SCC 抗原が発現しているのか, その分子多様性について 2 次元電気泳動法を用いて解析した。2 次元電気泳動法は, 阿部らの方法に従い¹⁰⁾, 1 次元目に変性条件によるキャピラリー等電電気泳動を施行後, 2 次元目に変性条件として SDS 平衡化後 SDS-PAGE を行うか (2-DE), あるいは, 未変性条件として native PAGE を行った (native 2-DE)。

1. 正常扁平上皮における組織中 SCC 抗原の 2-DE, native 2-DE パターン

図4に, 正常扁平上皮での SCC 抗原の 2 次元電気泳動パターンを示す。2-DE において, 組織中 SCC 抗原は 4 個のスポットに分離された¹⁰⁾。すなわち, スポット 1, 2, 3 は, 等電点 6.4, 6.3, 6.0, 分子量 44,500, スポット 4 は等電点 5.9, 分子量 45,000 であった。さらに, native 2-DE においても, 組織中 SCC 抗原は, 2-DE に対応して 4 個のスポットに分離された。

2. SCC 抗原の多様性におけるリン酸化の関与

SCC 抗原の分子多様性の成因について, まず, リン酸化の関与について検討した。2-DE において泳動前あるいは IEF 後に SCC 抗原のアルカリフォスファターゼ処理を行い, スポットの変化を検討した結果, スポット 4 は SCC 抗原のリン酸化された亜分画であることが判明した¹⁰⁾。Native 2-DE において同様に行ってみると (図5), 泳動前の SCC 抗原のアルカリフォスファターゼ処理では, スポット 4 は矢印で示すように消失し, IEF 後アルカリフォスファターゼ処理では, スポット 4 はスポット 1 とほぼ同じ相対的移動度約 0.5 となった。すなわち, SCC 抗原のスポット 4

図4. SCC抗原の2-DE, native 2-DEパターン.

正常扁平上皮での SCC 抗原の2次元電気泳動パターンを示す。上が2-DE, 下が native 2-DE, 左が蛋白染色, 右が免疫染色, 白三角が等電点マーカー 6.5, 5.8 を示す。

図5. Native 2-DE を用いた SCC 抗原のアルカリフォスファターゼ処理による変化の解析。

はリン酸化された亜分画であり, その prototype はスポット 1 であると考えられた。

では, 実際に SCC 抗原が代表的な protein kinase である protein kinase C (PKC), あるいは protein kinase A (PKA) により, リン酸化されるか否かを *in vitro* で検討した。スポット 1 とほぼ同じ等電点が予想される recombinant SCC 抗原-1 を PKC によりリン酸化処理すると, 分子量 45,000, 等電点 6.0 のスポットが出現し, これは, SCC 抗原-1 の等電点 6.5 のメインのスポットが PKC によりリン酸化され等電点が酸性側に 0.5 ほど移動したものだと思われた。一方, PKA では, このようなスポットの出現を明らかに認めなかった。正常組織, 異形成, 癌組織中の

SCC 抗原の 2-DE パターンを比較したところ, 異形成, 癌組織では, SCC 抗原のスポット 4 は正常扁平上皮組織に比し減少する傾向を認めた。したがって, SCC 抗原のスポット 4 の減少には PKC 活性の低下が関与している可能性が考えられた。

3. どの分画が, *SCCA1* 遺伝子, あるいは *SCCA2* 遺伝子由来か

次に, 他の組織中 SCC 抗原の多様性の成因について, SCC 抗原をコードする遺伝子が, 2 種類みつかったことから, どの分画が, *SCCA 1* 遺伝子, あるいは *SCCA 2* 遺伝子由来かを検討した。SCC 抗原-1, SCC 抗原-2 をおのおの発現させた大腸菌を超音波破碎した上清を試料として, 2-DE および免疫染色法を用いて解析した。SCC 抗原-1 は, 分子量 44,500, 等電点 6.5 の分画をメインとして, ほかに分子量 44,500, 等電点 6.4, 6.3, 6.0 の全部で 4 個の分画として, また, SCC 抗原-2 は分子量 44,500, 等電点は SCC 抗原-1 より酸性側の 5.95 の分画として認められた。SCC 抗原-1 と SCC 抗原-2 を免疫染色にて比較した場合, 一次抗体 500 倍希釈では, SCC 抗原-1, SCC 抗原-2 ともに検出されたが, 従来の組織中 SCC 抗原の検出¹⁰⁾ に用いた 1000 倍希釈では, SCC 抗原-1 は検出されたが, SCC 抗原-2 は明らかに認められなかった。すなわち, *SCCA 2* 遺伝子由来の蛋白は, *SCCA 1* 遺伝子由来の蛋白に比べ, 抗体反応性が異なることを見いだした。そこで, 癌組織中 SCC 抗原を一次抗体の希釈倍率を変化させて検出してみると, 一次抗体 1000 倍希釈では, SCC 抗原のスポットを 4 個

図7. 癌における SCC 抗原の発現, 機能.

認めたが¹⁰⁾, 興味あることに, SCC 抗原-2 が検出された一次抗体 500 倍希釈では, これら 4 個のスポットのほかに, 等電点 5.5~5.7, 分子量 44,500 の分画が新たに発見された (図6, 矢印). したがって, 抗体の反応性から, これらが SCCA 2 遺伝子由来と考えられた. また, SCC 抗原の酵素との反応性の面からも, 等電点 5.5~5.7 の酸性側 SCC 抗原は SCCA 2 遺伝子由来であることを確認している. さらに, 面白いことに, 正常では SCC 抗原のこの分画はこれほど発現されておらず, また, 定量的 RT-PCR 法を用い

た癌組織中 SCC 抗原-2 mRNA の発現は, 正常に比べ有意に増加しているという結果も考え合わせると, 注目されるべき SCC 抗原的分画であると考えられる.

おわりに

以上の結果より, SCC 抗原の癌での発現, 働きを考えると, 癌では蛋白レベルで, 実際に SCCA 1 遺伝子, SCCA 2 遺伝子由来の SCC 抗原蛋白がおおの発現しており, 特徴としては正常に比して SCC 抗原-1 の, おそらく PKC によりリン酸化された分画が減少し, 一方, SCC 抗原-2 の発現が特に増加していると考えられた (図7). SCC 抗原-1, SCC 抗原-2 は, ともに, inhibitory serpin であり, 今回の検討から, 標的となる protease に特異性があり, 細胞の内外で proteolysis を制御し腫瘍の悪性度に関係しているものと考えられる. また, 住浪らは SCC 抗原-1 遺伝子を導入した腫瘍細胞では, 機序は明らかではないが, apoptosis が抑制されることを明らかにしている.

このように, これまで腫瘍マーカーとして利用されてきた SCC 抗原の生物作用, 多様性に着眼し, それを明らかにしていくことは, ひいては, それを発現している癌の病態を解析していく上でますます重要性を増していくものと考えている.

文 献

- 1) Kato H, Torigoe T. Radioimmunoassay for tumor antigen of human cervical squamous carcinoma. *Cancer* 1977; 40: 1621-8.
- 2) Kato H. Squamous cell carcinoma antigen. In: Sell S, editors. *Serological Cancer Markers*. Totowa: Humana Press, 1992: 437-451.
- 3) Suminami Y, Kishi F, Sekiguchi K, Kato H. Squamous cell carcinoma antigen is a new

図6. 癌組織中 SCC 抗原の 2-DE パターン.

- serine protease inhibitors. *Biochem Biophys Res Commun* 1991; 181: 51-8.
- 4) Potempa J, Korzus E, Travis J. The serpin superfamily of proteinase inhibitors: Structure, function, and regulation. *J Biol Chem* 1994; 269: 15957-60.
 - 5) Nawata S., Tsunaga N, Numa F, Tanaka T, Nakamura K, Kato H. Serine protease inhibitor activity of recombinant squamous cell carcinoma antigen towards chymotrypsin as demonstrated by sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis. *Electrophoresis* 1995; 16: 1027-30.
 - 6) Komiyama T, Ray CA, Pickup DJ, Howard AD, Thornberry NA, Peterson EP, Salvesen G. Inhibition of interleukin-1 beta converting enzyme by the cowpox virus serpin CrmA. *J Biol Chem* 1994; 269: 19331-7.
 - 7) Hook VYH, Purviance RT, Azaryan AV, Hubbard G, Krieger TJ. Purification and characterization of alpha 1-antichymotrypsin-like protease inhibitor that regulates prohormone thiol protease involved in enkephalin precursor processing. *J Biol Chem* 1993; 268: 20570-7.
 - 8) Nawata S, Nakamura K, Tanaka T, Numa F, Suminami Y, Tsunaga N, Kakegawa H, Katunuma N, Kato H. Electrophoretic analysis of the cross-class interaction between novel inhibitory serpin, squamous cell carcinoma antigen-1 and cysteine proteinases. *Electrophoresis* 1997; 18: 784-9.
 - 9) Schneider SS, Schick C, Fish KE, Miller E, Pena JC, Treter SD, Hui SM, Silverman GA. A serine proteinase inhibitor locus at 18 q 21.3 contains a tandem duplication of the human squamous cell carcinoma antigen gene. *Proc Natl Acad Sci USA* 1995; 92: 3147-51.
 - 10) Abe H, Okuno N, Takeda O, Suminami Y, Kato H, Nakamura K. Analysis on heterogeneity of squamous cell carcinoma antigen by two-dimensional electrophoresis. *Electrophoresis* 1994; 15: 988-91.