コ メ ン ト

和 賀 志 郎

Comment

Shiro WAGA, M.D.

Department of Neurosurgery, Mie University School of Medicine, Tsu, Japan

第52回日本脳神経外科学会(1993)のビデオシンポジウム「血管内治療—新しい機材」において、脳動脈瘤の閉塞に関して、岡山大学の衣笠先生から cellulose acetate polymer (CAP) を用いる方法、広南病院の高橋先生から Guglielmi's detachable coil (GDC) を用いた方法が発表された^{8) 9) 14) 16)}。最近の血管内手術(endovascular surgery)の発展はめざましく、特に脳動脈瘤に対する治療は2年前のものもう古くさい、といわれる時代である(“state of the art” for the endovascular treatment of aneurysms 2 years ago is now obsolete.)²⁰⁾。

思い起こすと、1974年 Serbinenko が detachable balloon を用いて選択的に脳動脈瘤の親動脈や動脈瘤自身を閉塞したことを発表したときには大変驚いたものだった²²⁾。続いて、Alksne¹⁾や Kandel¹¹⁾が定位的脳手術によって動脈瘤のクリッピングや閉塞を行うことを1977年に発表した³⁾が、この方面はその後の進歩発展がみられていない。

この頃から、選択的および超選択的カテーテル法や calibrated-leak balloon などの血管内技術が Djindjian, Debraun らによって開発された^{4) 5)}。栓塞物質としては isobutyl 2-cyanoacrylate も用いられるようになった^{6) 7)}。初期には動脈瘤に対する血管内手術は主に直達手術が行われにくい部位や巨大動脈瘤に行われ、それも親動脈の閉塞

が主であった^{3) 22)}。また detachable balloon による動脈瘤自身の閉塞の成績も初期には決して良好ではなかった¹⁰⁾。しかし、最近では直達手術が可能な部位の動脈瘤へもどんどん血管内手術が行われるようになり、その成績も極めて良好となってきている。急性期や内科的合併症のため直達手術に耐えられない症例にも血管内手術が行われている^{15) 17) 18) 19) 21) 23)}。また detachable balloon, thread, liquid などのほかに、コイル(coil)も用いられるようになり、年々成績も向上している^{3) 8) 9) 15) 17) 18) 19) 23)}。

GDCをはじめとするコイルやCAPなどの液体による脳動脈瘤閉塞の長期間の追跡結果が明らかになれば、急性期破裂脳動脈瘤の治療に果たす役割は非常に大きくなるはずである。破裂脳動脈瘤の手術時期に関する国際共同研究は The postoperative risk following early surgery is equivalent to the risk of rebleeding and vasospasm in patients waiting for delayed surgery^{12) 13)}と結論しているが、これは正しくない。急性期の早期直達手術と急性期の血管内手術の結果を比較検討できる日はそう遠くない。Casasco らの最近の論文では、71例中42例が椎骨脳底動脈系の動脈瘤であったが、Grade I, II での good recovery は94%、Grade III でも good recovery は75%である²⁾。まさに破裂脳動脈瘤の急性期の治療が、直達手術か、血管内手術か、を争う時代である。

脳血管攣縮に対しては機械的血管拡張術は1985年にすでにZubkovらによって始められ、薬理的拡張術とともに血管内手術としてすでに広く行われている。

文 献

- 1) Alksne JF, Smith RW: Iron-acrylic compound for stereo-tactic aneurysm thrombosis. *J Neurosurg* **47**: 137-141, 1977
- 2) Casasco AE, Amyrard A, Gobin YP, *et al*: Selective endovascular treatment of 71 intracranial aneurysms with platinum coil. *J Neurosurg* **79**: 3-10, 1993
- 3) Debrun G, Fox A, Drake C, *et al*: Giant unclippable aneurysms: Treatment with detachable balloons. *AJNR* **2**: 167-173, 1981
- 4) Debrun G, Lacour P, Caron J-P, *et al*: Detachable balloon and calibrated-leak balloon techniques in the treatment of cerebral vascular lesions. *J Neurosurg* **49**: 635-649, 1978
- 5) Djindjian R: Superselective internal carotid arteriography and embolization. *Neuroradiology* **9**: 145-156, 1975
- 6) Dotter CT, Goldman ML, Roesch J: Instant selective arterial occlusion with isobutyl 2-cyanoacrylate. *Radiology* **114**: 227-230, 1975
- 7) Dotter CT, Roesch J, Lakin PC: Injectable flow-guided coaxial catheters for selective angiography and controlled vascular occlusion. *Radiology* **104**: 421-423, 1972
- 8) Guglielmi G, Viñuela F, Sepetka I: Electrothrombosis of saccular aneurysms via endovascular approach. Part 1: Electrochemical basis, technique, and experimental results. *J Neurosurg* **75**: 1-7, 1991
- 9) Guglielmi G, Viñuela F, Doin J, *et al*: Electrothrombosis of saccular aneurysms via endovascular approach. Part 11: Preliminary clinical experience. *J Neurosurg* **75**: 8-14, 1991
- 10) Higashida RT, Halbach VV, Dowd CF, *et al*: Intracranial aneurysms: Interventional neurovascular treatment with detachable balloon. Results in 215 cases. *Radiology* **178**: 663-670, 1991
- 11) Kandel EI, Peresedov VV: Stereo-tactic clipping of arterial aneurysms and arteriovenous malformations. *J Neurosurg* **46**: 12-23, 1977
- 12) Kassell NF, Torner JC, Haley EC Jr, *et al*: The International Cooperative Study on the Timing of Aneurysm Surgery. Part 1: Overall management results. *J Neurosurg* **73**: 18-36, 1990
- 13) Kassell NF, Torner JC, Japne JA, *et al*: The International Cooperative Study on the Timing of Aneurysm Surgery. Part 2: Surgical results. *J Neurosurg* **73**: 37-47, 1991
- 14) Kinugasa K, Mandai S, Terai Y, *et al*: Direct thrombosis of aneurysms with cellulose acetate polymer. Part 11: Preliminary clinical experience. *J Neurosurg* **77**: 501-507, 1992
- 15) Lane B, Mark MP: Coil embolization of acutely ruptured saccular aneurysms. *AJNR* **12**: 1067-1069, 1991
- 16) Mandai S, Kinugasa K, Ohmoto T: Direct thrombosis of aneurysms with cellulose acetate polymer. Part 1: Results of thrombosis in experimental aneurysms. *J Neurosurg* **77**: 497-500, 1992
- 17) Moret J: Endovascular treatment of berry aneurysms by endovascular occlusion. The 3rd International Workshop on Cerebrovascular Surgery, Tokyo, October 17-19, 1992
- 18) Moret J, Picard L, Mawad M, *et al*: Endovascular treatment of berry aneurysms by endovascular balloon occlusion. *Neuroradiology* **33** (Suppl): 135-136, 1991
- 19) Newell DW, Eskridge J, Mayberg M, *et al*: Endovascular treatment of intracranial aneurysms and cerebral vasospasm. *Clin Neurosurg* **39**: 348-360, 1993
- 20) Nichols DA: Guest editorial. Endovascular treatment of the acutely ruptured intracranial aneurysm. *J Neurosurg* **79**: 1-2, 1993
- 21) Romodanov AP, Shcheglov VI: Intravascular occlusion of saccular aneurysms of the cerebral arteries by means of detachable balloon catheter. *Adv Tech Stand Neurosurg* **9**: 25-49, 1982
- 22) Serbinenko FA: Balloon catheterization and occlusion of major cerebral vessels. *J Neurosurg* **41**: 125-145, 1974
- 23) Wilson CB, Hieshima GB, Higashida RT, *et al*: Interventional radiologic adjuncts in cerebrovascular surgery. *Clin Neurosurg* **37**: 332-352, 1991