水環境中のマイクロプラスチック汚染の現況

田 中 周 平*

1. はじめに

2019年6月に大阪で開催されたG20大阪サミットにおいて採択された「G20大阪首脳宣言」の中で、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することをめざす世界共通のビジョンとして「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されるなど、水環境中のマイクロプラスチックに注目が集まっている。本稿では、水環境中のマイクロプラスチック汚染の現況を解説する。

2. マイクロプラスチックとは

マイクロプラスチックとは微細なプラスチック片であり、定義については、NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) は5 mm未満のプラスチック片とし、RIVM (オランダ国立公衆健康環境研究所) は、合成材料で非分解性であり、水に不溶な5 mm未満の固体粒子としている。

マイクロプラスチックはその起源から一次マイクロプラスチック (Primary Microplastics) と二次マイクロプラスチック (Secondary Microplastics) に分類される。一次マイクロプラスチックには、プラスチック製品原料としてマイクロサイズで製造されたレジンペレットや、化粧品や洗顔剤などのパーソナルケア製品に含まれるマイクロビーズなどが含まれる。二次マイクロプラスチックには、環境中に流出したプラスチックが紫外線や波力などの化学・物理的作用により劣化し微細化したものや、洗濯などの人間生活から生じる化学繊維片などが含まれる。環境水中での化学物質の吸着や生体への取り込みの可能性が危惧されており、世界的に注目されている。

マイクロプラスチックに関する世界の動向を表1に示す。2014年に欧米においてマイクロプラスチック入り製品の販売や化粧品へのマイクロプラスチック使用を禁止する法

表1 マイクロプラスチックに関する世界の動向

国・機関・研究者	年	内容
ニューヨーク州	2014	マイクロビーズを使った製品の販売を禁じる法案の提出を発表
EU加盟国	2014	化粧品へのマイクロプラスチックの使用禁止の共同声明を発表
Jambeck, et al.	2015	2010年のプラスチックごみの海洋への排出量に関する報告
国際連合	2015	パーソナルケア製品中のマイクロビーズの排除・禁止を勧告
アメリカ	2015	マイクロビーズを含むパーソナルケア製品や化粧品の製造および販売を禁止する“マイクロビーズ除去海域法”を制定 2017/7～マイクロビーズ製造禁止 2018/7～販売を含め全面禁止
G 7	2015	海洋ごみ問題へのG7行動計画を発表
台湾	2016	マイクロビーズ入りパーソナルケア製品の販売禁止の方針発表, 2018/7～輸入, 生産の禁止, 2020～販売の全面禁止
オーストラリア	2016	2017年からパーソナルケア製品へのMPsの使用禁止
イギリス	2016	2017年末までにマイクロビーズの使用を禁止する政策を発表
フランス	2016	マイクロビーズを含む化粧品の2018/1までに禁止することを欧州委員会に通知 → 2017/3に法令として公布
韓国	2016	マイクロビーズ入り化粧品の使用禁止を通知→2017/7から製造・輸入禁止, 2018/7から販売禁止
カナダ	2017	2018/1からマイクロビーズを含むパーソナルケア製品の製造・輸入の禁止, 2018/7から販売禁止
欧州委員会	2017	環境中へのMPs (マイクロプラスチック) 放出を削減するための調査オプションを協議
国連環境計画	2017	使い捨てプラスチックや化粧品中のMPs削減などへのキャンペーン「#Clean Sea キャンペーン」を開始
ニュージーランド	2017	マイクロビーズを含むパーソナルケア製品の製造・販売を2018/7～禁止する法案を提出 → 2018/6/7から禁止に
G 7	2018	G7海洋プラスチック憲章が承認
イタリア	2018	2020年からMPs入り化粧品の製造・販売を禁止する計画を発表
カリフォルニア州	2018	製品中に50パーセント以上のポリエステル繊維を含む衣料品に、洗濯の際に微細な繊維が発生することをラベルにて警告するよう義務付ける条例を発行
スウェーデン	2018	2018/7～MPs入りの化粧品などの販売禁止と海洋プラスチックごみ回収のための助成金の自治体への交付を発表

Current Situation of Microplastics Contamination in Water Environment

* Tanaka, Shuhei

京都大学大学院 地球環境学

京都市左京区吉田本町 (〒606-8501)

tanaka.shuhei.3u@kyoto-u.ac.jp

2020.6.30 受理

<https://doi.org/10.4325/seikeikakou.32.368>

案や声明の発表があり、以降世界の様々な国で、人々の生活に身近な製品に入る可能性のある一次マイクロプラスチックに対して規制などが実施されている。

海洋におけるプラスチック汚染やプラスチック片に関する報告は1970年代にさ始め、近年では関連する報告が増えており、2015年にはプラスチックごみの2010年の海洋への排出量に関する報告として、中国やインドネシアといった急速な発展を遂げているアジアの国々が主要な排出源となっている可能性が指摘された。これらにより二次マイクロプラスチックの発生抑制につながる海洋ごみへの対策・規制も加速し、2015年のG7では海洋ごみ問題に対処するためのG7行動計画が示され、2018年のG7では海洋プラスチック憲章が示された。海外の民間企業での自主規制も近年活発化し、スターバックスの使い捨てストローの廃止が話題になった。他の企業も次々に自主規制の方針を発表している。

3. 水環境中におけるマイクロプラスチック汚染の現況

3.1 調査方法と試料

2016年11月16日に琵琶湖北湖で2種類の目開き(315 μm と 100 μm) のプランクトンネットを引いた後、内側に残存した試料を図1に示す。

上の写真は315 μm メッシュのネットの試料であり、上部に浮遊している5 mm 未満のプラスチック片がマイクロ

目開き(315 μm)

目開き(100 μm)

図1 プランクトンネットの目開きの違いによる試料
(琵琶湖北湖において2016年11月16日に採取)

プラスチックである。下の写真は100 μm メッシュのネットの試料である。緑色に濁っており、その大部分は植物プランクトンと動物プランクトンである。これらはマイクロプラスチックの分析において夾雑物となる。海洋の多くの研究者が目開き300 μm のネットを使用しているのは、これらの夾雑物質を省くためである。著者らは過酸化水素水やフェントン反応、比重分離などを行うことで、プラスチックを残した状態でこれらの夾雑物質を効率的に取り除く方法を検討してきた。その結果、環境水、底泥中や魚の消化管の中にある10 μm レベルのマイクロプラスチックについての挙動を報告している。また、下水流入水、放流水に

図2 表層水中のマイクロプラスチックに関する文献のまとめ

についても 10 μm レベルのマイクロプラスチックの挙動について報告している。現在は、より小さな 1 μm レベルのマイクロプラスチックの前処理、分析方法を検討しており、水道水中のマイクロプラスチックの挙動を分析中である。

3.2 表層水中のマイクロプラスチック

表層水中のマイクロプラスチック汚染の現状について図2に整理する。表層水試料を対象とした文献 37 報のうち、川を対象としたものが 12 報、湖が 7 報、ダムが 2 報、海が 17 報、北極の水が 1 報であった。川や湖などの淡水域の文献は比較的年代の新しいものが多くみられた。またヨーロッパを調査地点とした文献は 11 報、北アメリカ 5 報、南アメリカ 1 報、アジア 9 報、オーストラリア 1 報、太平洋海域 5 報、大西洋海域 4 報、地中海 2 報、北極海 2 報、その他諸海域 5 報であった。

マイクロプラスチックの個体数密度の単位について、“MPs 個/ m^3 ”とマイクロプラスチックの個数を容積当たりで算出しているものと、“個/ km^2 ”と面積当たりで算出しているものと大きく 2 分された。マイクロプラスチックの形状については 11 報で報告されており、主に“fiber”、“fragment”、“film”、“foam”、“granule”に分類されていた。マイクロプラスチックの成分は、主に顕微鏡を用いた目視、SEM（走査型電子顕微鏡）、FTIR、ラマン分光光度計などによってそれぞれ判別されていた。そのうち目視による文献が 15 報、SEM によるものが 3 報、FTIR によるものが 13 報、ラマンによるものが 4 報、SEM と FTIR を組み合わせているものが 2 報であった。測定した粒子を化学的手法でプラスチックであると判定していたのは、約 51% の文献のみであった。

3.3 マイクロプラスチック個体数密度の比較

表層水中のマイクロプラスチック個体数密度を図3に示す。表層水を対象にし、かつ個体数密度単位を個/ m^3 で示していた文献を対象とした。最小測定対象粒径が調査によって異なり、10~1,000 μm であった。最小測定大量粒径が 1,000 μm の結果は 0.02, 0.03 個/ m^3 であった。最小測定対象粒径が 1 桁小さくなるに伴い、マイクロプラスチックの個体数密度が約 3 桁大きくなる傾向が示された。Leslie, H. A., *et al.*¹⁸⁾はオランダの河川と運河で最小 10 μm のマイクロプラスチックを計測し、100,000 個/ m^3 であったと報告している。

100 μm を最小測定対象粒径として調査した例は 4 つあり、1.6 個/ m^3 （日本河川）¹³⁾、2.6 個/ m^3 （アメリカ河川）¹²⁾、910 個/ m^3 （アメリカ河川）¹²⁾、152,000 個/ m^3 （北海）¹⁴⁾であった。このように同じ最小測定対象粒径の調査結果であっても、データのばらつきが大きく、“Data Gap”と呼んでいる。4 つの調査の中で、北海の調査では目視でマイクロプラスチックの判別が行われており、同定方法が異なったことが Data Gap を生んだ一つの要因と考えられるが、その他にも、前処理方法の違いや回収率の違い、100 μm よりも小さな粒径を対象とする場合は、クリーンルームの有無なども結果に影響してくる。これらを含めた統一した測定方法の確立が求められている。

今回は水環境中のマイクロプラスチック汚染の現状と課題を記した。測定対象が底泥、下水、下水汚泥、生物などと異なると、それぞれに分析前処理方法の開発が必要となる。

図3 表層水中のマイクロプラスチック個体数密度と最小測定対象粒径との関係

参考文献

- 1) Sadri, S. S. and Thompson, R. C. : *Mar. Pollut. Bull.*, **81**, 55(2014)
- 2) Carson, H. S., Nerheim, M. S., Carroll, K. A. and Eriksen, M. : *Mar. Pollut. Bull.*, **75**(1), 126(2013)
- 3) Lechner, A., Keckeis, H., Lumesberger-Loisl, F., Zens, B., Krusch, R., Tritthart, M., Glas, M. and Schludermann, E. : *Environmental Pollution*, **188**, 177(2014)
- 4) Mingxiao, D. and Wang, J. : *Science of The Total Environment*, **616**, 1620(2018)
- 5) Baldwin, A. K., Corsi, S. R. and Mason, S. A. : *Environ. Sci. Technol.*, **50**(19), 10377(2016)
- 6) Dris, R., Gasperi, J., Rocher, V., Saad, M., Renault, N. and Tassin, B. : *Environmental Chemistry*, **12**, 592(2015)
- 7) Isobe, A., Uchida, K., Tokai, T. and Iwasaki, S. : *Marine pollution bulletin*, **101**(2), 618(2015)
- 8) Zhao, S., Zhu, L., Wang, T. and Li, D. : *Marine pollution bulletin*, **86**(1-2), 562(2014)
- 9) Lima, A. R. A., Costa, M. F. and Barletta, M. : *Environmental Research*, **132**, 146(2014)
- 10) Lusher, A. L., Tirelli, V., O'Connor, I. and Officer, R. : *Scientific reports*, **5**, 14947(2015)

- 11) Lusher, A. L., Burke, A., O'Connor, I. and Officer, R. : *Mar. Pollut. Bull.*, **88**(1-2), 325 (2014)
- 12) Kirsten, J. K and Yeatman, E. : *Environmental Pollution*, **241**, 1082 (2018)
- 13) Kataoka, T., Nihei, Y., Kudou, K. and Hinata, H. : *Environmental Pollution*, **244**, 958 (2019)
- 14) Fatehi, D. and Liebezeit, G. : *Water, Air, & Soil Pollution*, **224**(2), 1352 (2013)
- 15) Dris, R., Johnny, G, Rocher, V., Saad, M., Renault, N. and Tassin, B. : *Environmental Chemistry*, **12**(5), 592 (2015)
- 16) Desforges, J. W., Galbraith, M., Dangerfield, N. and Ross, P. S. : *Mar. Pollut. Bull.*, **79**, 94 (2014)
- 17) Song, Y. K., Hong, S. H., Kang, J. H., Kwon, O. Y., Jang, M., Han, G. M. and Shim, W. J. : *Environ. Sci. Technol.*, **48**(16), 9014 (2014)
- 18) Leslie, H. A., Brandsma, S. H., van Velzen, M. J. and Vethaak, A. D. : *Environment International*, **101**, 133 (2017)

学位取得者の紹介

氏 名：武田 敬子 (たけだ けいこ)

学位取得機関：山形大学大学院

学 位 名：博士 (工学)

学位取得時期：2020 年 3 月

指 導 教 員：杉本 昌隆 教授

論 文 題 目：The behavior of entangled polymer melts under fast elongational flow using molecular simulations (分子シミュレーションを用いたからみ合い高分子溶融体の高速伸長流動挙動)

所 属：山形大学大学院有機材料システム研究科

所 属 住 所：山形県米沢市城南 4-3-16

連 絡 先：e-mail: kei@yz.yamagata-u.ac.jp

Tel.: 0238-26-3055

論 文 要 旨：

高分子の成形加工過程では、高速かつ大きな変形が与えられることが多いため、非線形粘弾性を示す。特に自由表面下では加工方法に応じて一軸、二軸、平面伸長を受ける。一軸伸長変形については、これまで多くの実験結果があり、またこれまで粗視化分子シミュレーションの発展によりそのダイナミクスの理解も進みつつあり実際の加工性向上に成功した報告もされてきている。しかし、二軸、平面伸長といった多軸伸長は実際の成形に多用されているにもかかわらず、実験的な再現の難しさからその理解はほとんど進んでいない。そこで本研究では、粗視化分子であるプリミティブチェーンネットワーク (PCN) モデルを用いて等

二軸及び平面伸長様式毎のからみ合い高分子溶融体の非線形粘弾性を検討し、分子論的に理解するため研究を行った。等二軸伸長流動下、直鎖単分散ポリスチレン溶融体の伸長粘度実験結果を PCN モデルで再現、その結果を基にデカップリング近似による高分子鎖挙動の解析を行い、等二軸伸長においても一軸伸長と同様に高分子鎖を十分に伸長させれば、ひずみ硬化性を示す可能性を示唆した。また、高速流動時、伸長/配向により高分子鎖の摩擦が減少し定常粘度が減少するモデルの効果を確認、流動様式の違いには敏感ではないことを示唆した。平面伸長では PCN モデルによる第二平面伸長粘度予測結果を類似性が検討されているせん断の実験結果と比較し、ひずみ軟化性を示す第二平面伸長特有の性質が、高分子鎖の配向に起因することを示唆した。またひずみ硬化を強化する方法として知られる短鎖成分に少量の長鎖成分を添加した系の一軸伸長粘度実験結果を PCN モデルで良好に再現し、短鎖と長鎖のからみ合いにより、系の緩和時間が変化し、定常粘度が増加するメカニズムを初めて明らかにした。これらの結果は、高分子溶融体の高速伸長流動下の非線形粘弾性を PCN モデルで再現した上で、高分子鎖ダイナミクスの観点から、これまで明らかではなかったひずみ硬化発生及び定常粘度増加のメカニズムを提案しており、等二軸、平面伸長でも成形法を予測できる可能性を示した。今後、二様分布系での等二軸伸長粘度予測、さらに CAE を組み合わせる等、新しい予測手法の可能性も考えられる。

<https://doi.org/10.4325/seikeikakou.32.371>