写真1 ブロア回転体積に余裕があり、前面堆雪も少なく、正常な作業状態にある場合

写真2 ブロアの回転体積の限界を超えた状態で、ブロア内部よりの雪のはき戻しが急増し、大きな前面堆雪が発生しつつある場合。

的に求めた体積効率の最大値 η_{vm} とこの $hv/\sigma Dlnb$ の値をとって図示したところ、図7に示すような結果となり、ある程度のばらつきは認められるが、推定のごとく η_{vm} は上述の無次元数 $hv/\sigma Dlnb$ によって変化するものであって、さらに図中の曲線より実験式を定めて

$$\eta_{vm} = 0.79 \left(\frac{hv}{\sigma Dlnb} - 0.29 \right)^{0.21} \quad (15)$$

なる結果を得た。

なお従来の試験結果によれば、比較的重い雪に対しては η_{vm} は0.6位であるとの報告(近藤, 1966)もあるが、図7においても●, ○印等の σ が比較的大なる雪質では、大体この程度の値を示す場合が多いことが認められる。しかし、○, ○印で示す比較の軽い雪質にあっ

ては、 η_{vm} は1.0を超える場合もあって、このような σ の小さい雪質では、ブロア内部での雪の圧縮率がかなり高くなっていることを示すものと考えられる。

写真1および2は上述の η_{vm} を実験的に求める場合の状況を示すものであって、他の条件は同一に保って除雪車の作業速度を段階的に上げて行き、ブロア内部への雪の飲み込みが良好で、装置前面の堆雪のほとんどない状態(写真1)より、急激にブロア内部より装置前方への雪のはき戻しが多くなり、前面堆雪の発生する状態(写真2)へ移行する臨界点を求めて、そのときの単位時間当り除雪量より η_{vm} の値を決定したものである。

4. 結 言

第1報に続いて、道路除雪用のロータリ除雪機に關し、前報に得られた結果を用い、ツーステージおよびワンステージブロア形の除雪機を主として、さらに必要に応じてカッタ形の試験結果をも引用して、これら各機種における各種の除雪性能について比較検討した。その結果を要約すれば、

(1) 除雪機の性能を表わすと考えられる除雪能力、除雪能率、エネルギー効率、除雪効率などについて、前報に得られた機関所要馬力、投雪距離などに関する半実験式または実験式を用いて、これらの性能に関する計算式を導き、計算式による計算値と直接実験結果より得られた実験値とを比較しつつ、機械形式、積雪条件、作業条件などが、各種除雪性能におよぼす影響について明らかにした。

(2) ロータリ除雪機の単位時間当りの積雪処理量に重要な影響を与えるブロアの体積効率について検討し、特にロールバ KRM 800 形については、与えられた条件下においての体積効率の最大値を与える実験式として次式を導いた。

$$\eta_{vm} = 0.79 \left(\frac{hv}{\sigma Dlnb} - 0.29 \right)^{0.21}$$

文 献

- 近藤 恭三, 1966: 国鉄における除雪用ディーゼル機関車。日本機械学会誌, **69**, 567, 26-31.
- 下田 茂・佐藤謙吉, 1969: ロータリ除雪機の基礎的研究第1報。雪氷, **31**, 4, 1-10.
- 田中康之・渡辺勝男, 1965: カッタ形ロータリ除雪車の性能について。土木技術資料, **7**, 10, 24-30.

Study on Rotary Type Snow Removal Machines for Highways

Report 2. Study on Performances of the Machines Such as Snow Absorption Capacity, Collecting Performance, Internal Efficiency, Overall Efficiency, and on Volumetric Efficiency of Blower

Shigeru SHIMODA and Hiroshi FURUKAWA

(Faculty of Engineering, Niigata University, Niigata)

On the basis of the experimental results in previous report (Shimoda and Sato, 1969) we made a comparative study of performances of different types of snow removal machines, and investigated the volumetric efficiency of blower. The results obtained are as follows:

1) From the empirical and semi-empirical formulas on the engine powers required and the range of snow throw, general calculating expressions for snow removal performances, such as snow absorption capacity, collecting performance, internal efficiency, and overall efficiency were obtained. Comparing the calculated results by these expressions with the experimental results of snow removal performances, the influences of machine type, snow condition, and working condition on snow removal performances were discussed.

2) The volumetric efficiency of blower was measured and an empirical formula of the critical value of this efficiency was obtained.

(1970年8月20日受理)

雪下かんらの肥大について

小林 一雄* 瀬古 竜雄** 高橋久三郎*

要 旨

北陸、東北の積雪地帯では、以前からかんらの雪中栽培が行なわれているが、これらの生理・生態についての詳細な報告はない。

筆者等は、積雪地帯の生鮮野菜の重要性を考え、積雪下のかんらの生態について、積雪深の異なる新潟県下の4地点を選び試験を行なった。

その結果、生育ステージの若いかんらは積雪下の暗黒条件でも結球重の増加が行なわれることが判った。この結球重増加は外葉の乾物重、total soluble solidの減少、外葉除去処理による結球重の増加の停滞から、外葉からの養分転移によるものである。

1. はじめに

裏日本の積雪地帯の農耕地の利用度は低く、水田は単作で、冬期は休閑をよぎなくされ、畑地にも越冬作物の作付は多くない。それは積雪によって作物生育のための光、温度、湿度等の環境条件が著しく変るため、積雪下に長期間おかれると、作物は生理的障害に加え、雪ぐされ病の被害を受け、生産量も低く、生産が不安定なためである。

積雪下の作物の生理的研究は、麦類を中心に数多くの研究がなされたが、野菜類については、積雪下の生理・生態についての研究は十分になされていないものが多い。

近年、雪を利用した栽培作物として、積雪下の新潟県下で、かんらの雪中栽培がかなり行なわれている。

一般に、積雪深50cm以上になると、積雪下は暗黒、多湿で、作物は同化作用は行ない得ない環境であり、積雪下では作物は枯死しないまでも、消耗の過程のみである。

かんらの積雪下での結球肥大は、柿崎(1951)によって緩慢ではあるが認められているが、積雪下での結球肥大量、生理生態は明らかにされていないので、筆者等は、積雪下の結球肥大、生態について、積雪深の異なる新津(小雪)、小千谷(多雪)、高田(多雪)、関山(深雪)の4か所で、1967年から試験を行なったところ、積雪下での肥大、生態について知見が得られたので、1968

～1969年の試験結果を主体に報告する。

2. 試験材料および方法

各試験地の耕種梗概を表1に示す。

表1 耕 種 梗 概

試験地	項目 品 種	播種期 (月日)	定植期 (月日)	施肥量 kg/10a		
				N	P	A
新 津	耐寒大御所	8. 5	9. 4	30	20	25
小 千 谷	や よ い	7.20	8.31	30	30	30
高 田	耐寒大御所	8. 5	9. 5	30	20	25
関 山	耐寒大御所	8. 5	9. 4	30	20	25

各試験地とも、処理区を設定せず、標準栽培を行なったが、高田のみ根雪直前に外葉剪除の処理区を設けた。

調査は11月中旬の調査日以降30日毎各月、根雪終日後、および根雪終日後15日目に行なった。結球肥大量の測定は同一個体を2度利用できず、正確に測定することも困難が多い。そこで、積雪前に全個体の結球の横径を測定し、瀬古(1969)が提案した次の実験式より球重を求めた。

$$d_2 = K \cdot 1.76 W^{1/3} \quad (\text{実験式}) \quad W_2'' = 0.1833 d_2^3$$

(この場合の推定式)

d_2 : 外観から計測した結球横径

K : 品種、時期で修正される係数

W : 結球重量

W_2'' : 推定球重

積雪中の調査は、積雪を掘り起こして調査するわけで

* 北陸農業試験場。

** 新潟県園芸試験場。

図 1 a 積雪深経過 (新津)

図 1 b 積雪深経過 (小千谷)

図 1 c 積雪深経過 (高田)

図 1 d 積雪深経過 (関山)

あるが、埋め戻してももとの積雪とは異なる環境になるので、調査個体は抜き取って、肥大量を実測し、次回の測定には次の畦の新しい個体を調査対象とした。

乾物調査は高田、関山について、乾物率、乾物重の調査を生育中庸な 5 個体を供試した。また、越冬性と関係の高い含糖量調査は、屈折率を利用したハンドフラクトメーターによる可溶性固形物測定 of 簡易な方法によった。

3. 試験結果と考察

(1) 積雪深経過

各試験地の積雪状況と調査日を図 1 に示した。4 試験地とも平年より降雪が多く、多雪年であったため、作物の越冬性と関係をもつ根雪日数は、新津 39 日、小千谷 130 日、高田 100 日、関山 114 日で、50 cm 以上積雪日数について見ると、7 日、97 日、43 日、75 日で、いずれも平年より長い期間であった。

(2) 結球肥大

結球重の時期別変化を図 2 に示した。積雪前 (11 月、12 月調査) の結球重の増加率は著しいが、積雪下に入ってから、根雪日数が増すとともに増加率は低下するが、積雪下の調査個体の観察では結球部の腐敗、枯死は見られず、50 cm 以上の積雪下の暗黒状態でも、結球重の増加は認められた。しかし、外葉除去の処理を行なった場合の雪積下の肥大は、ほとんど認められなかった。また、試験地間の積雪下の結球重の増加率の差、すなわち、積雪深と肥大の関係は明瞭ではなかったが、少雪地 (新津) の結球重増加は、積雪によって鈍化する傾向が

図2 結球重の時期別変化

図3 球葉と外葉の乾物重変化 (高田, 関山)

認められた。新津の1月から2月調査の厳冬期間の結球重の増加率は、約4%で極めて低い。この期間は積雪深経過図に示したように、積雪も比較的多く、最深積雪45cmであったが、結球部は雪面から露出したり、積雪で覆われたりして、外気の低温に影響されたためではないかと考えられる。

この時期の他の試験地の積雪深と結球重増加から、作物体が外気の影響を受けない積雪深以上（限界はある）であった場合は、積雪が作物体を低温から保護する働きをするため、深雪地（高田、関山、小千谷）と少雪地間に増加率に差を生ずるものと考えられるが、試験地により積雪期にはいるまでの生育条件、あるいは生育ステージ（小千谷は品種が違い）が異なるので量的比較は困難である。

(3) 積雪下の生理

積雪下におかれた作物体は、光量が補償点以下であるため同化はなく、消耗過程にあるわけで、貯蔵養分の推移は問題視される。そこで、越冬性と関連をもつ乾物重（率）、total soluble solid について測定した結果を述べる。

図4 部位別乾物重比率の変化

a) 乾物重

高田、関山について調査した外葉、球葉の乾物重変化を図3に示した。

地上部乾物重（外葉+結球葉）は、積雪下に入っても減少することなく、根雪初期まで増加し、後漸減し、融雪後再増加の一般的な型を示した。部位別に見ると、高田での結球葉乾物重は、積雪下の1月調査（根雪28日）時期まで増加し、その後は消雪時まで横ばいないし漸減であった。外葉は結球葉と同様に1月調査まで増加、以降急激に減少し、消雪前後から再増加した。一方、関山では2月調査（根雪後77日）まで結球葉、外葉とも漸増し、積雪期間後半は外葉乾物重は急降下、結球葉は横ばいであった。このように、積雪下での乾物重変化に場所別の差異が見られたのは、生育ステージの差によるものと考えられる。すなわち、関山の場合は生育ステージが可溶性固型物の多い、若令ステージであったため、積雪暗黒下で増加を示したものと考えられるが、更に検討を要する。

このように、積雪下での外葉乾物重の低下、結球葉乾物重の横ばい、もしくは漸増気味は、結球部の肥大を示すもので、図4の部位別乾物重比率に見られるように、茎部の増減はほとんど見られず、外葉部の比率は低下し、逆に結球部は増加しており、この関係から積雪下での結球肥大に外葉が大きく関係しているものとみることができる。

表 2 部位別 total soluble solid

試験地	調査日	芯	生長点	球 葉	外 葉	軸 下
	月 日	%	%	%	%	%
新	11.18	7.7	12.7	9.7	11.1	
	12.21	8.3	13.2	9.3	13.3	
	1.29	9.5	13.1	8.3	8.1	
	2.26	9.1	12.6	8.2	6.7	
津	3.31	8.5	8.9	6.1	7.0	
	4.29	7.2	8.7	5.1	7.1	
小	11.17	7.0	11.3	7.6	9.6	
	12.15	9.0	12.6	8.1	8.8	
	1.16	9.4	13.0	8.1	6.8	
千	2.27	8.7	10.9	7.0	4.2	
	3.27	8.7	10.4	6.9	3.2	
谷	4.17	8.1	8.7	6.3	4.1	
	4.30	6.8	8.0	4.1	4.5	
高	11.20	7.9	10.0	8.2	10.3	9.5
	12.19	9.7	14.0	10.6	11.9	11.5
	1.22	10.4	13.6	9.8	8.8	12.2
	2.22	10.8	12.3	8.5	7.3	11.7
	3.21	10.3	11.6	8.1	6.7	10.7
田	4. 2	9.6	10.1	7.1	7.5	11.3
	4.15	7.6	9.5	7.0	8.0	8.6
関	11.20	9.6	11.5	9.4	10.5	11.4
	12.20	9.6	13.8	10.7	11.9	13.6
	1.23	9.6	11.9	8.7	7.8	12.1
	2.23	9.6	11.4	7.4	6.1	11.8
	3.22	9.0	11.8	7.5	5.4	8.6
山	4.16	8.4	10.7	7.4	7.2	10.7

* ハンドフラクトメータによる。

b) Total soluble solid

含糖量と関係が高い total soluble solid (SS) の結果を表2および図5（高田のみ）に示した。

各試験地とも、積雪前は各部位とも SS は増加するが、積雪下に入って減少を始め、最も早く SS が低下して行くのは外葉で、融雪直前からの回復も早い。球葉の低下は外葉につぎ、生長点付近、芯の順で低下がおくれ、また鈍くなる。特に、芯は品種、生育ステージによってほとんど低下せず、積雪下で上昇気味のこともある。融雪後は、外葉の SS は同化作用の回復によって上昇するが、他の部位はとう立期を迎え低下し、特に球葉の低下ははなはだしい。積雪深の差による試験地間では、根雪が早く、品種および生育ステージの異なる小千谷の SS が他の試験地に比較して低下が大きかった。

かんらの断面

- — ○ 生長点 A
- - - - ○ 芯 B
- △ - - - △ 球 葉 C
- × - - - × 外 葉 D
- ◎ - - - ◎ 軸下部 E

図 5 部位別 total soluble solid の変化

c) SS と乾物率の関係

SS と乾物率の間には、Mann等 (1945) によって密接な関係があることが報告されている。本実験でも表3に示したように、高い相関関係がみられ、相関係数も高田の外葉が5%有意であったほかは、1%有意であった。

(4) 外葉除去処理

積雪直前の外葉除去処理による結球部重増加は、図2に示したように、極めて鈍い。表4に外葉除去による積雪下の生育状況を示したが、外葉除去処理を行なったものは、無処理区に比較して結球部増加率は44%も少なく、ほとんど増加が見られず、部位別の SS も低下している。これは、積雪下結球部の肥大に外葉が大きく関与しているもので、ことに、外葉からの養分転流の有無が処理の差を与えたものとみられる。

表 3 SS と 乾 物 率 の 関 係

調 査 月	高 田 球 葉		高 田 外 葉		関 山 球 葉		関 山 外 葉	
	乾 物 率	SS	乾 物 率	SS	乾 物 率	SS	乾 物 率	SS
11 (月)	8.5 %	8.6 %	10.3 %	10.3 %	11.6 %	10.0 %	11.7 %	10.5 %
12	10.5	11.2	11.3	11.9	12.5	11.2	13.7	11.9
1	10.8	10.9	10.1	8.8	10.8	9.7	10.6	7.8
2	9.6	10.0	9.9	7.3	9.9	9.0	9.9	6.1
3	8.9	9.5	8.8	6.7	8.9	9.0	8.2	5.4
4	8.9	8.5	10.6	7.5	8.1	8.5	11.0	7.2
4	7.1	7.8	9.7	8.0	—	—	—	—
相関係数 r	+0.949**		+0.777*		+0.949**		+0.936**	

* 球葉の数値は全測定4か所の平均

表 4 外葉除去処理による生育比較

調査 月日 試験区	結 球 重			SS		
	XII/19	IV/2	指 数	生 長 点	芯	葉 (2 か所)
外 葉 除 去 区	406 g	512 g	126 %	9.9 %	8.2 %	6.7 %
無 処 理 区	496	690	170	10.1	9.6	7.1

図 6 結球の形状変化

(5) 積雪による変形

かんらんの雪中栽培で、商品価値を左右する大きな問題として、結球部の変形がある。図6は積雪による結球部の変形を縦横比で示した。根雪日数、積雪深の増加によって変形が大きくなっていく。一般に、積雪下地表面には常に積雪荷重が加わっている。かんらんは、地表面に隆起した状態で栽植されているため、当然積雪荷重、積雪沈降力の作用を受けるため、積雪下で球部増加が行

なわれながら、根雪日数の増加と共に結球部は球型から陣笠型に変型し、緊度の低いものは扁平化し、融雪後多少の回復は見られるが、変形は商品価値を著しく低下させるため、栽培上の問題点である。

4. む す び

かんらんの雪中栽培の、積雪下における生育と生理生態についての調査結果であるが、かんらんの積雪下での越冬性は、麦類、他の越冬作物等に比較して高く、かんらんの結球部は、一般に積雪 50cm 以上の暗黒、高温 (0°C) 下でも確実に肥大することが明らかとなった。積雪 50cm 以上の積雪下の作物は、当然、同化作用がないため、消耗生活において結球重の増加するのは、積雪が作物体を外気の低温から保護し、ほぼ 0°C 付近の高温条件にあって、出葉、生育が行なわれ、栄養的には乾物重変化、部位別 SS の変化および外葉除去処理における結球部重の停滞に見られた結果から明らかなように、外葉からの養分転移に加えて、かんらんの積雪下における消耗が意外に少ないことによるものと考えられる。したがって、一般越冬作物の積雪下における消耗を主とした害作用より、雪の保護作用の面が大きく働いていることが確認され、かんらんの雪中栽培は利用部位と積雪の保護作用が一致した栽培作物で、雪利作物と見ることができる。また、無雪地のかんらんに比して、食味が優れて

いることも見逃がせない特徴である。しかし、栽培上では雪圧による結球部変形防止、消雪時の障害の原因究明と対策、深雪地での掘取方法等の労力軽減の問題があり、今後の研究によって積雪地の越冬作物としての定着性を一層増すであろう。

この試験を行なうにあたって、北陸農業試験場農業気象研究室長大沼匡之氏、新潟県園芸試験場長片岡寛氏の指導と助言を得、新潟県園芸試験場技師田中徳司氏、蒲沢正平氏および小千谷地区農業改良普及所田中博氏外の協力を得た。いずれも記して厚く御礼申し上げる。

文 献

- 柿崎正策, 1951: カンランの雪中栽培。農業および園芸, **26**(5), 42-44.
- Mann, L. K. and B. J. Hoyle, 1945: Use of the refractometer for selecting onion bulbs high in dry matter for breeding. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., **46**, 285-292.
- 松尾考嶺, 1944: 農作物の雪害防除に関する研究。農商省農政局, 1-4.
- 佐々木正三郎外, 1960: 蔬菜の越冬性に関する研究(Ⅱ)。東北農試研究報告20号, 87-95.
- 瀬古竜雄, 1969: 球径測定による立毛中カンランの球重推測について。新潟園試報告, 20号, 167-177.

On the Growth of Cabbage under Snow Cover

Kazuo KOBAYASHI*, Tatsuo SEKO** and Kyuzaburo TAKAHASHI*

(*Hokuriku Agricultural Experiment Station, Takada, Niigata-ken;

**Niigata Horticultural Experiment Station, Niitsu, Niigata-ken)

In snowy districts of Hokuriku and Tohoku in Japan, cabbages have been cultivated under snow cover, but no detailed study on physiological and ecological aspects of cabbages has been carried out. The present report describes the results of observations on the cabbages grown at four sites with different snow depths in Niigata Prefecture in 1968-1969. Increase in the weight of cabbage head is recognized when the cabbages were at the young stage of development even in the darkness under snow cover. From the analysis of the seasonal change in dry weight of outer leaves, the seasonal change of total soluble solid, and the effect of cutting of outer leaves, it is concluded that the increase in the weight of cabbage head is due to the transport of nutriment from outer leaves into the inner leaves.

(1970年9月10日受理)