ネパール・ヒマラヤの氷河について

—その特性と最近の変動—

森 林 成 生*

要 旨

ネパール・ヒマラヤには、消耗域表面が多量の岩屑に被われている氷河と、ほとんど岩屑に被われない氷河とが存在する。筆者は、前者を Dirty Type (D 型) 氷河、後者を Clean Type (C 型) 氷河と呼ぶことを提案した。

C型氷河、D型氷河とも、比較的最近の氷河の前進とその後の後退が顕著に認められる。D型氷河においては、前進期の氷が氷舌部に dead ice として残存しているが、これは表面の岩屑の融解抑制効果によるものと考えられる。

このネパール・ヒマラヤにおける最近の氷河の前進は、ターミナル・モレーンと現在の氷河末端の位置関係などから、氷河の主たる涵養期であるモンスーン期(6月～9月)の気温が現在より約 2°C 低かったことに起因すると推定される。

1. ま え が き

筆者は1970年10月から3か月間、および1971年10月から4か月間、ネパール・ヒマラヤ山脈の東部に位置するランタン山域、ガウリサンカール山域、エベレスト山域の3地域において氷河調査を行った(図1)。

これらの山域には、さまざまな形態、大きさをもつ氷河が、比較的狭い地域内に多数存在する。そこで、調査の対象を特定の氷河に限定せず、できるだけ多くの氷河を観察し、各氷河に共通する現象あるいはそれぞれの氷河によって異なる現象を記載することを調査の主な目的とした。

2度にわたる調査の結果、過去の氷河変動に関する興味深い情報がいくつか得られた。以下では、それらの情報にもとづき、過去の氷河変動のうちでもっとも新しいと思われる氷河前進期の気候状態を、氷河の変動量から推定する。

議論は資料の豊富なエベレスト山域の氷河を中心に行うが、詳細な調査を必要とする氷河遺跡が調査禁止区域内にあることや、調査期間の制約などのために、いくらか厳密さを欠く部分がある。しかし、そのような調査の不十分な点は、地形図や写真などの資料によりある程度おぎなうことができたと考ええる。

2. エベレスト山域の氷河の形態—C型氷河とD型氷河—

ヒマラヤ山脈は、一般に地形図が完備していないが、エベレスト山域については、Mount Everest Region (1/100,000), Khumbu Himal (1/50,000), Chogolungma-Mount Everest (1/25,000) など数種類の地形図があり、氷河学的研究を実施する上で好都合な地域である。

地形図以外の氷河に関する資料としては、以上の3地図から氷河の長さ、表面積、末端高度などを読み取って一覧表にした Müller (1970) の氷河台帳 (Inventory of glaciers in the Mt. Everest region) がある。

図2はエベレスト山域における氷河分布を示したもので、打点した氷舌部は表面が岩屑に被われていることを意味する。

図2から、エベレスト山域の氷河表面が広い範囲にわたって岩屑に被われていることがわかる。同様の現象はガウリサンカール山域やランタン山域の氷河においても見られ、ヒマラヤ山脈の氷河にほぼ共通した現象である。

しかし、岩屑に被われている氷河は比較的大型の氷河に限られ、規模の小さい氷河のほとんどは岩屑に被われていない。また、岩屑に被われている氷河と被われていない氷河では、モレーンの形状なども異なっている。

したがって、この2つのタイプの氷河を区別しておく方がよく、以下では、岩屑に被われない氷河を Clean

* 名古屋大学水圏科学研究所 (名古屋市千種区不老町)。

図 1 調査ルート図 (.....が筆者の調査ルート)

Type (C 型) 氷河, 岩屑に被われた氷河を Dirty Type (D 型) 氷河と呼ぶことにする。写真 1 で, C 型氷河 (Chhukhung 氷河) と D 型氷河 (Ama Dablam 氷河) の形態上の相違を見ることができる。

図 3 はエベレスト山城の C 型氷河と D 型氷河の数と氷河表面積の関係を表わしたもので, 表面積の小さい氷河では C 型氷河が多く, 表面積の大きい氷河では D 型氷河が多いことがわかる。

図 4 は典型的谷氷河である Khumbu 氷河, Ngojumba 氷河, Lhotse 氷河の縦断面を示したもので, 傾斜の緩い氷舌部のみが岩屑に被われていることがわかる。氷舌部の傾斜が急に小さくなる高度は, エベレスト山城では氷河によらずほぼ一定で, 5,400~5,500m である。したがって, 各氷河の岩屑の上限高度もほぼ等しい。

氷舌部を被う岩屑の大きさは, 稀に 5 m 以上の巨石も見られるが, 普通には数 cm から 30cm までのものが多く, 末端付近では砂またはシルトも見られ, 層の厚い所ではそれらが不規則に堆積している。

岩屑層の厚さは下流にゆくほど厚くなり, 末端付近では, 露出した岩屑層と氷河水の断面から判断して, 1 m

以上に達していると思われる。このような厚い岩屑層は, 下の氷の融解に大きな影響をおよぼしていると考えられ, 岩屑に被われた部分では, 次にあげる特徴的な形態が見られる。

1) Dirt cone: 氷河上の円錐丘で, 厚い岩屑の下の融水量が小さいために生じたと考えられる。高さは 5~10m のものが多いが, 稀に 20m に達するものもある (写真 2)。

2) Ablation lake: 氷河上の氷の凹みに水が溜ったもので, 長径は 10~100m 程度のものが多い。写真 3 の Imja 氷河の ablation lake はいくつかの小さな池が合体して大きくなったもので, 長径は 300m に達する。

3. エベレスト山城における氷河の涵養特性

一般に氷河の涵養期となる冬は, ネパール・ヒマラヤでは強い偏西風の影響下にあり, 乾燥した晴天の日が続くため降水量はきわめて少ない。井上 (1972) の測定によると, Imja Khola, Periche (4,243m) での 1969 年 11 月から 1970 年 1 月までの 3 か月間の降水量はわずか 6 mm であった。

一方, 夏の降水量は Müller (1958) の測定によると,

写真 1 C 型氷河 (Chhukhung 氷河) と D 型氷河 (Ama Dablam 氷河) (1970. 11. 17撮影)

写真 2 Nuptse 氷河中流に見られる dirt cone (1970. 11. 17撮影)

写真 3 Imja 氷河の ablation lake (1969. 12. 名大水圏科学研究所奥平文雄氏撮影). 手前の池は長径約 300 m. 写真中央の露出した氷崖の高さは約 15m. 池の表面は凍結している.

写真 4 Gyajo 山稜の圏谷群 (1970. 11. 21)
各岩峰の高さはそれぞれ約5,700mである。一番右の圏谷の上部には小さい氷河が見られる。

写真 5 Lobuje 氷河に見られる分離した
dead ice と active terminus
(1973. 4. 北大理学研究科田中碩二
氏撮影)

写真 6 Ngojumba 氷河 (1970. 11. 23)
写真中央に見られる岩屑に被われな
い白い氷の部分は、岩屑に被われた
氷の上を進出してきたように見え
る。後方の山は Gyachung Kang
(7,922m)。

図 2 エベレスト山城の氷河分布

Khumbu 氷河 5,300m 地点で1956年4月12日から11月26日までの7か月半に390mm を記録し、このうち326 mm は6月から9月までの4か月間に降っている。

6月から9月までは、ネパールではいわゆるモンスーン期にあたり、南方から湿潤な空気がヒマラヤ山脈にまで侵入し、多量の雨や雪を降らせる。

降水量は、ヒマラヤ山脈の南側では高度が低くなるほど多くなり、Dudh Kosi の約 3,000m 地点で同期間(1956年4月12日～11月26日)の降水量は 1,660mm となっている (Müller, 1958)。

井上と Müller による冬と夏の降水量測定の結果は、エベレスト山城の氷河の主な涵養期間が、冬ではなく夏のモンスーン期であることを示している。同じことは、エベレスト山城に限らず、ほぼ同じ気候条件にあるネパール・ヒマラヤの氷河全体についてもいえる。

モンスーン期間中は比較的気温が高いので、降水を雨

図 3 氷河表面積によるC型氷河とD型氷河の頻度分布

と雪に分ける境界線が氷河上に存在する。この境界線を、以下では雪-雨境界線と呼ぶことにする。

雪-雨境界線は、降雪粒子が落下途中で大気から熱を受けて融解し、雨滴となるために生じる。降水が雪として降るか雨として降るかは、地上気温と一義的な関係に

図4 代表的D型氷河の縦断面図 (Snow line 高度は Müller (1970) の Inventory による)

あり、伊藤 (1944)、杉山 (1946) の研究結果によると、地上気温が 2.5°C 以下で雪、 $0\sim 4.5^{\circ}\text{C}$ でみぞれ、 2.5°C 以上で雨となる割合が大きい。

また、樋口 (1973) は降雪粒子の種類によって、地上気温との対応が若干異なることを指摘している。それによると、雪片では気温が 3°C 以上になると降雪の頻度はきわめて小さくなるが、あられの場合には気温が 6°C までは比較的大きい頻度で雪として降っている。

ヒマラヤの雪-雨境界線を厳密に気温と対応させるには、今後ヒマラヤにおける降雪粒子の観測が必要になるが、以下では、厳密な気温との対応は必ずしも必要でないので、単に、雪-雨境界線は特定の地上気温と強い相関があるとして議論を進める。

ヒマラヤにおける雪-雨境界線は、氷河学的立場から見ると、過渡的平衡線* (樋口ほか, 1971) と同義である。すなわち、雪-雨境界線より上の氷河上では積雪が見られ、それ以下では積雪がなく氷河水が露出しているからである。

エベレスト山城の雪-雨境界線は井上 (1971) によれば、モンスーン初期 (6月) には約 $5,000\text{m}$ の高さにあり、その後気温の上昇に伴って上昇し、7月上旬には約 $5,500\text{m}$ に達する。気温はその後ほとんど上昇しないので、この高さが雪-雨境界線のほぼ上限高度となる。

モンスーン前半に雪-雨境界線の上限高度以下で降った雪は、上昇した気温による顕熱や水蒸気の凝結熱など

図5 エベレスト山城と Gyajo 山稜の氷河の雪線高度の頻度分布

によってまもなく融解する。結局、ネパール・ヒマラヤの氷河では、モンスーン最盛期に最も高く上昇した時の雪-雨境界線が、その年の氷河の平衡線 (annual equilibrium line) となる。したがって、ネパール・ヒマラヤでは、氷河の平衡線はモンスーン期の地上気温と一義的な関係をもつことになる。

図5は、Müller の Inventory から、エベレスト山城における氷河の雪線 (snow line) 高度の頻度分布を示したものである。Müller の Inventory における雪線 (snow line) は、2, 3 の実測された氷河を除くと、

* ある時期における質量収支がゼロとなる地点を結ぶ氷河上の線。

Höfer 法や等高線の形から推定したもので、厳密な意味の平衡線と異なるが、この地域の平衡線高度分布の一応の傾向を表わすものと考えられる。事実、雪線高度の頻度分布のピークは、雪-雨境界線から導いた平衡線高度(約5,500m)とよく一致している。

以上、エベレスト山域の氷河の涵養特性を要約すると

1) 主たる涵養はモンスーン期(6月～9月)の降雪による。

2) 氷河の平衡線(annual equilibrium line)高度は、モンスーン最盛期の地上気温と一義的な関係にある。

4. 最近の氷河変動

ネパール・ヒマラヤでは、比較的最近の氷河の前進とその後の後退が、調査したすべての地域で明確に認められた。氷河前進の痕跡はモレーンとして残っており、それらは写真1、写真2で見ることができる。

C型氷河である Chhukhung 氷河では、現在の末端(5,040m)の下方4,960mの高さにほとんど植生をもたない顕著なターミナル・モレーンが存在する(写真1)。このモレーンは、植生がほとんどないことから、形成されてからの時間経過が短いと判断される。

一方、D型氷河の Ama Dablam の氷河(写真1)や Nuptse 氷河(写真2)では、氷河の末端位置は外見上はほとんど後退していないが、氷河表面がラテラル・モレーン上端より30～50m低く、厚さの点で大きく縮小していることがわかる。

C型氷河における氷河末端の後退、D型氷河における氷河表面の低下という氷河縮小の2つのパターンは、他のほとんどのC型氷河、D型氷河においても見られる。

しかし、Khumbu 氷河や Ngojumba 氷河などの大型氷河では、ラテラル・モレーンが3～4列見られるところもあり、氷河の変動が1度にとどまらなかったと推定される。このようないくつかのモレーンを持つ氷河においても、植生のないモレーンが必ず一つ存在し、このモレーンは最も新しい氷河の前進によって形成されたものと考えられる。

ネパール・ヒマラヤに見られる最近の数回の氷河変動の時期を確定することは、今後の重要な課題の一つであるが、最も新しい変動に関しては、カラコラムやアルプスでのすでに年代が知られた氷河変動とほぼ同じ時期のものと考えられる間接的な証拠がある。

アルプスでは《1850年モレーン》が存在することはよく知られているが、カラコラムでは、Chogo-Lungma 氷河で1861年と1863年に、氷河表面がラテラル・モレーンと同じ高さにあったことが報告されている(Kick,

1962)。

Chogo-Lungma 氷河の氷河表面は約90年後の1954年にはラテラル・モレーン上端より30～60m低くなっていた(Kick, 1962)。この高度差は、ネパール・ヒマラヤの氷河の場合とほぼ等しい値である。

たがいに遠く隔ったアルプスとカラコラムで、ほぼ同時期に氷河の変動があったことは、広範囲の気候変動の結果によるものと考えられ、当然ネパール・ヒマラヤでも大きな影響を受けたと推定される。したがって、ネパール・ヒマラヤの植生をもたないモレーンで示される最も新しい氷河の拡大も、1800年代のはじめから中頃にかけてのものと考えられる。

5. 最も新しい氷河前進期の気候状態

氷河の変動は「気候の変動」→「涵養量・消耗量の変動」→「平衡線の変動」→「末端の変動」という経過をとると考えられる。これらの変動量のうち、観察から直接知ることができるのは過去の末端であるターミナル・モレーンと現在の氷河末端とで示される末端位置の変動量のみである。

末端の変動量は同じ気候条件下にあるような狭い地域内でも、一般に氷河の位置、大きさ、形態などによってそれぞれ異なる。したがって、氷河の末端位置の変動量だけから、逆に気候の変動量を求めるのは容易でない。

しかし、山稜が雪線よりわずかに高い特殊な地形的条件にある氷河では、末端の変動量が平衡線高度の変動量とほぼ等しくなり、その場合には末端位置の変動量から気候の変動量を求めることは比較的容易である。

エベレスト山域では、次のべる Gyajo 山稜がそのような地形的条件を備えている。

Cho Oyu (8,153m) から南にのびる山稜は5,800～6,000mのピークが多数そびえ、エベレスト山域では、比較的低い部類に属す山稜である(図2、図6)。この山稜を最高峰 Gyajo Ri (6,186m) の名をとって、Gyajo 山稜と呼ぶことにする。

Gyajo 山稜の雪線高度は5,500～5,600m(図5)なので、山稜上のピークは雪線よりわずかに数100m高いだけである。したがって、Gyajo 山稜の両側に見られる氷河は規模が小さく、ほとんどが圏谷氷河である。D型氷河はわずかに2つで、他はすべてC型である。氷河の分布状況は図6に示されている。

Gyajo 山稜に見られる氷河も、エベレスト山域の他の氷河と同様に現在の氷河末端の下方に非常に新しいモレーンをもっている。これらのモレーンは大抵の場合、圏谷の底部に見られる。また、山稜には氷河の存在しない圏谷も多数見られ(写真4)、それらの圏谷底にも新

図 6 Gyajo 山稜の氷河と圏谷地形の分布

しいモレーンが存在する。このことから、最も新しい氷河の前進期に、現在氷河が存在しない圏谷にも氷河が形成されていたことがわかる。

現在、Gyajo 山稜の Bhote Kosi 側は入域禁止になっているので、観察は Dudh Kosi 側に限られたが、地形図から Bhote Kosi 側でも、上に述べたのと同様の状態であることが判断できる。

図 7 は Gyajo 山稜の氷河とモレーン（あるいは圏谷底）の高度に対する分布状況を示したものである。図 7 で次の 2 点が明白に認められる。

1) 各氷河の末端高度は 5,400m を中心に狭い範囲内に分布している。

2) 2 段あるモレーン（あるいは圏谷底）のうち、上段のモレーン（あるいは圏谷底）高度は 5,000m に強く集中分布している。

このように、氷河末端高度と上段のモレーンがそれぞれほぼ同じ高さに揃うのは、雪線高度と山稜の高度差が小さく各氷河の涵養量にそれほど差がないためと考えられる。

図 7 に示した上段モレーンあるいは下段モレーンが、それぞれ同じ気候変動の結果形成されたものであるか否かは、各モレーンにおける厳密な年代測定によって明らかにされるべきであるが、少なくとも上段のモレーンについては、モレーンの形状や植生状態、存在する高さな

図 7 Gyajo 山稜の東面（上）と西面（下）における氷河と圏谷底の高度に対する分布

どから、同時期に形成されたものと考えられる。そして、この上段のモレーンは最も新しい氷河の前進、すなわち1800年代のはじめから中頃にかけての前進によって形成されたものと推定される。

Gyajo 山稜の現在の氷河末端高度が5,400m に、上段モレーン高度が5,000m に集中的に分布することはすでに述べたが、以下では、この2つの値をそれぞれの代表値として、気候変動に関する議論をおこなう。

Gyajo 山稜に存在するような規模の小さい氷河では、氷河末端の変動は、氷河の平衡線の変動とほぼ平行的に起こると考えられる。したがって、5,000m のモレーンで示される氷河の前進、すなわち現在の末端高度からの400m の末端の低下は、ほぼそれに匹敵する平衡線の低下によって引き起こされたものと推定できる。したがって、若干の幅を見て、上段モレーンを形成した時期の平衡線の高さは、現在より300~400m 低かったものと考えられる。

3. で述べたように、ネパール・ヒマラヤの氷河の平衡線は、モンスーン期の気温と一義的な関係にある。この関係が、氷河の前進期においても成り立つものとするならば、300~400m の平衡線の低下は、湿潤なモン

ソンの気温減率を $-0.6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ とすれば、 $1.8\sim 2.4^{\circ}\text{C}$ の気温の低下を意味する。

現在のところ、ネパール・ヒマラヤの氷河における冬の気候の役割は明確でないが、以上に述べた Gyajo 山稜の約5,000m の高さにあるモレーンを形成した氷河の前進の原因をモンスーン期の気候だけから考えると、以上の推論でわかるように、約 2°C のモンスーン期の気温の低下に起因するという結論に達する。

6. D型氷河における問題点

(1) Dead ice の存在

Khumbu 氷河右岸にある Lobuje 氷河は写真5で見られるように、アイスフォール下端付近において2つの部分に分離している。上流側はアイスフォールから涵養域へと続き、表面に岩屑がほとんど見られないが、下流側は一面厚い岩屑に被われ、他の氷河の岩屑に被われた部分と同様に、多くの ablation lake が散在している。この下流部分は上流側と完全に分離していることから、活動を停止した dead ice と考えられる。

Müller (1958) は Khumbu 氷河において流動量測定を行い、末端から約2km のところの流速は0あるいはわずかに後向きであると報告している。測定点付近は表

面全体が岩屑に被われ、dirt cone や ablation lake が多数存在している。Müller の測定結果は、氷河の流動という面からだけであるが、Khumbu 氷河の岩屑に被われた氷舌部が、Lobuje 氷河と同様に広い範囲にわたって dead ice となっていることを示している。

Khumbu 氷河における dead ice の存在は、同時に、形態的に類似している他の D 型氷河にも dead ice が存在することを示唆する。

しかし、一般の D 型氷河では、dead ice は Lobuje 氷河のように分離していないため、外見的には dead ice かどうか判別しがたい。今後、他の D 型氷河においても、流動量測定を行う必要がある。

Lobuje 氷河に見られる分離した dead ice は、Tsola Khola (Imja Khola の一支流)でも見られる。このように、dead ice が消失せずに残存していることの要因として、まず、氷厚が大きかったことがあげられる。Dead ice が存在している場所の傾斜は非常にゆるく、そのために氷の厚さが厚くなり、上流からの補給を受けなくても残存できたと思われる。

次に、dead ice の表面が厚い岩屑に被われていることがあげられる。厚い岩屑は熱の伝達を阻害するため、融氷を抑制する効果がある。撒土による融雪促進および抑制の実験(孫野ほか, 1955; 森林ほか, 1972)やモレーン下の融氷量の測定(Loomis, 1970)によると、岩屑層の厚さが 1.5~4cm 以上になると融氷は抑制される。Dead ice 表面の岩屑層の厚さは数 10cm にも達しているので、当然大きな融氷抑制作用が考えられる。

(2) Active terminus について

Dead ice の存在と関連して、active ice の末端すなわち active terminus の位置について考えねばならない。

Lobuje 氷河のように dead ice が分離している氷河では、active terminus の位置は非常に明確であるが、一般の D 型氷河においては、active terminus の位置を決定するのは容易でないと思われる。

Active terminus の位置を厳密に決定するには、末端から氷河の縦軸方向に多数の測定点を設置して流動を測定する必要がある。しかし、氷河表面に見られる顕著な形態、たとえば、Khumbu 氷河や Ngojumba 氷河(写真 6)のアイスフォールの下に見られる岩屑に被われないアイスピナクル(氷塔)の列、ablation lake や dirt cone など氷河の活動性と何らかの係わりがあるように思われる。

このような特殊な形態と氷河の活動性の関係および、active terminus の位置決定法などが、今後の D 型氷河における主な問題点となろう。

7. あとがき

1970年の調査は、日本山岳会東海支部によるマカール学術遠征隊学術班の調査の一環として行われたものである。

本論文をまとめるにあたり、名古屋大学水圏科学研究所樋口敬二教授ならびに渡辺興亜助手に多大のご指導を得た。両氏および 2 度の調査に援助下さった名古屋大学水圏科学研究所樋口研究室の皆様にも厚く感謝する。

文 献

- 樋口敬二ほか, 1971: 劔沢における多年性雪溪の研究 (I). 雪氷, **32**, 6, 129-146.
- 樋口敬二, 1973: 雪害に関係する融解現象. 第10回自然災害科学特別研究中部地区シンポジウム, 静岡.
- 井上治郎, 1972: ヒマラヤ高山地域の気候. 1970年エベレスト登山隊報告書, 第Ⅱ部学術報告, 社団法人日本山岳会刊, 133-140.
- 伊藤秀雄, 1944: 降雪と気温. 天気予報資料抄録.
- Kick, W., 1962: Variations of some central Asiatic glaciers, variations of the regime of existing glaciers. Symposium of Obergurgl, I.A.S.H. Publ., **58**, 223-229.
- Loomis, S.R., 1970: Morphology and ablation processes on glacier ice. Icefield Ranges Research Project, American Geographical Society, **2**, 27-31.
- 孫野長治・熊井 基, 1955: 撒土融雪の熱学的研究. 雪氷の研究, 日本雪氷協会, **2**, 63-79.
- Müller, F., 1958: Eight months of glacier and soil research in the Mt. Everest Region. The Mountain World 1958/59, Swiss-Foundation for Alpine Research, George Allen & Unwin, London, 191-208.
- Müller, F., 1970: A pilot study for a inventory of the glaciers in the eastern Himalaya. Perennial Ice and Snow Masses, UNESCO, I.A.S.H.
- 森林成生・樋口敬二, 1972: 劔沢雪溪における融雪制御実験. 1972年度雪氷学会予稿集.
- 杉山一之, 1946: 雪の予報. 天気予報指針, 74-77.

On the Characteristics of Nepal Himalayan Glaciers
and Their Recent Variation

Shigeo MORIBAYASHI

(*Water Research Institute, Nagoya University, Nagoya*)

The glaciological investigations were carried out in the Mount Everest region, the Gaurisankar region and the Langtang region of the Nepal Himalaya in 1970 and 1971. Nepal Himalayan glaciers were classified into two types; debris-free glacier and debris-covered one. It is proposed in this paper to call the former the “Clean-type glacier” (C-type glacier) and the latter the “Dirty-type glacier” (D-type glacier).

The present termini of all C-type glaciers are located far from the fresh terminal moraines which can be assumed as corresponding to the moraine of the Little Ice Age in the Alps (1750-1850), but those of most of the D-type glaciers are not separate from the terminal moraines.

One of the characteristics of Nepal Himalayan glaciers is that the main contribution to the accumulation is snowfalls during the monsoon period (June-Sep.). Therefore, the height of snowline of such glaciers depends on air temperature during the monsoon period which may determine whether precipitation falls on glacier as snow or rain.

From the difference of height between the present terminus and the terminal moraine of C-type glaciers, it is conjectured that the air temperature during the monsoon period at the most recent advance of glaciers in the Nepal Himalaya was about 2°C lower than that of the present time.

(1973年10月13日受理)