ガスクロマトグラフィーによる食用油脂中のクエン酸 イソプロピルの分析法

(昭和 61 年 6 月 6 日受理)

加藤 クニ* 中岡 正吉* 伊藤 和敏*

Analysis of Isopropyl Citrates in Edible Oil by Gas Chromatography

Kuni KATO, Tadayoshi NAKAOKA and Kazutoshi ITO

(Kanagawa Prefectural Public Health Laboratories: 52-2,
Nakao-cho, Asahi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan)

An analytical method for isopropyl citrates (a mixture of mono-, di- and triisopropyl citrates) in edible oil by gas chromatography (GC) was developed.

Mono- and diisopropyl citrates were extracted with 1 *N* potassium hydroxide solution from a hexane solution of the edible oil, and triisopropyl citric acid was extracted with acetonitrile. The acetonitrile was evaporated off, and potassium hydroxide solution was added. Each potassium hydroxide solution was heated to hydrolyze the extract into isopropyl alcohol and citric acid. Isopropyl alcohol was distilled off and analyzed by GC. The remaining solution was passed through a column packed with ion exchange resin to remove potassium ion, and the eluate was evaporated to dryness. Citric acid was esterified to trimethyl citric acid with boron trifluoride methanol reagent and analyzed by GC.

In this method, isopropyl alcohol can be utilized for qualitative screening for isopropyl citrates, and the quantitative value of citric acid reflects that of isopropyl citrates.

Recoveries of isopropyl citrates added to oil were more than 90% for mono- and diester and about 75% for triester. The detection limits of isopropyl citrates via isopropyl alcohol were 2 $\mu\text{g/g}$ of sample.

(Received June 6, 1986)

Key words: クエン酸イソプロピル isopropyl citrate; 酸化防止剤 antioxidants; ガスクロマトグラフィー (FID) gas chromatography (FID)

はじめに

クエン酸イソプロピルは昭和58年に酸化防止剤として新たに許可された食品添加物である。

油脂におけるクエン酸と酸化防止剤との相乗作用はよく知られていることであるが、この作用を失わず、油脂への溶解性を高めたのがクエン酸イソプロピルである。食品添加物としてのクエン酸イソプロピルは、モノエステル約 27%、ジエステル 9%、トリエステル 2% 及びグリセリン脂肪酸エステル 62% の混合物といわれている¹⁾。その使用基準は油脂、バターにモノエステルとして 100 mg/kg 以下と定められている。

クエン酸イソプロピルの分析法については、辻ら²⁾はモノ、ジ、トリエステルを分別定量する方法を報告している。また牛山ら³⁾はクエン酸イソプロピルを加水分解し、クエン酸を高速液体クロマトグラフィーで測定する方法を報告しているが、回収率の面で問題を残している。

著者らはクエン酸イソプロピルをイソプロピルアルコールとクエン酸に加水分解し、イソプロピルアルコールをガスクロマトグラフィー (GC) で分析することにより、クエン酸イソプロピルのスクリーニングテストを行った。またイソプロピルアルコールが検出された場合には、クエン酸を定量し、クエン酸イソプロピルに換算する方法を検討したところ、良好な結果を得たので報告する。

* 神奈川県衛生研究所: 横浜市旭区中尾町 52-2

*¹⁾ 日本食品衛生学会第48回学術講演会講演要旨集 p. 36 (1984)

実験方法

1. 試料

輸入品の食用油（コーン油、オリーブ油、アーモンド油）及び国内産のバター、マーガリンを用いた。

2. 試薬

クエン酸イソプロピル：モノ、ジ、トリエステルは辻ら²⁾の方法によって合成、精製したものを用いた。

陽イオン交換樹脂：アンバーライト CG-120 Type 1 を用いた。

三フッ化ホウ素メタノール試薬：和光純薬工業(株)製ガスクロマトグラフ用三フッ化ホウ素メタノール錯塩を用いた。

その他試薬は和光純薬工業(株)製特級を用いた。

3. 装置

ガスクロマトグラフ：(株)島津製作所製 GC-7A 型 FID 付を用いた。

4. 標準溶液

クエン酸モノ、ジイソプロピルはエチルアルコールに、クエン酸トリイソプロピルはヘキサンに、クエン酸とイソプロピルアルコールは水に溶かし、それぞれ 1 $\mu\text{mol/ml}$ になるように調製した。

5. 操作法

1) クエン酸イソプロピルの定性

試料 5 g にヘキサン 20 ml 及び 1 N 水酸化カリウム溶液 30 ml を入れ、振とうし、ヘキサン層と水層に分ける。引き続きヘキサン層をヘキサン飽和アセトニトリル 50 ml で 2 回抽出し、アセトニトリル層を減圧下で濃縮乾固する。この容器に先の 1 N 水酸化カリウム溶液を入れ、冷却器をつけて加熱還流し、30 分間加水分解を行う。一度冷却した後、蒸留を行い、留液 3 ml をとり、4)-i) の条件で GC を行い、イソプロピルアルコールの分析を行う。

2) クエン酸イソプロピルの定量

1) の定性試験においてイソプロピルアルコールが検出された場合には、蒸留した残りの液をヘキサン 30 ml で洗浄した後、あらかじめ H 型に調製した陽イオン交換樹脂 (1 $\text{cm}^2 \times 7 \text{ cm}$) を通す。この流出液を濃縮乾固し、清野³⁾の方法に準じて三フッ化ホウ素メタノール試薬によるメチルエステル化を行う。冷後 10% 硫酸ナトリウム溶液 30 ml を入れ、ヘキサン 30 ml で洗浄後、酢酸エチル 30 ml で 2 回抽出を行う。酢酸エチル層を合わせ、水 10 ml で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで脱水後、減圧下で 2 ml まで濃縮し、試験溶液とする。この溶液について 4)-ii) の条件で GC を行い、クエン酸トリメチルを測定する。この定量値から 3) で述べる方法で測定した油脂中のクエン酸の定量値を差し引き、クエン酸モノイソプロピルに換算する。

3) 油脂中のクエン酸の分析

別に試料 5 g をとり、ヘキサン 20 ml 及び水 30 ml

を入れ、振とうし、ヘキサン層と水層に分ける。水層に 1 N 塩酸 3 ml を入れ、酢酸エチル 50 ml で 3 回抽出を行った後、水層を減圧下で濃縮乾固する。これに三フッ化ホウ素メタノール試薬を入れ、メチルエステル化を行い、以下 2) と同様に操作し、クエン酸トリメチルを測定する。

4) GC の条件

i) イソプロピルアルコールの測定

充てん剤：クロモソルブ 102 60~80 メッシュ

カラム管：3 mm i.d. $\times$ 2 m ガラス管

カラム温度：160°

注入口及び検出器温度：200°

キャリアーガス：N₂ 60 ml/min

ii) クエン酸トリメチルの測定

充てん剤：1% PEG 20M/クロモソルブ W. AW. 60~80 メッシュ

カラム温度：170°

カラム管、注入口及び検出器温度、キャリアーガスは

i) と同じ

結果及び考察

1. イソプロピルアルコールの蒸留による回収率

水 30 ml にイソプロピルアルコール 2 μmol (120 μg) 添加し、0.5 ml/min の速度で蒸留したところ、Fig. 1 に示すように留液を 2 ml とることにより、ほぼ 100% の回収率が得られた。実際の試験においては、イソプロピルアルコールの蒸留は油から抽出操作を行った 1 N 水酸化カリウム溶液中で行うことから、クエン酸イソプロピルが入っていないことを確認した油脂を使用し、実験方法 5-1) で操作して得られた 1 N 水酸化カリウム溶液にイソプロピルアルコール 2 μmol 添加し、蒸留したところ、水に添加したときと同様の結果であった。

2. イソプロピルアルコールのガスクロマトグラム

実験方法 5-1) で得られたイソプロピルアルコールのガスクロマトグラムを Fig. 2 に示した。(A) はコントロール (コーン油)、(B) はクエン酸イソプロピルを添加したコーン油から得られたものである。(A) にはイソプ

Fig. 1. Recovery of isopropyl alcohol in water by distillation

Fig. 2. Gas chromatograms of isopropyl alcohol derived from isopropyl citrates by alkaline hydrolysis

(A): control (corn oil)

(B): corn oil contained isopropyl citrates

GC conditions: column, Chromosorb 102 60~80 mesh (3 mm i.d. × 2 m); column temp., 160°C; carrier gas, N₂ 60 ml/min

ロピルアルコールの測定を妨害するピークは認められなかった。その他オリーブ油、アーモンド油、バター、マーガリンにも妨害ピークは認められなかった。

3. クエン酸のメチルエステル化による検量線

クエン酸の三フッ化ホウ素メタノール試薬によるメチ

Fig. 3. Caribration curve of citric acid methylesterified by boron trifluoride methanol reagent

ルエステル化の定量性を調べるため、クエン酸の標準溶液を希釈して5段階の濃度に調製し、それぞれ1 mlを減圧下で濃縮乾固し、以下5-3)の方法に従って検量線を作成したところ、Fig. 3に示すように原点を通る直線性を示した。

4. クエン酸トリメチルのGC測定におけるクリーンアップ

クエン酸イソプロピルを油脂に添加し、実験方法5-1), 2)に従って操作し、生成したクエン酸トリメチルを酢酸エチルで抽出すると、Fig. 4 (B)に示すように、妨害ピークの多いガスクロマトグラムを示した。しかし、クエン酸トリメチルはヘキサンにほとんど分配されないことから、酢酸エチルで抽出する前にヘキサンで洗浄を

Fig. 4. Gas chromatograms of trimethyl citrate derived from isopropyl citrates added to corn oil

(A): after hexane treatment

(B): before hexane treatment

GC conditions: column, 1% PEG 20 M/Chromosorb W AW 60~80 mesh (3 mm i.d. × 2 m); column temp., 170°C; carrier gas, N₂ 60 ml/min

Table 1. Recovery of Isopropyl Citrates Added to Edible Oil and Butter

Sample	Added ($\mu\text{mol}/5\text{ g}$)	Recovery*1 (%)					
		Mono-		Di-		Tri-	
		IPA*2	Citrate*3	IPA	Citrate	IPA	Citrate
Butter	2	94.3	91.2	93.3	93.0	75.4	74.8
Edible oil	2	96.2	95.5	91.3	90.5	73.3	77.9

IPA: isopropyl alcohol

*1 average of 2 trials

*2 recovery based on isopropyl alcohol

*3 recovery based on citrate

行くと、(A) に示すように妨害ピークの少ない、きれいなガスクロマトグラムが得られた。

5. 油脂中のクエン酸の分析

天然界にはクエン酸が含まれているものが多く、特に牛乳には 0.2% 前後のクエン酸が含まれ⁴⁾、バターにもクエン酸が含まれていることは周知のことである。

クエン酸イソプロピルを加水分解し、クエン酸を測定する 5-2) の方法は、試料に含まれているクエン酸が同時に測定されてしまうため、別に試料中のクエン酸を測定し、定量値を補正する必要がある。

クエン酸の定量は 5-3) に示すように、試料をヘキサンに溶かし、水により抽出を行う。その際クエン酸モノ、ジイソプロピルが同時に抽出されてしまうため、クエン酸とモノ、ジエステルを分離する方法を検討した。

油脂をヘキサンに溶かし、水 30 ml を入れて振とうし、その水層にクエン酸、クエン酸モノ、ジイソプロピルをそれぞれ 2 μmol 添加した。pH を約 1 に調整した後、酢酸エチル 50 ml で抽出したところ、ジエステルは、はじめの 50 ml でほぼ 100% 抽出され、モノエステルは 2 回抽出することによって、ほぼ 100% 抽出された。従って 3 回抽出することによってクエン酸とモノ、ジエステルは完全に分離することができた。

5-3) の方法により測定したバター 3 検体、マーガリン 2 検体のクエン酸含有量は 131~230 ppm であった。

6. 添加回収実験

油脂 5 g に 2 μmol のモノ、ジ及びトリエステルを別々に添加した 3 試料を調製し、それぞれ試験方法に従って加水分解を行い、生成したイソプロピルアルコールとクエン酸の測定を行った。これらの測定値を添加したそれぞれのクエン酸イソプロピルに換算し、回収率を求めた。結果を Table 1 に示した。油、バターからのモノ、ジエステルの回収率は良好といえるがトリエステルの回収率は低めであった。本試験は水溶液で加水分解を行っているため、脂溶性のトリエステルは前処理によって完全に除去できない油脂の中に溶けこみ、加水分解が行わ

れにくいものと思われる。クエン酸の測定値から換算した回収率とイソプロピルアルコールの測定値から換算した回収率はほぼ同じであった。

クエン酸イソプロピルの使用基準はモノエステルとして定められているため、実際の試験においてはイソプロピルアルコールから換算し、定量することはできない。しかしイソプロピルアルコールの分析はクエン酸イソプロピルのスクリーニングテストとして有効な手段であり、分析時間が非常に短縮される。

7. 食用油脂の調査

本試験法を用い、輸入品のオリーブ油 4 検体、アーモンド油 1 検体、コーン油 1 検体を調査したところ、クエン酸イソプロピルはすべて不検出であった。また国内産のバター 3 検体、マーガリン 2 検体も不検出であった。

ま と め

1. クエン酸イソプロピルをアルカリ加水分解し、生成したイソプロピルアルコールを GC で分析することにより、スクリーニングテストが可能であった。またイソプロピルアルコールが検出された場合には、クエン酸をメチルエステル化して測定し、クエン酸イソプロピルに換算し、定量値とすることができた。添加回収率はモノ、ジエステルは 90% 以上、トリエステルは約 75% であった。また、スクリーニングテストにおける検出限界は試料に対して 2 ppm であった。

2. 輸入品の油脂及び国内産のバター、マーガリンを調査したところ、クエン酸イソプロピルは検出されなかった。

文 献

- 1) 仲本典正, 平山佳伸, 松田 勉, 山本芳子: 食品衛生研究, **33**, 868~870 (1983).
- 2) 辻 澄子, 外海泰秀, 伊藤著志男, 原田基夫: 食衛誌, **26**, 357~364 (1985).
- 3) 清野 肇, 中里 敏, 三階貴男, 無類井健夫, 吉田治郎: 油化学 **26**, 405~410 (1977).
- 4) 穴釜雄三: "乳学" p. 75 (1975) 光琳書院.