疎性を利用によるロバスト半正定値計画法の効率化

猪 阪 佑 介*・大 石 泰 章*

Exploiting Sparsity in a Matrix-Dilation Approach to Robust Semidefinite Programming

Yusuke ISAKA* and Yasuaki OISHI*

A computationally improved matrix-dilation approach is proposed for a robust semidefinite programming problem, whose constraint is a polynomial of uncertain parameters. This approach utilizes a sparse structure of the constraint polynomial and produces a small-size approximate problem to a given robust semidefinite programming problem. It is proved that the optimal value of the approximate problem converges to that of the given robust semidefinite programming problem as the used division of the parameter region becomes finer. In this sense, this approach is asymptotically exact. The size of the approximate problem is evaluated in the degree of the polynomial and is compared with the existing matrix-dilation approach. A numerical example is presented for illustration.

Key Words: robust semidefinite programming, polynomial optimization, linear matrix inequalities, computational complexity

1. はじめに

半正定値計画問題は、組合せ最適化や制御の分野における多くの問題を記述することができる問題であり、内点法により高速に解けることが知られている。しかし現実には制約式に含まれるすべてのパラメータの真値がわかっているような状況は限定的であり、パラメータにある程度の余裕をもたせたい場合や誤差を含んだ推定値しかわからない場合が多い。ロバスト半正定値計画問題はこのような状況を定式化した問題であり、パラメータがとり得るすべての値において、半正定値制約を満たした上で目的関数を最適化することを考える。

ロバスト半正定値計画問題は一般に解くのが困難であり、制約式が不確かなパラメータに対してアフィンであるという比較的簡単な場合でさえ NP 困難であることが証明されている¹²⁾。そのため、もとのロバスト半正定値計画問題に近い最適値をもち、効率的に解くことのできる近似問題を構成するアプローチが考えられてきた。文献⁵⁾では、制約式が不確かなパラメータの有理関数である場合について近似問題を構成している。これは、不確かなパラメータの有理関数であるような状態空間表現（またはより一般的にディスクリプタ表現）は、不確かなパラメータを対角成分にもつ行列の線形分数変換で表わせるというロバスト制御の分野の結果^{26), 28)}を利用したものである。一方文献¹⁾では、制約式が不確かなパラメータ

に対してアフィンである場合を考え、近似問題とその近似誤差の定量的評価を与えている。

その後、制約式が不確かなパラメータの多項式である場合について、漸近的に厳密なアプローチが提案された。これは、近似問題のサイズが大きくなり、解くための計算量が大きくなることを許せば、いくらでも近似誤差を小さくできるような方法である。具体的には、Kalman–Yakubovich–Popov 補題を利用する方法^{2), 13)}、Pólya 緩和を利用する方法²²⁾、二乗和を利用する方法²³⁾がある。二乗和については文献^{7), 9), 17)}も参照されたい。文献^{6), 14)}で提案された行列拡大法（または領域分割法）もロバスト半正定値計画問題に対する漸近的に厳密なアプローチの一つであり、ディスクリプタシステムの表現の冗長性を利用する文献¹¹⁾の方法を文献^{4), 18)}に始まる行列拡大の方法を使って解釈しなおし、さらにロバスト半正定値計画問題に適用できるよう一般化したものである。この方法は、近似問題のサイズと近似誤差の大きさとの関係が定量的に得られているという点で他の漸近的に厳密な方法よりも優れている。一方で、行列拡大法もそのほかの方法も、実用的な問題に対しては近似問題のサイズが大きくなってしまいうという欠点がある。もとの問題の難しさから考えればこれはやむをえないことであるかもしれないが、実用的な問題の多くがもつ構造を利用することで近似問題のサイズを小さくできるという可能性が残っている。

以上を背景として本論文では、近似問題のサイズが小さくなるような新しい行列拡大法を提案する。鍵となるアイデアは、制約式をパラメータの多項式として展開したときに、係数が非零となる項はわずかであるという一種の疎性を仮定することである。この新しい行列拡大法も、従来の行列拡大法

* 東京大学大学院情報理工学系研究科

* Graduate School of Information Science and Technology, the University of Tokyo; Bunkyo, Tokyo
(Received June 26, 2006)

(Revised November 1, 2006)

と同様、漸近的に厳密であるという良い性質を保持している。すなわち、パラメータの領域を小さく分割すれば、対応する近似問題のサイズは大きくなるが、その最適値はもとのロバスト半正定値計画問題の最適値に収束することを示すことができる。本論文の議論を発展させて、分割の細かさと2つの最適値の差との間の定量的関係を得ることも可能である¹⁵⁾。

文献^{19), 21)}では、ロバスト制御に関する特殊なロバスト半正定値計画問題に対して、行列拡大法に密接に関係するアプローチが著者らとは独立に提案されている。ただし、その漸近的厳密性や疎性の利用については議論されていない。また文献^{8), 16), 27)}では、二乗和を利用する方法について疎性の利用が考えられている。本論文の方法とはかなり性質が異なるので、この方法との比較は興味深い問題であり、今後の研究課題である。文献²⁶⁾では行列変形によって近似問題のサイズを小さくする方法について論じており、目的は本論文のものに近い。しかし本論文では有向木を使うことにより、近似問題のサイズをどこまで小さくできるかや、サイズを最小化することの難しさについても論じている。

本論文の構成は以下のとおりである。2章では本論文で扱うロバスト半正定値計画問題を説明する。3章は本論文の中心となる章であり、疎性を利用した行列拡大法を示すとともに、その漸近的厳密性を示し、近似問題のサイズを評価する。4章では、3章で用いる有向木の構成法について考察する。5章で数値実験の結果を紹介し、6章でまとめを述べる。

また本論文で扱う記法についてまとめる。 $\mathbb{R}^n$ は n 次元ユークリッド空間とする。 T は行列やベクトルの転置を表わす。 O_{mn} , I_m はそれぞれ $m \times n$ の零行列, $m \times m$ の単位行列を表わす。誤解のおそれがないときには、単に O , I と書く。行列 A の最大特異値を $\bar{\sigma}(A)$ で表わす。 $\lambda(A)$ は対称行列 A の固有値の中で一番小さいものを表わす。 $\mathbb{Z}_+$ は非負整数の集合とする。 $\theta \in \mathbb{R}^p$, $\alpha \in \mathbb{Z}_+^p$ に対して θ^α は $\theta^\alpha = \theta_1^{\alpha_1} \theta_2^{\alpha_2} \cdots \theta_p^{\alpha_p}$ を表わすものとする。集合 $\mathcal{A}$ の要素の数を $|\mathcal{A}|$ で表わす。内点をもつ有界な凸多面体 Θ に対して $\text{ver}\Theta$ は Θ の頂点の集合を表わす。同じく Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}_{j=1}^J$ とは、 $\bigcup_{j=1}^J \Theta^{[j]} = \Theta$ かつ任意の $j \neq k$ に関して $\Theta^{[j]} \cap \Theta^{[k]}$ が内点をもたないような有界な凸多面体の族を指すこととする。

2. ロバスト半正定値計画問題

2.1 ロバスト半正定値計画問題の形式

本論文では以下のロバスト半正定値計画問題を取り扱う：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && F(x, \theta) \succeq O, \quad \forall \theta \in \Theta. \end{aligned} \quad (1)$$

ただし、 $c \in \mathbb{R}^n$ は与えられた定数ベクトル、 $x \in \mathbb{R}^n$ は最適化の変数であり、 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$ は不確かなパラメータを表わす。 $F(x, \theta)$ は $m \times m$ の対称行列であり、その成分は x についてアフィンでありかつ θ について多項式であるとする。また、 $i = 1, 2, \dots, p$ のそれぞれについて $F(x, \theta)$ の θ_i に

関する次数は d_i であるとする。不確かなパラメータの領域 Θ は内点をもつ有界な凸多面体であれば良いが、本論文では簡単のため適当に座標変換して $\Theta \subseteq [-1, 1]^p$ とする。

$\mathcal{F} = \{\alpha \in \mathbb{Z}_+^p \mid \alpha_i \leq d_i \ (i = 1, 2, \dots, p)\}$ とするとき $F(x, \theta) = \sum_{\alpha \in \mathcal{F}} F_\alpha(x) \theta^\alpha$ と表記できる。なお、 $|\mathcal{F}| = \prod_{i=1}^p (1 + d_i)$ である。

2.2 ロバスト半正定値計画問題の意義

ロバスト半正定値計画問題はつぎの例に見るように多くの応用をもつ。

例 1. (多項式最適化問題) $\theta \in \mathbb{R}^p$ の多項式である $f(\theta)$ についてつぎの問題を考える：

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && f(\theta) \\ & \text{subject to} && \theta \in \Theta. \end{aligned}$$

この問題はスカラーの補助変数 x を用いて以下のようにロバスト半正定値計画問題に変形することができる：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x - f(\theta) \geq 0, \quad \forall \theta \in \Theta. \end{aligned}$$

5章の数値実験においては、この例のように多項式最適化問題をロバスト半正定値計画問題に変換した形で実験を行なう。□

例 2. (状態空間システムの L^2 ゲイン解析問題) 係数行列 A , B , C , D が不確かなパラメータ $\theta \in \Theta$ の多項式で表わされるような状態空間システム

$$\begin{aligned} \dot{\xi} &= A(\theta)\xi + B(\theta)u, \\ y &= C(\theta)\xi + D(\theta)u \end{aligned}$$

が漸近安定であり入力 u から出力 y までの L^2 ゲインが γ 未満であるための十分条件は、任意の $\theta \in \Theta$ に対して

$$\begin{bmatrix} A(\theta)^T X + X A(\theta) + C(\theta)^T C(\theta) & X B(\theta) + C(\theta)^T D(\theta) \\ B(\theta)^T X + D(\theta)^T C(\theta) & D(\theta)^T D(\theta) - \gamma^2 I \end{bmatrix} \prec O$$

を満たすような正定値対称行列 $X \succ O$ が存在することである³⁾。

この問題は上式の左辺の行列を $M(\theta)$ とおくとつぎの最適化問題に帰着できる：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && y \\ & \text{subject to} && X \succeq -yI, \\ & && yI \succeq M(\theta), \quad \forall \theta \in \Theta. \end{aligned}$$

この最適化問題を解いて得られる最小値 y が負であれば上記の十分条件を満たす正定値対称行列 X が存在することがわかる。したがって、ロバスト半正定値計画問題として取り扱うことができる。□

3. 疎性を利用した行列拡大法

本章は本論文の中心となる章である。まず3.1節で従来の

行列拡大法¹⁴⁾を紹介した後、3.2節で疎性を導入する方法について説明する。その後3.3節と3.4節で疎性を利用した行列拡大法が従来の行列拡大法のもと漸近的厳密性を失うことなく保持していることを証明する。さらに3.5節で計算量に関して疎性を利用した行列拡大法が従来の行列拡大法よりも改善されていることを示す。

3.1 行列拡大法

文献¹⁴⁾では問題(1)の解をつぎのように求めている。

集合 $\mathcal{F}$ の要素を $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(|\mathcal{F}|)}$ のように番号付けする。ただし $\alpha^{(1)} = (0, 0, \dots, 0)$ とする。

このとき

$$F_*(x) = \begin{bmatrix} F_{\alpha^{(2)}}(x) & F_{\alpha^{(3)}}(x) & \cdots & F_{\alpha^{(|\mathcal{F}|)}}(x) \end{bmatrix},$$

$$M(\theta) = \begin{bmatrix} I_m & \theta^{\alpha^{(2)}} I_m & \theta^{\alpha^{(3)}} I_m & \cdots & \theta^{\alpha^{(|\mathcal{F}|)}} I_m \end{bmatrix}^T$$

と定めると

$$F(x, \theta) = \sum_{\alpha \in \mathcal{F}} F_{\alpha}(x) \theta^{\alpha} = \begin{bmatrix} F_{\alpha^{(1)}}(x) & F_*(x) \end{bmatrix} M(\theta) \quad (2)$$

となる。

このとき文献¹⁴⁾にあるように $\begin{bmatrix} H(\theta) & M(\theta) \end{bmatrix}$ がすべての $\theta \in \Theta$ について正則な正方行列となり、恒等的に $H(\theta)^T M(\theta) = O$ であり、しかも θ についてアフィンであるような行列 $H(\theta)$ が存在する。さらに行列 $G(x)$ を

$$G(x) = \begin{bmatrix} 2F_{\alpha^{(1)}}(x) & F_*(x) \\ F_*(x)^T & O \end{bmatrix} \quad (3)$$

として定める。

行列拡大法は、領域 Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}_{j=1}^J$ に対して、近似問題

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && G(x) + H(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H(\theta)^T \succeq O, \\ & && \forall \theta \in \text{ver} \Theta^{[j]}, \forall j = 1, 2, \dots, J \end{aligned} \quad (4)$$

を解く。問題(4)は有限個の半正定値制約をもつ通常の半正定値計画問題であることに注意する。

問題(4)の制約条件は元の問題(1)の制約条件の十分条件となっている。したがって、問題(4)の最小値は元の問題(1)の最小値の上界となる。一般に2つの最小値は一致しないが、3.4節で述べるように分割 $\{\Theta^{[j]}\}$ を細かくすることにより近似誤差を小さくすることができる。

3.2 疎性の導入

近似問題(4)の半正定値制約は行数、列数ともに $m \prod_{i=1}^p (1 + d_i)$ である。この大きさは(2)の展開における $F_*(x)$ の項数で決まり、次数 d_i の p 次多項式となっている。しかし実用上現れる多くのロバスト半正定値計画問題では、 $F_*(x)$ を構成する行列 $F_{\alpha}(x)$ のうち零行列でないものはわずかである

と考えられるので、この疎性を利用して計算に最低限必要な行列だけを取り出すことにより計算を効率化できると考えられる。

疎性を利用して $F_*(x)$ から計算に必要な行列だけを取り出したものを $F_{*sp}(x)$ とおき、対応する行列を $M_{sp}(\theta)$ とおく。 $F_{*sp}(x)$ および $M_{sp}(\theta)$ はつぎのようにして構成することができる。

集合 $\mathcal{A} = \{\alpha \in \mathcal{F} | F_{\alpha}(x) \neq O\}$ を考える。空間 $\mathbb{Z}_+^p$ において、原点を根とする有向木で集合 $\mathcal{A}$ の要素をすべて含むものを考えて T とおく。ただし、有向木 T の頂点は $\mathbb{Z}_+^p$ の点であり、枝は $\mathbb{Z}_+^p$ の2点を結ぶ長さが1の線分で座標の増加方向へ向き付けされているものとする。

有向木 T の頂点集合を $\mathcal{B}$ とすると、 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$ が成り立つ。 $\mathcal{B}$ の要素を番号付けて $\beta^{(1)}, \beta^{(2)}, \dots, \beta^{(|\mathcal{B}|)}$ と書く。ただし、 T の中に $\beta^{(q)}$ から $\beta^{(r)}$ への有向道があるならば $q < r$ となるように番号付けするものとする。 $\beta^{(1)} = (0, 0, \dots, 0)$ となることに注意する。

3.1節の議論において、 $\alpha^{(q)}$ ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{F}|$)の代わりに $\beta^{(q)}$ ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}|$)を用いることによって $F_{*sp}(x)$, $M_{sp}(\theta)$, $G_{sp}(x)$ を定める。

さらに、 $\begin{bmatrix} H_{sp}(\theta) & M_{sp}(\theta) \end{bmatrix}$ がすべての $\theta \in \Theta$ について正則な正方行列となり、恒等的に $H_{sp}(\theta)^T M_{sp}(\theta) = O$ であり、しかも θ についてアフィンであるような $m|\mathcal{B}| \times m(|\mathcal{B}| - 1)$ 行列 $H_{sp}(\theta)$ をつぎのようにして定める。すなわち $H_{sp}(\theta)$ を各ブロックが $m \times m$ 行列になるように分割し、 (q, r) ブロックを $H_{sp}(\theta)_{qr}$ ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}|$; $r = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}| - 1$)と書くことにすると

$$H_{sp}(\theta)_{qr} = \begin{cases} I_m & (q = r + 1), \\ -\theta_i I_m & (T \text{ 中で } \beta^{(q)} \text{ が始点, } \beta^{(r+1)} \text{ が終点} \\ & \text{であるような枝が第 } i \text{ 軸方向へ伸び} \\ & \text{しているとき}), \\ O & (\text{その他のとき}). \end{cases}$$

具体例を示す。

例 3. $m = 1$ とし、つぎの場合を考える：

$$F(x, \theta) = \theta_1^2 + 2\theta_1^2\theta_2^2 + 3\theta_1^4\theta_2.$$

この例において、集合 $\mathcal{A}$ の要素はFig. 1に示すとおりで

Fig. 1 Elements $\alpha^{(i)}$ of the set $\mathcal{A}$

Fig. 2 An example of the directed tree T

ある. $\mathcal{A}$ の要素を含む原点を根とする有向木で上の条件を満たすもののひとつとして Fig. 2 に示すものがあり, これを T とする. T の頂点を図のように $\beta^{(1)}, \beta^{(2)}, \dots, \beta^{(8)}$ と番号付けして, 順に並べると

$$F_{*sp}(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

$$M_{sp}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & \theta_1 & \theta_1^2 & \theta_1^2 \theta_2 & \theta_1^2 \theta_2^2 & \theta_1^3 & \theta_1^4 & \theta_1^4 \theta_2 \end{bmatrix}^T$$

を得る.

このとき, $H_{sp}(\theta)$ は

$$H_{sp}(\theta) = \begin{bmatrix} -\theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\theta_2 & 0 & -\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\theta_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

となる. $H_{sp}(\theta)$ は θ についてアフィンであり $H_{sp}(\theta)^T M_{sp}(\theta) = O$ という性質を満たしていることがわかる. $\square$

以上の行列を用いてつぎの問題を考える:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H_{sp}(\theta)^T \succeq O, \\ & && \forall \theta \in \text{ver}\Theta^{[j]}, \forall j = 1, 2, \dots, J. \end{aligned} \quad (5)$$

次節で述べるように問題 (5) の最小値は元の問題 (1) の最小値の上界となる. また, 領域 Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}$ を細かくすることにより両者の最小値の差を小さくすることができる. これが疎性を利用した行列拡大法である.

3.3 十分性

問題 (5) の制約条件は元の問題 (1) の制約条件の十分条件となっていることをつぎの定理で述べる. この定理により, 前節で述べた問題 (5) の最小値が, 元の問題 (1) の最小値の上界となることがわかる.

定理 1. 領域 Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}_{j=1}^J$ と $x \in \mathbb{R}^n$ が与えられて

いるとする. このとき, ある j ($j = 1, 2, \dots, J$) において, 任意の $\theta \in \text{ver}\Theta^{[j]}$ に対し

$$G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H_{sp}(\theta)^T \succeq O \quad (6)$$

を満たす θ に依存しない行列 $W^{[j]}$ が存在するならば, 任意の $\theta \in \Theta^{[j]}$ に対して $F(x, \theta) \succeq O$ が成立する. $\square$

証明. 任意の $\theta \in \Theta^{[j]}$ は適当な $\theta \in \text{ver}\Theta^{[j]}$ の凸結合として表現できる. $H_{sp}(\theta)$ は θ についてアフィンであるから, 同じ係数を用いた (6) 式の凸結合を考えれば

$$G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H_{sp}(\theta)^T \succeq O \quad (7)$$

が成り立つ. (7) 式の左右からそれぞれ $M_{sp}(\theta)^T$, $M_{sp}(\theta)$ をかければ, $H_{sp}(\theta)^T M_{sp}(\theta) = O$ であるから

$$\begin{aligned} O &\preceq M_{sp}(\theta)^T (G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H_{sp}(\theta)^T) M_{sp}(\theta) \\ &= M_{sp}(\theta)^T G_{sp}(x) M_{sp}(\theta) \\ &= 2F(x, \theta) \end{aligned}$$

となり定理が示される. $\square$

3.4 上界の収束性

この節では, 領域 Θ を小さく分割して個々の $\Theta^{[j]}$ が小さくなるようにすると, 問題 (5) の最小値が問題 (1) の最小値に収束することを示す. 議論を正確にするためにつぎの仮定をおく.

仮定 1. ある $\epsilon_0 > 0$ に対して

$$F(x, \theta) \succeq \epsilon_0 I, \quad \forall \theta \in \Theta$$

を満たす $x \in \mathbb{R}^m$ が存在する. $\square$

本節で示す定理はつぎのとおりである.

定理 2. 仮定 1 が成り立つとし, ϵ は $0 < \epsilon \leq \epsilon_0$ なる任意の実数とする. このとき $x \in \mathbb{R}^n$ が $F(x, \theta) \succeq \epsilon I$, $\forall \theta \in \Theta$ を満たすならば, 領域 Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}_{j=1}^J$ が存在して

$$\begin{aligned} & G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta)W^{[j]T} + W^{[j]}H_{sp}(\theta)^T \succeq O, \\ & \forall \theta \in \text{ver}\Theta^{[j]}, \forall j = 1, 2, \dots, J \end{aligned}$$

を満たす $W^{[j]}$ が存在する. $\square$

この定理が示されれば, 元の問題 (1) の最適解に近い x が, 問題 (5) の実行可能解になるように分割を選ぶことになる. 定理の証明からわかるように, 実際には分割を小さく選んでやればよい. 同様の性質は集合 $\mathcal{F}$ の元をすべて使って近似問題を作る従来の行列拡大法についても示されている⁶⁾. しかし, その証明で用いられている技法は $\mathcal{F}$ の元をすべて使う場合のみ適用できるのものであって, 今回のように $\mathcal{F}$ の部分集合 $\mathcal{B}$ の元を使って近似問題を作る場合には適用できない. そこで以下では座標変換行列 $S(\theta)$ を使うという新しい技法によって証明する.

この定理の証明するために準備を行なう.

まず座標変換行列 $S(\theta)$ を定める。 $S(\theta)$ は $m|\mathcal{B}| \times m|\mathcal{B}|$ の行列で、各ブロックが $m \times m$ の行列になるように分割し、 (q, r) ブロックを $S(\theta)_{qr}$ ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}|$; $r = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}|$) と書くとき

$$S(\theta)_{qr} = \begin{cases} \theta^{\beta^{(q)} - \beta^{(r)}} I_m & (T \text{ 中に } \beta^{(r)} \text{ から } \beta^{(q)} \text{ へ到達する} \\ & \text{有向道があるとき}), \\ O & (\text{上記のような有向道がないとき}) \end{cases}$$

と定める。

つぎに、行列 $H_{sp}(\theta')^T$ の右から行列 $S(\theta)$ をかけることを考える。結果は $m(|\mathcal{B}| - 1) \times m|\mathcal{B}|$ の行列となるが、これを各ブロックが $m \times m$ の行列になるように分割したときの (q, r) ブロック ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}| - 1$; $r = 1, 2, \dots, |\mathcal{B}|$) は

$$\sum_{u=1}^{|\mathcal{B}|} [H_{sp}(\theta')_{uq}]^T S(\theta)_{ur} \quad (8)$$

である。ここで $H_{sp}(\theta')_{uq}$ が非零になる u は定義より2つだけであり、ひとつは $u = q + 1$ であり、もうひとつは有向木 T 中で点 $\beta^{(q+1)}$ を終点とする唯一の枝の始点に対応する u で、これを q' と書くことにする。枝 $(\beta^{(q')}, \beta^{(q+1)})$ が第 i 軸に平行なとき

$$H_{sp}(\theta')_{uq} = \begin{cases} -\theta'_i I_m & (u = q'), \\ I_m & (u = q + 1) \end{cases}$$

である。和 (8) の値を考えるために、有向木 T の点 $\beta^{(r)}$ を根とする部分有向木を考えるとつぎの3つの場合に分かれる。

(a) 枝 $(\beta^{(q')}, \beta^{(q+1)})$ が考えた部分有向木に含まれる場合、和 (8) は

$$[-\theta'_i \theta^{\beta^{(q')}} + \theta^{\beta^{(q+1)}}] \theta^{-\beta^{(r)}} I_m = (-\theta'_i + \theta_i) \theta^{\beta^{(q')} - \beta^{(r)}} I_m.$$

(b) 枝 $(\beta^{(q')}, \beta^{(q+1)})$ の終点 $\beta^{(q+1)}$ が、部分有向木の根 $\beta^{(r)}$ と一致する場合、和 (8) は I_m 。

(c) 上記以外の場合、和 (8) は零行列。

なお (a) の場合は $r \leq q' < q + 1$ であり、(b) の場合は $r = q + 1$ であることに注意する。

以上の準備の下で定理2を証明する。

証明. $0 < \epsilon \leq \epsilon_0$ かつ $F(x, \theta) \succeq \epsilon I$, $\forall \theta \in \Theta$ となるような ϵ と x を考える。領域 Θ の分割 $\{\Theta^{[j]}\}_{j=1}^J$ に対して、 $j = 1, 2, \dots, J$ と $\theta \in \text{ver} \Theta^{[j]}$ を任意に選び、有界凸多面体 $\Theta^{[j]}$ が十分に小さければ

$$G_{sp}(x) + H_{sp}(\theta) W^{[j]T} + W^{[j]} H_{sp}(\theta)^T \succeq O \quad (9)$$

を満たす $W^{[j]}$ が存在することを示せばよい。有界凸多面体 $\Theta^{[j]}$ の大きさの指標として

$$\text{rad} \Theta^{[j]} = \min_{\theta \in \Theta^{[j]}} \max_{\theta' \in \Theta^{[j]}} \max_{i=1,2,\dots,p} |\theta_i - \theta'_i|$$

を考える。またこの定義において最小値を達成するような $\theta \in \Theta^{[j]}$ のひとつを $\Theta^{[j]}$ の中心と呼び θ^c と書く。

以下では

$$W^{[j]} = \frac{1}{\text{rad} \Theta^{[j]}} H_{sp}(\theta^c)$$

とおくとき、 $\text{rad} \Theta^{[j]}$ が十分に小さければ (9) が成立することを示す。これを示すことができれば定理が証明される。

先に定めた座標変換行列 $S(\theta)$ を用いて (9) を変換することを考える。まず (9) の第1項に関しては、 $G_{sp}(x)$ の構造と $S(\theta)$ が下三角行列であることにより

$$S(\theta)^T G_{sp}(x) S(\theta) = \begin{bmatrix} 2F(x, \theta) & F_*^\theta(x) \\ F_*^\theta(x)^T & O \end{bmatrix}$$

なる形を得る。ただし $F_*^\theta(x)$ は x と θ に依存するある $m \times m(|\mathcal{B}| - 1)$ 行列である。つぎに第2項を考えるために、 $S(\theta)^T H_{sp}(\theta)$ と $W^{[j]T} S(\theta)$ を考える。和 (8) に関する議論により

$$S(\theta)^T H_{sp}(\theta) = \begin{bmatrix} O_{m \times m(|\mathcal{B}|-1)} \\ I_m & & & \\ & I_m & & \\ & & \ddots & \\ & & & I_m \end{bmatrix},$$

$$W^{[j]T} S(\theta) = \begin{bmatrix} * & \frac{1}{\text{rad} \Theta^{[j]}} I_m & & & \\ * & * & \frac{1}{\text{rad} \Theta^{[j]}} I_m & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ * & * & \dots & * & \frac{1}{\text{rad} \Theta^{[j]}} I_m \end{bmatrix}$$

の形である。ただし、空白の部分は零行列であり、* の部分は零行列であるかまたは

$$\frac{1}{\text{rad} \Theta^{[j]}} (-\theta'_i + \theta_i) \theta^{\beta^{(q')} - \beta^{(r)}} I_m \quad (10)$$

の形の行列である。今 $\Theta \subseteq [-1, 1]^p$ であり、定義より $|\theta'_i + \theta_i| \leq \text{rad} \Theta^{[j]}$ であるから、スカラー行列 (10) の係数の絶対値は1以下である。以上より、(9) の第2項を $S(\theta)$ で変換したものは

$$S(\theta)^T H_{sp}(\theta) W^{[j]T} S(\theta) = \begin{bmatrix} O_{m \times m} & O_{m \times m(|\mathcal{B}|-1)} \\ H_1 & H_2 \end{bmatrix}$$

の形式に書くことができ、 $\text{rad} \Theta^{[j]}$ の値が十分に小さければ Gershgorin の定理により

$$H_2 + H_2^T \succeq \left[\frac{2}{\text{rad} \Theta^{[j]}} - (|\mathcal{B}| - 2) \right] I_m$$

である。また $\bar{\sigma}(H_1) \leq \sqrt{m(|\mathcal{B}| - 1)}$ である。(9) の第3項においても同様の性質が成り立つ。

以上をまとめると、(9) の左辺を $S(\theta)$ で変換したものにおいて (1, 1) ブロックは

$$2F(x, \theta) \succeq 2\epsilon I$$

を満たし、その Schur complement は

$$H_2 + H_2^T - (F_*^\theta(x) + H_1^T)^T [2F(x, \theta)]^{-1} (F_*^\theta(x) + H_1^T) \\ \succeq \left\{ \frac{2}{\text{rad}\Theta^{[j]}} - (|\mathcal{B}| - 2) - \frac{1}{2\epsilon} \{ \bar{\sigma}[F_*^\theta(x)] + \sqrt{m(|\mathcal{B}| - 1)} \}^2 \right\} I_m$$

を満たす。ここで右辺は、 $\text{rad}\Theta^{[j]}$ が十分に小さければ半正定値となるので、(9) が成り立つ。□

3.5 不確かなパラメータの次数に対する計算量

本節では、疎性を利用した行列拡大法が従来の行列拡大法よりも計算量が改善されていることを示す。具体的には、制約条件の大きさが小さくなっており、変数の数も少なくなっていることを示す。簡単のため、領域 Θ の分割を行わない場合に限定して議論する。分割を行なう場合も変数の数が増えるだけで同様に議論できる。

従来の行列拡大法が解く問題 (4) の制約条件の大きさは $m|\mathcal{F}| \times m|\mathcal{F}|$ であり、変数は $n + m|\mathcal{F}| \times m(|\mathcal{F}| - 1)$ 個である。ただし $|\mathcal{F}| = \prod_{i=1}^p (1 + d_i)$ である。一方、疎性を利用した行列拡大法が扱う問題 (5) では、有向木 T の頂点の数 $|\mathcal{B}|$ に対して、制約条件の大きさは $m|\mathcal{B}| \times m|\mathcal{B}|$ 、変数の数は $n + m|\mathcal{B}| \times m(|\mathcal{B}| - 1)$ 個である。集合 $\mathcal{A} = \{\alpha \in \mathcal{F} | F_\alpha(x) \neq 0\}$ に対して、定理 3 に示すように $|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{A}| \sum_{i=1}^p d_i + 1$ となるような有向木 T を作るができる。多項式の次数 d_i が大きくなれば明らかに

$$|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{A}| \sum_{i=1}^p d_i + 1 \ll |\mathcal{F}| \quad (11)$$

であるから、計算量が改善されていることがわかる。

定理 3. 集合 $\mathcal{A}$ に対して、その頂点集合 $\mathcal{B}$ が

$$|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{A}| \sum_{i=1}^p d_i + 1 \quad (12)$$

を満たすような有向木 T が存在する。

証明. 集合 $\mathcal{A}$ の任意の要素 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$ に対して頂点集合

$$\{(\beta_1, 0, \dots, 0) | \beta_1 = 0, 1, \dots, \alpha_1\} \\ \cup \{(\alpha_1, \beta_2, 0, \dots, 0) | \beta_2 = 0, 1, \dots, \alpha_2\} \\ \cup \dots \cup \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{p-1}, \beta_p) | \beta_p = 0, 1, \dots, \alpha_p\}$$

を考え、これらを長さ 1 で座標軸に平行であり、座標の増える向きに向き付けされた有向枝で結び有向道を構成する。 $\alpha_i \leq d_i$ であるからこの有向道の長さは $\sum_{i=1}^p d_i$ 以下である。集合 $\mathcal{A}$ の各要素に対して同様の有向道を構成し、それらの合併を T とする。 T は明らかに有向木である。 T の枝数はその構成方法から $|\mathcal{A}| \sum_{i=1}^p d_i$ 以下である。よって T に含まれる頂点の数は高々 $|\mathcal{A}| \sum_{i=1}^p d_i + 1$ である。□

4. 小さい有向木の構成方法

本章では有向木 T の構成方法について述べる。簡単なのは定理 3 の証明のように構成する方法であり、この方法によって (12) 式を満たす有向木を得ることができる。さらに小さな

有向木を得たい場合のために以下の考察を行なう。

4.1 Rectilinear Steiner Arborescence

本論文で考えた、与えられた集合 $\mathcal{A}$ に対する有向木 T は、 $p = 2$ の場合 Rectilinear Steiner Arborescence と呼ばれる。最も小さい Rectilinear Steiner Arborescence を見つける問題は NP 困難であることが証明されている²⁴⁾。そのため、最も小さい有向木を求めることは現実的ではない。代わりに、実用的な大きさの有向木を実用的な計算時間で求めるようなヒューリスティックなアルゴリズムを提案する。次節にそのアルゴリズムを示す。なお、文献²⁰⁾では別のヒューリスティックな方法が提案されている。

4.2 ヒューリスティックなアルゴリズム

このヒューリスティックなアルゴリズムの概要を述べる。

はじめに、集合 $\mathcal{A}$ の要素を $\min(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$ の昇順に番号付けをして $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(|\mathcal{A}|)}$ とする。これは $\alpha^{(q)}$ を p 本ある座標軸との距離が近い順に並べることを意味している。

つぎに、原点を有向木 T とみなし、昇順に並べた $\alpha^{(q)}$ を順に付け加えて有向木 T を大きくしていくという作業を繰り返す。このとき $\alpha^{(q)}$ の付け加え方は一意でないが、最終的に得られる有向木 T ができるだけ小さくなるような付け加え方を選ぶようにする。

具体的な手順はつぎのとおりである。

0. 確定リスト $\mathcal{D}_L$ と未確定リスト $\mathcal{N}_L$ を用意する。このリストは $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$ を要素としてもつ。初期状態は、 $\mathcal{D}_L = \{(0, 0, \dots, 0)\}$, $\mathcal{N}_L = \emptyset$ とする。 $|\mathcal{D}_L|$ および $|\mathcal{N}_L|$ は要素の個数を表すものとする。

1. 集合 $\mathcal{A}$ の要素を $\min(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$ の昇順に $\mathcal{N}_L$ へ入れる。入れた順番に $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(|\mathcal{A}|)}$ と番号付けする。

2. $\mathcal{N}_L$ の先頭から要素をひとつ取り出し、 $s = (s_1, s_2, \dots, s_p)$ とおく。要素がなければ終了する。

3. $\mathcal{D}_L$ の要素 $t^{(q)} = (t_1^{(q)}, t_2^{(q)}, \dots, t_p^{(q)})$ ($q = 1, 2, \dots, |\mathcal{D}_L|$) の中で、 $t_i^{(q)} \leq s_i$ ($i = 1, 2, \dots, p$) を満たすすべての要素のうち $\max_q (\sum_{i=1}^p t_i^{(q)})$ となる q を求め $u = t^{(q)} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ とおく。

4. もし $\sum_{i=1}^p (s_i - u_i) = 1$ ならば s を $\mathcal{D}_L$ へ入れて 2 へ戻る。そうでないならばつぎへ進む。

5. 集合 $\mathcal{E} \in \mathbb{Z}_+^p$ は、成分の 1 つだけが非零であり、残る $p - 1$ 個の成分がすべて 0 であるベクトルの集合とする。 k 番目の成分が 1 であり残りがすべて 0 であるベクトルを $e_k \in \mathcal{E}$ と書く。 $u + e_k = (u_1, u_2, \dots, u_k + 1, \dots, u_p)$ に対して集合 $\mathcal{V}_k = \{s \in \mathcal{N}_L | s - (u + e_k) \in \mathcal{E}\}$ を定める。 $\max_k |\mathcal{V}_k|$ ($k = 1, 2, \dots, p$) となる k を求め、 $v = u + e_k$ とおく。

6. v を確定リストへ入れ 3 に戻る。

このヒューリスティックなアルゴリズムが終了したとき、確定リスト $\mathcal{D}_L$ の要素を順に取り出すことで $M_{\text{sp}}(\theta)$ が得られる。 $M_{\text{sp}}(\theta)$ に対応する係数を並べることで $F_{\text{sp}}(x)$ も得られる。

5. 数値実験

前節のアルゴリズムを用いて疎性を利用した行列拡大法を実装し、従来の疎性を利用しない行列拡大法との比較実験を行なった。

両手法とも、解くべき半正定値計画問題を Java プログラムで出力させその問題をパーサー YALMIP¹⁰⁾を通して半正定値計画問題のソルバーである SeDuMi²⁵⁾を利用して解いた。疎性を利用した行列拡大法では、有向木 T を前節で述べたヒューリスティックなアルゴリズムにより求めた。

数値実験の問題としては多項式最適化問題に由来するつぎのロバスト半正定値計画問題を使用した。なお、領域は分割せず Θ 全体をひとつの領域とした上で実験を行なっている。これは、後に **Table 1** で示すように、両手法とも領域を分割せずとも十分に良い精度の解が得られたためである。

数値実験は、Pentium4 1.7GHz の CPU と 512 MB のメモリを積んだ計算機環境で行なった。

問題 1.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + 3 + 4\theta_1 + 4\theta_2 + 2\theta_1^2 + 2\theta_1\theta_2 + 2\theta_2^2 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^2. \end{aligned}$$

問題 2.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (\theta_1 - \theta_2)^2 + (\theta_2 - 1)^3 \geq 0, \quad \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^2. \end{aligned}$$

問題 3.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (-1)\theta_1^2\theta_2 + \theta_1\theta_2\theta_3 + (-1)\theta_2\theta_3^2 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^3. \end{aligned}$$

問題 4.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (\theta_1 - \theta_2)^2 + (\theta_2 - \theta_3)^2 + (\theta_3 - 1)^2 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^3. \end{aligned}$$

問題 5.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (\theta_1 - \theta_2)^2 + (\theta_2 - \theta_3)^2 + (\theta_3 - 2)^3 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^3. \end{aligned}$$

問題 6.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (\theta_1 - \theta_2 - \theta_3)^2 + (\theta_1 - 2\theta_2)^3 + \theta_3 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^3. \end{aligned}$$

問題 7.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + (\theta_1 - 3\theta_2)^3 + (\theta_2 - 2\theta_3)^3 \geq 0, \\ & && \forall \theta \in \Theta = [0, 1]^3. \end{aligned}$$

問題 8.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x \\ & \text{subject to} && x + 100(\theta_2 - \theta_1^2)^2 + (1 - \theta_1)^2 + 90(\theta_4 - \theta_3^2)^2 \\ & && + (1 - \theta_3)^2 + 10(\theta_2 + \theta_4 - 2)^2 + 0.1(\theta_2 - \theta_4)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

Table 1 Comparison of the obtained optimal values between the proposed and existing matrix-dilation approaches

Problem	Proposed app.	Existing app.	Optimal value
1	-3.0000	-3.0000	-3.0000
2	1.0000	1.0000	1.0000
3	1.0000	1.0023	1.0000
4	-1.4020E-10	-2.4108E-7	0.0000
5	8.0000	8.0000	8.0000
6	7.0000	7.0000	7.0000
7	28.0000	28.0000	28.0000
8	-6.1549E-7	—	0.0000

Table 2 Comparison of the sizes of constraints and the computational time between the proposed and existing matrix-dilation approaches

Problem	Proposed approach		Existing approach	
	Size	Comp. time(s)	Size	Comp. time(s)
1	6×6	0.52	9×9	0.66
2	7×7	0.85	12×12	1.02
3	7×7	0.74	18×18	3.36
4	9×9	1.28	27×27	15.49
5	10×10	1.07	36×36	91.48
6	14×14	1.08	48×48	266.14
7	16×16	2.05	64×64	2527.00
8	16×16	3.74	225×225	—

$$\forall \theta \in \Theta = [0, 1]^4.$$

結果を Table 1 と **Table 2** に分けて示す。

Table 1 には両手法の求解値を、Table 2 には両手法の制約条件の大きさと半正定値計画問題の求解に掛かった計算時間を示した。なお、表中の“—”は解が求められなかったことを表わしている。

まず Table 1 では、いずれの手法も解析解に近い解を得ることができていることがわかる。一般的には、分割を固定した場合、疎性を利用した行列拡大法の近似精度は疎性を利用しない行列拡大法に比べて悪くなると考えられる。しかし少なくともこの数値実験に関しては、顕著な近似精度の悪化は認められなかった。

一方で Table 2 を見ると、制約条件の大きさは疎性を利用した行列拡大法のほうが従来の行列拡大法よりも明らかに小さい。また、制約条件の大きさが大きくなるほど計算に時間が掛かっており、制約条件の大きさを小さく抑えることができる疎性を利用した行列拡大法が速く解を求めることができていくことがわかる。

6. おわりに

本論文では、従来の行列拡大法に疎性を導入することにより、近似問題の大きさが不確かなパラメータの次数の線形であるようなアルゴリズムを提案した。従来の行列拡大法との比較実験を行なった結果、疎性を導入した行列拡大法のほうが高速に問題を解くことができていることがわかっており、疎性を利用して制約条

件の大きさを抑える今回の手法が有効であることが示された。

なお、行列 G として変数 x だけでなくパラメータ θ にアフィンに依存するものを考えることによって、近似問題のサイズをさらに小さくすることができる。また、有界凸多面体 $\Theta^{[j]}$ が区間の直積である場合には、行列 G, H として θ_i と $\theta_j (i \neq j)$ の積を含むかもしれないが各 θ_i に関してアフィンなものを考えることによって、さらにサイズを小さくすることができる。しかし、こうした近似問題に関して 3.4 節の漸近的厳密性の議論や文献¹⁵⁾の近似誤差評価が拡張できるかどうかは明らかではない。

謝辞 Rectilinear Steiner Arborescence に関してご教示下さった中央大学理工学部情報工学科の松井知己教授に感謝致します。また、6 章で述べた、近似問題のサイズをさらに小さくする方法についてご指摘下さった査読者の方に感謝致します。本研究は 21 世紀 COE プログラム情報科学技術戦略コアおよび科学研究費補助金の援助を受けています。

参 考 文 献

- 1) A. Ben-Tal and A. Nemirovski: Robust convex optimization, *Mathematics of Operations Research*, **23**-4, 769/805 (1998)
- 2) P.-A. Bliman: On robust semidefinite programming, *Proceedings of the 16th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2004)*, Leuven, Belgium (2004)
- 3) S. Boyd, L. El Ghaoui, E. Feron and V. Balakrishnan: *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory*, SIAM, Philadelphia, USA (1994)
- 4) M.C. de Oliveira, J. Bernussou and J.C. Geromel: A new discrete-time robust stability condition, *Systems & Control Letters*, **37**-4, 261/265 (1999)
- 5) L. El Ghaoui, F. Oustry and H. Lebret: Robust solutions to uncertain semidefinite programs, *SIAM Journal on Optimization*, **9**-1, 33/52 (1998)
- 6) 江本, 大石: 有理式で表わされる不確かさをもつ制御系の解析・設計法, 計測自動制御学会論文集, **41**-4, 314/321 (2005)
- 7) M. Kojima: Sums of squares relaxations of polynomial semidefinite programs, Technical Report B-397, Department of Mathematical and Computing Sciences, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan (November 2003)
- 8) M. Kojima and M. Muramatsu: An extension of sums of squares relaxations to polynomial optimization problems over symmetric cones, *Mathematical Programming*, available online.
- 9) J.B. Lasserre: Global optimization with polynomials and the problems of moments, *SIAM Journal on Optimization*, **11**-3, 796/817 (2001)
- 10) J. Löfberg: YALMIP: a toolbox for modeling and optimization in MATLAB, *Proceedings of the CACSD Conference*, Taipei, Taiwan (2004), available from <http://control.ee.ethz.ch/~joloef/yalmip.php>
- 11) 増淵, 示村: ゲインスケジューリング系の設計におけるディスクリプタ形式の利用について, システム制御情報学会論文誌, **12**-7, 390/394 (1999)
- 12) A. Nemirovskii: Several NP-hard problems arising in robust stability analysis, *Mathematics of Control, Signals, and Systems*, **6**-2, 99/105 (1993)
- 13) A. Ohara and Y. Sasaki: On solvability and numerical solutions of parameter-dependent differential matrix inequality, 第 1 回計測自動制御学会制御部門大会予稿集, 京都, 61/64 (2001)
- 14) Y. Oishi: A region-dividing approach to robust semidefinite programming and its error bound, *Proceedings of the 2006 American Control Conference*, Minneapolis, USA, 123/129 (2006)
- 15) Y. Oishi and Y. Isaka: Reduction of the size of constraints in the region-dividing approach to robust semidefinite programming, 第 35 回計測自動制御学会制御理論シンポジウム予稿集, 大阪, 321/326 (2006 年 9 月)
- 16) P.A. Parrilo: Exploiting algebraic structure in sum of squares programs, *Positive Polynomials in Control*, D. Henrion and A. Garulli, Eds. Berlin, Germany: Springer, 181/194 (2005)
- 17) P.A. Parrilo: Semidefinite programming relaxations for semialgebraic problems, *Mathematical Programming*, **96**, 293/320 (2003)
- 18) D. Peaucelle, D. Arzelier, O. Bachelier and J. Bernussou: A new robust D -stability condition for real convex polytopic uncertainty, *Systems & Control Letters*, **40**-1, 21/30 (2000)
- 19) D. Peaucelle, Y. Ebihara, D. Arzelier and T. Hagiwara: General polynomial parameter-dependent Lyapunov functions for polytopic uncertain systems, *Proceedings of the 17th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2006)*, Kyoto, Japan, 2238/2242 (July 2006)
- 20) S.K. Rao, P. Sadayappan, F.K. Hwang and P.W. Shor: The rectilinear Steiner arborescence problem, *Algorithmica*, **7**, 277/288 (1992)
- 21) M. Sato and D. Peaucelle: Robust stability/performance analysis for linear time-invariant polynomially parameter-dependent systems using polynomially parameter-dependent Lyapunov functions, *Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control*, San Diego, USA, 5807/5813 (December 2006)
- 22) C.W. Scherer: Relaxations for robust linear matrix inequality problems with verifications for exactness, *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, **27**-2, 365/395 (2005)
- 23) C.W. Scherer and C.W.J. Hol: Matrix sum-of-squares relaxations for robust semi-definite programs, *Mathematical Programming*, **107**-1/2, 189/211 (2006)
- 24) W. Shi and C. Su: The rectilinear Steiner arborescence problem is NP-complete, *SIAM Journal on Computing*, **35**-3, 729/740 (2006)
- 25) J.S. Sturm: SeDuMi 1.02, a MATLAB toolbox for optimization over symmetric cones, *Optimization Methods and Software*, **11**/12, 625/653 (1999), available from <http://sedumi.mcmaster.ca/>
- 26) 杉江, 川西: 厳密な物理パラメータ変動表現に基づく μ 解析, 計測自動制御学会論文集, **31**-12, 1936/1944 (1995)
- 27) H. Waki, S. Kim, M. Kojima and M. Muramatsu: Sums of squares and semidefinite program relaxations for polynomial optimization problems with structured sparsity, *SIAM Journal on Optimization*, **17**-1, 218/242 (2006)
- 28) K. Zhou, J.C. Doyle and K. Glover: *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA (1996)

[著者紹介]

猪 阪 佑 介

2006年東京大学工学部計数工学科卒業。現在、東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修士課程。学士(工学)。グラフ・ネットワーク論、最適化問題などに興味をもつ。

大 石 泰 章 (正会員)

1993年東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了。95年同専攻助手。2001年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻講師。現在に至る。博士(工学)。ロバスト制御、サンプル値制御、数値計画法アプローチに興味をもつ。システム制御情報学会などの会員。