悪性線維性組織球腫

悪性線維性組織球腫診断例

— 悪性線維性組織球腫と思われた1例 —

宮本 智子* 臼井恵太郎*
出光 俊郎* 矢尾板英夫*

Summary

We present a patient of a 63-year-old male who has been suffered from slightly red thumb-head sized tumor on his right wing nose. The tumor was growing rapidly and jutted out into the nasal membrane. Histological findings revealed that the slightly atypical fibroblast-like and histiocyte-like tumor cells grew from the upper dermis of the skin to the pro lamina propria mucosae of the nasal mucous membrane.

We compared this tumor with other fibrohistiocytic tumor, clinically and histologically, therefore we thought that the diagnosis of this case might be MFH after all.

緒 言

軟部腫瘍の中で線維性組織球性腫瘍は、未だ分類が一定されておらず未解決の問題を多く含んでいる。悪性線維性組織球腫 (Malignant fibrous histiocytoma; 以下 MFH と略す) は、その中で発生頻度の高い腫瘍である。しかし、MFH は組織像が多彩であるため鑑別を要する腫瘍也多岐にわたり、組織像の難しい肉腫の waste paper basket となっている可能性もある。今回我々は、clinical には経過が速く再発性であるが、histological には異型性は軽度であり、MFH と考えた1例を経験したので、免疫組織化学的検索も含め、他の線維性組織球性腫瘍と比較、検討し報告する。

症 例

患 者：63歳，男性，農業

初 診：平成3年8月27日

主 訴：右鼻翼部の紅色結節

家族歴：母に高血圧症，長女にアレルギー性鼻炎。

既往歴：3年前に痛風のため内服治療。

現病歴：昭和63年8月頃，右鼻翼部に半米粒大紅色丘疹が出現した。約2ヵ月で大豆大ほどになり，近医で全摘出された。平成2年12月頃，同部に同様の丘疹が出現し徐々に拡大し母指頭大ほどになり，当科を受診した。

現 症：右鼻翼部に2.9×2.8×1.9cmの暗紅色弾性硬の結節があり，その周囲には0.5～1.3cm大ほどの範囲に境界不明瞭な紅斑と毛細血管拡張を認めた。毛細血管拡張は結節の部分にも認められた(図1)。結節は鼻腔の粘膜部分にも連続して認められた(図2)。

* Tomoko MIYAMOTO, Keitaro USUI, Toshio DEMITSU, Hideo YAOITA: 自治医科大学皮膚科学教室

図 1. 臨床像 (鼻翼側)

図 2. 臨床像 (鼻腔側)

組織学的所見：鼻翼側の真皮上層から鼻腔粘膜固有層にかけて主に、軽度の異型性を有する紡錘形の核と細長い細胞質を有する細胞と、胞体の明るい類円形の細胞の密な増殖を認めた。その内部には、異型巨細胞や storiform-pattern の形成も散見された (図 3, 4)。

免疫組織化学的所見：表 1 に示す 9 種の染色を施行した。腫瘍細胞は M-Actin, Vimentin 陽性であった。CD34 は陰性であった。

入院時検査所見：尿酸値の軽度上昇以外に血液一般、生化学検査にて異常所見は認められなかった。また、胸部 X 線、頭蓋骨 X 線、頸部 CT、表在性リンパ節エコー、全身ガリウムシンチグラフィにて MFH の転移を疑わせる所見は認められなかった。

治療および経過：結節周囲の紅斑より約 3 cm 離して、骨膜、筋膜を含め全切除した。切除

部には、右前頭部より scalping-flap で鼻部の形成を行った (図 5, 6, 7)。術後約 2 年経過した現在まで再発、転移を認めていない。

図 3. 病理組織所見。
HE 染色, 異型巨細胞や storiform-pattern の形成を認める

図 4. 病理組織所見。
HE 染色, 軽度の異型性を有する紡錘形の核と細長い細胞質を有する細胞と胞体の明るい類円形の細胞の密な増殖を認める

表 1. 免疫組織化学所見

M - Actin;	(+)
Vimentin;	(+)
Lysozyme;	(-)
α_1 - AT;	(-)
S - 100 Protein;	(-)
N S E ;	(-)
Desmin;	(-)
Myosin;	(-)
Factor VIII;	(-)
C D 34 ;	(-)

図 5. 右前額部に鼻翼部分を形成

図 6. 腫瘍切除部を scalping-flap で形成

図 7. 術後 6 ヶ月

考 察

線維性組織球腫の criteria は、組織球、泡沫細胞、長紡錘形の線維芽細胞様細胞、多核巨細胞の増殖ならびに紡錘形細胞の storiform-pattern を特徴とする軟部の増殖性病変とされている²⁾。Stout (1960年) により fibrous xanthoma の名称で最初に報告されたが³⁾、O'Brien

ら (1964年) は fibrous xanthoma の悪性型として、MFH の診断名を最初に用いた⁴⁾。その後、Weiss, Enzinger らや、本邦では橋本、遠城寺らなどにより、多数の MFH の症例について検討がなされているが、良性、悪性と明確に分けられない症例もみられる^{5)~8)}。自験例の病理組織像は、先述のように、多核巨細胞を混じた組織球様細胞と線維芽細胞様細胞主体の一部 storiform-pattern を呈する増殖であり、泡沫細胞は認めず、細胞に大小不同や核のクロマチンに富んだものはみられたが、核分裂像は数視野に 1 個みられる程度だった。臨床像、経過を考慮しなければ、反応性の増殖をも考えさせるほどであった。鑑別疾患としては、Reticulohistiocytoma, Plexiform fibrohistiocytic tumor, Dermatofibrosarcoma protuberans, Atypical fibroxanthoma などが挙げられる (表 2)。Reticulohistiocytoma は、成人の頭頸部に好発する、好酸性でガラス様外観の豊富な胞体を持つ組織球の密な増殖と、Touton 型巨細胞が多数みられることを特徴とするが、自験例では Touton 巨細胞は認められず、大きさ、深達度、Lysozyme 染色の所見 (表 2) から、否定的と思われた。Plexiform fibrohistiocytic tumor は、線維性組織球腫と線維腫瘍の双方を思わせ

表2. 線維性組織球形腫瘍と本症例との鑑別点

	Reticulohistiocytoma	Plexiform fibrohistiocytic tumor	DFSP	AFX	MFH	自験例
好発年齢	成人	小児～若年成人 (平均14.5歳)	青少年 (20～40歳)	①老人 (平均69歳) ②青少年 (39歳)	成人 (50～70歳)	63歳
好発部位	頭頸部	上肢 (特に肩、前腕)	軀幹、四肢	①頭頸部 (特に鼻、頬、耳) ②軀幹、四肢	四肢	右鼻翼部
大きさ	通常径0.5～2cm	通常径3cm以下	大型化あり	通常径3cm以下	大型化あり	3.0×2.5×2.0cm
深達度	真皮上層	真皮下層～皮下組織	真皮～皮下組織 ～筋、筋組織	真皮上層～下層	真皮～ 皮下組織	鼻翼部真皮浅層～ 鼻腔側粘膜固有層
組織像						
多型性	(±)		(-)	(++)	(++)	(+)
異型性	(-)		(±)	(++)	(+)	(+)
分裂像	(-)		(±)	(++)	(++)	(+)
storiform pattern	(-)	(-)	(++)	(±)	(+)	(±)
線維芽細胞様細胞		(+)	(++)	(+)	(+)	(+)
組織球様細胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
異型巨細胞	(±)		(-)	(+)	(+)	(+)
その他	Touton型巨細胞	叢状の増殖パターン				
免疫染色						
S-100	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Lysozyme	(+)	(-)	一部 (+)		(-)	
α ₁ -AT		(+)	一部 (+)	(+)	(+)	
CD 34			(+)		(-)	(-)
悪性度	良性群	中間悪性群	中間悪性群	悪性群	悪性群	

AFX : Atypical fibroxanthoma

DFSP : Dermatofibrosarcoma protuberans

MFH : Malignant fibrous histiocytoma

る腫瘍細胞が、叢状または結節状の増殖パターンをとることを特徴とする疾患である。自験例にも、叢状の増殖パターンとも思われる部位があったが、好発年齢、好発部位、発育速度、深達度とも通常の Plexiform fibrohistiocytic tumor とは異なっており (表2)、やはり否定的と思われた。Dermatofibrosarcoma protuberance は、紡錘形の腫瘍細胞が、storiform-pattern に配列し、どの部分をとっても同じ所見がみられることが特徴であるが、自験例では、storiform-pattern 様の配列のみられる部位は少ない印象だった。また、最近 DFSP が抗CD-34抗体陽性であるという報告があるが⁸⁾、我々の症例は抗CD-34抗体陰性 (表1) であり、これらの所見より DFSP の可能性は少ないと考えられる。Atypical fibroxanthoma は、MFH の浅在性に発生したものであり組織像では区別することが困難である¹⁾⁶⁾。自験例では腫瘍細胞は鼻翼部真皮浅層から鼻腔側粘膜固有層にまで到っており、AFX とは考えにくい。

以上のように、組織像に免疫組織化学的所見、

年齢、部位、大きさ、深達度、発育速度などを合わせて考慮すると、異型性の点で疑問が残るものの、やはり MFH が最も近いと考えられた。遠城寺らは、MFH の中でも核分裂数が20視野に30個以上のもの、骨格筋に浸潤があるもの、後腹膜や腸間膜に発生したもの、大きさ6cm以上であるものを予後不良であると報告している⁹⁾。自験例は核分裂数が少なく、鼻翼部に発生したもので、大きさも6cm以下であるが、鼻翼部の真皮浅層より筋層へ浸潤性に増殖し鼻腔粘膜固有層にまで達しており、予後不良の素因を含んでいる。またその急速な増大傾向を示した経過から考えても、悪性のものを考えさせる。自験例のような症例を、MFH の名で呼ぶことが適当であるのか、どのように位置づけるべきか、MFH の腫瘍細胞の起源とともに今後の検討、解明に期待する。

最後に本症例において御協力下さった自治医科大学一般外科 平林慎一先生、病院薬理部 斉藤建先生に深謝致します。

文 献

- 1) 湯本東吉：軟部腫瘍の病理，特に MFH を中心にして．西日皮膚，54(2)：219-231，1992.
- 2) Stout, A.P., Latter, R.: Tumors of the soft tissues; in Atlas of Tumor Pathology, 2nd ed. (Robert, W., et al. ed.), AFIP, Washinton DC, 1967, pp. 38-51.
- 3) Stout, A.P.: Fibrous tumors of the soft tissues. Minn. Med., 43: 455-459, 1960.
- 4) O'Brien, J.E., Stout, A.P.: Malignant fibrous xanthoma. Cancer, 17: 1445-1455, 1964.
- 5) Weiss, S.W., Enzinger, F.M.: Cancer, 41: 2250-2266, 1978.
- 6) Enzinger, F.M., Weiss, S.W.: Soft tissue tumors, 2nd ed., C.V., Mosby, Co. St., Louis, 1988, pp. 269-300.
- 7) 橋本洋：福岡医誌，70: 585-613, 1979.
- 8) 田畑伸子，他：臨皮，47(5増)：111-114, 1993.
- 9) 遠城寺宗知，橋本洋：病理と臨床，2: 82-88, 1984.