治療に難渋した巨大癰痕癌の3例

種々の理由により治療に難渋した巨大癰痕癌の3例

土井 秀明* 久徳 茂雄* 小川 豊*

Summary

Three cases of giant cancer-in-scar, which histopathologically were diagnosed as squamous cell carcinoma with some complications and our therapeutic approach are introduced.

To our experience, two of the most important operative points for cancer-in-scar could be extensive resection of tumor and related lymphatics, and reconstructive procedure using free skin graft in initial step. However in some compromised patients with high demand for quality of their life (cosmetically or functionally), more advanced operative method such as pedicled or free flaps could be performed initially. Even in such cases the size of tumor resection should not be compromised.

In the course of treatment of cancer-in-scars collaboration of pathologists, dermatologists and experienced plastic surgeons in early stage could drastically present disastrous outcomes.

はじめに

癰痕が長期間の経過中に悪性腫瘍の発生母地となり得ることは、Celsusによって紀元1世紀初期に最初の記載があるとされる¹⁾。その後、1828年のMarjolinの記載以後Marjolin's ulcerと呼ばれ²⁾、一般に知られるところとなり数多くの報告がみられる^{3)~5)}。

癰痕癌は各種の癰痕に生じるが火炎による深い熱傷由来の癰痕の報告が多く⁶⁾、部位的には頭部や下腿といった直下に骨組織があり、癰痕拘縮を合併している例が多いとされる。この場

合、基底細胞癌⁷⁾、線維肉腫²⁾⁸⁾、悪性黒色腫⁹⁾の報告もみられるが、最も多いのは有棘細胞癌²⁾⁴⁾⁵⁾で、後期の急速な増大と浸潤、転移により不幸な転帰をとることとなる。

有棘細胞癌に代表される癰痕癌では放射線療法や化学療法よりも所属リンパ節郭清を含む広範囲切除が原則となる¹⁾¹⁰⁾が、合併症やQOLを考慮することで手術計画が制限されることもあり、術前に再建をも考慮した十分な手術計画を必要とする。様々な理由で治療に難渋した3例を報告し、我々の施設での癰痕癌に対する治療方針を紹介する。

症 例

症例1：54歳、男性

* Hideaki DOI, Shigeo KYUTOKU, Yutaka OGAWA：関西医科大学形成外科学教室

3年前、溶接のスパークで頸部に熱傷を受けたという。受傷範囲は直径約1cm程度で自宅にて軟膏を塗布していた。3ヵ月前より同部に疣贅状の隆起性病変が出現、急速に増大し14×6cmの悪臭を伴うカリフラワー状の腫瘤を呈したが放置していた。会社の定期健康診断の心電図で異常を指摘され、当院循環器内科を受診、心房細動の診断にて入院となった。入院時、患者が主治医に頸部病変について相談し当科紹介となった。受傷から腫瘍発生までの期間が3年未満と非常に急速な経過であったが、初診時の肉眼的所見(図1)から癰疽癌(有棘細胞癌: T_3, N_0, M_0)と診断し手術を計画した。合併症に難治性の不整脈と巨大な胃潰瘍があり複数回の手術は不可能と判断し、一次的な拡大腫瘍切除と左頸部リンパ節郭清を行い、遊離前腕皮弁による再建を行った。切除標本の組織学的所見(図2)では癌真珠の形成と著明な炎症細胞浸潤を伴う異型性のある有棘細胞の増殖を認め、一部で基底層の破壊像もみられ有棘細胞癌と確定診断された。

術後1年経過(図3)し、再発、転移は認めない。皮弁周囲の癰疽拘縮を認めるが心房細動による心不全と胃潰瘍が存在し、局所麻酔による手術も不可能で現在経過観察中である。

症例2: 64才、男性

30年前に列車事故にて他院で右下肢の股関節離断と左足の遊離植皮術を受けている。最近、左踵部に潰瘍が出現し、歩行時の疼痛を主訴に近医皮膚科を受診、有棘細胞癌(T_3, N_0, M_0)と診断され当科紹介となった(図4)。膝下切断の適応と考えられたが既に右下肢を失っており、左下肢の温存を強く希望した。そのため骨膜上で広範囲腫瘍切除(図5-a, b)を行い、荷重のかかる踵部は内側足底筋膜皮弁で、非荷重部は遊離分層植皮により再建した(図6)。切除標本の組織学的所見(図7)では基底層を破壊し真皮上層から下層にまで浸潤する大小不同の異型細胞が認められ、癌真珠や不全角化も認められ有棘細胞癌の確定診断を得た。術後経過は良好

図1. 症例1. 当科初診時

図2. 症例1. 切除標本組織像(HE染色 100倍)

図3. 症例1.
術後1年、皮弁辺縁部の癰疽拘縮を認める

で術前と同様、右下肢に義肢を装用し一本杖歩行が可能となり十分な満足が得られた。しかし約1年半後、同部に骨浸潤を伴う再発を来し、左下腿切除を余断なくされた。

症例3: 34才、女性

幼少時期、いろうりに転落し頭部に熱傷を受け、保存的治療で癰疽治癒したという。数年前より同部に潰瘍が出現した。某病院脳神経外科にて頭蓋骨骨髓炎の診断のもとに複数回の腐骨除去

術を受けたが治癒せず、拡大傾向を示すため当科を紹介された(図8)。生検病理組織標本で(図9)表皮と連続する大小不同の異型細胞からなる腫瘍塊が多数みられ、癌真珠の形成も認められ有棘細胞癌(T_4, N_2, M_0)と診断された。頭蓋内浸潤と直径約20cm大の広範な頭蓋骨欠損(図10)があり、切除後の頭蓋骨再建が不可能と判断し手術は行わなかった。ペブレオマイシンの全身投与と5FU軟膏の局所使用で経過観察を行ったが、入院4ヵ月目に腫瘍部より髄液瘻を認めた。網状遊離植皮とスパイナルドレナージで髄液瘻は軽快したが、初診後6ヵ月で死亡した。剖検にて後頭骨から側頭骨にかけての骨破壊像と右側頭葉への腫瘍浸潤(図11-a, b)を認めた。

図5．症例2．(a)外踝部。
術中、腫瘍を骨膜を残し切除

図6．症例2．術直後、内側足底筋膜皮弁にて踵を再建、周囲は遊離分層植皮を行った

図4．症例2．当科初診時

図5．症例2．(b)踵部。
術中、腫瘍を骨膜とともに切除

図7．症例2．切除標本組織像
(HE染色 200倍)

図8. 症例3. 当科初診時,
右後方より見た後頭部

図9. 症例3. 生検標本組織像
(HE染色 200倍)

図10. 症例3. 当科初診時,
頭部単純レントゲン側面像

図11. 症例3. (a)頭蓋底,
剖検時, 骨破壊を認める

図11. 症例3. (b)脳標本.
剖検時, 右側頭葉から後頭葉への腫瘍浸潤
を認める

考 察

瘢痕癌の治療方針として, 手術が第一選択となる。

手術を行うに当たって切除範囲 (広さ, 深さとリンパ節郭清の有無) の決定が重要であるが, 瘢痕の存在によって瘢痕癌の深達度が見誤られ易いこと, 先行する潰瘍病変に対する一種の慣れから受診が遅れる傾向があることなどから, 一般の有棘細胞癌の切除方針である腫瘍辺縁よ

り3 cmの切除範囲を基本としつつも、症例に応じて中枢側でやや広めに切除する方針をとっている。また、瘢痕の残存は今後も瘢痕癌が発生する可能性を残すこととなるため可及的に切除するようにしている。この時、瘢痕の切除とともに瘢痕拘縮を解除することが極めて重要となる。瘢痕拘縮が瘢痕癌発生に密接に関係するからである。

切除の深さは深筋膜などのバリエーションとなる組織を含めて切除するが、深達度の浅い腫瘍では浅筋膜下での切除を行っている。リンパ節郭清も積極的に行うこととしている。

手術療法の計画で第2に重要な点は再建方法である。切除後の再建方法は再発を容易に確認できる遊離植皮術を第一選択としているが、足底などの慢性の刺激を受ける部分や整容的に重要な露出部などでは有茎皮弁や遊離皮弁で再建する。厚い皮弁下での再発を早期に発見するため、遊離植皮術を行った症例より頻回の画像診断を中心とした検査を行い慎重に経過観察を行う必要がある。

再建方法によって切除範囲を制限することは原則として行うべきではない。複数の皮弁や遊離植皮術の組み合わせで再建を行うことが可能となるからである。

これらの手術計画に従って手術が行われるが、術中の迅速病理検査などで切除範囲の拡大や再建方法の変更を必要とすることは術前計画の一部として考慮しておくべきである。

化学療法については基本的に行っていない。例外的に高度浸潤例や手術不能例ではペブレオマイシンによる化学療法を行う場合がある。瘢痕癌に対する放射線療法は行っていない。

自験症例のうち、症例1は内科的疾患の合併から手術が困難であった。このような場合は、術前に内科、麻酔科、形成外科合同の検討会を行い、侵襲の少ないより確実な手術法をみつけ出さなければならない。症例2では術後の患者の生活を考え、下肢切断を避ける手術法を選択している。このように患者のQOLを十分に考

慮した手術法の選択もまた重要となる。症例3では早期診断の誤りによって腫瘍浸潤が高度となり、手術を行い得なかった。瘢痕の上に隆起や浸潤をみる潰瘍が出現した場合は常に瘢痕癌を念頭に置き、安易な治療を避けなければならない。しかしながら、本邦において瘢痕癌は形成外科や皮膚科以外の一般の医師にはあまり知られておらず、単純な難治性潰瘍として漫然と保存的治療が行われ、かなり進行した状態で皮膚外科医に紹介されることが多い。

瘢痕癌の治療において早期発見と確実な外科的切除と整容的、機能的な再建を行うことが重要であるのは皮膚外科医にとっては日常的なことである。しかし、早期発見を行うためには瘢痕癌の知識は熱傷患者、形成外科医や皮膚科以外の一般の医師にも広く求められるものである。

結 語

合併症や術後のQOLを考慮することで治療に難渋した瘢痕癌の3例を報告し、我々の瘢痕癌に対する治療方針を紹介した。

本論文の要旨は第12回日本皮膚悪性腫瘍学会総会・学術大会（於：長野県松本市）にて発表した。

文 献

- 1) 杉原平樹：熱傷。杉本侃，大浦武彦編，第1版，南江堂，東京，1982，548-564。
- 2) Treves, N., Pack, G.T.: The development of cancer in burn scars. Surg. Gynecol. Obstet., 51: 749-782, 1930.
- 3) Arons, M.S., Lynch, J.B., Lewis, S.R., et al.: Scar tissue carcinoma. Part 1. A Clinical study with special reference to burn scar carcinoma. Ann. Surg., 161: 170-188, 1965.
- 4) 藤田英輔，木下啓介，山下慶一郎：瘢痕癌について—熱傷瘢痕癌を中心として—。臨床皮膚，28：429-442，1974。
- 5) 難波雄哉，柳瀬勝之，堀内英俊：自験例からみた瘢痕癌。形成外科，16：549-556，1973。

- 6) Coburn, R.J.: Malignant ulcers following trauma. In Cancer of the skin, Andrade, R., ed., Saunders, Philadelphia, 1976, pp. 939-949.
- 7) Lawlence, E.A.: Carcinoma arising in the scars of thermal burns: with special reference to the influence of the age at burn on the induction period. Surg. Gynecol. Obstet., 95: 579-588, 1952.
- 8) 鳥居修平, 秦維郎, 波利井清紀, 他: 熱傷瘢痕より生じた線維肉腫の1例. 熱傷, 3: 47-49, 1977.
- 9) 桐山保夫, 北村弥, 飯岡昭子, 他: 同一熱傷瘢痕上に棘細胞癌と悪性黒色腫が同時に発生した1例. 皮膚臨床, 19: 233-239, 1977.
- 10) 添田周吾: 熱傷・その他の物理的損傷. 図説臨床形成外科講座8, 難波雄哉, 他編, 第1版, メジカルビュー社, 東京, 1988, pp.200-203.