悪性線維性組織球腫

Cervico-facial flap により再建した 悪性線維性組織球腫の1例

岡 敏行^{*1} 百束 比古^{*1} 糸井由里恵^{*1}
青木 律^{*1} 秋元 正宇^{*2} 青木見佳子^{*3}

Summary

Malignant fibrous histiocytoma (MFH) is a malignant tumor of the soft tissue which is mainly found extremities and breech. We showed five cases of MFH we had experienced, and we reported one case with MFH of the face, who is 92-year-old female. She visited us with the complaint of the nodule on her left cheek in 1996. Skin biopsy was performed and the pathological report showed MFH.

According to the general examinations, there was no metastasis. Wide excision was performed with maximal 5cm margin and zygomatic bone was partially resected. The tissue defect was reconstructed with a cervico-facial flap, glabellar flap and skin grafting.

If the first operation is inappropriate, MFH tends to recur and metastasize. So enough resection is necessary. A cervico-facial flap does not require microsurgery and gives us cosmetically excellent results. We conclude that a cervico-facial flap is suitable reconstructive method in this case.

Key words : Malignant fibrous histiocytoma (MFH), Cervico-facial flap, Reconstruction

はじめに

悪性線維性組織球腫（以下 MFH と略す）は、主に中高年に発生し、四肢、臀部に好発する皮膚軟部組織悪性腫瘍である。治療においても、組織学的悪性度の高さから、外科的切除が第一選択とされている。今回我々は、顔面に発生し、急速な発育を示した MFH に対して再建を行う

機会を得たので報告するとともに、我々が今までに経験した過去の症例についても言及する。

症 例

患 者：92 歳，女性

初 診：1996 年 5 月 30 日

主 訴：左頬部の腫瘍

現病歴：約 5 年前より左頬部に小豆大黒褐色の結節が出現し、その後徐々に増大してきた。1996 年 4 月末頃より急速に増大し、出血も認められてきたため近医皮膚科受診、同年 5 月 28 日当院皮膚科受診し悪性皮膚腫瘍の疑いのもと、バイオプシー施行後、5 月 30 日手術的に当科

*1 Toshiyuki OKA, Hiko HYAKUSOKU, Yurie ITOI, Ritsu AOKI：日本医科大学付属病院形成外科

*2 Masataka AKIMOTO：日本医科大学千葉北総病院形成外科

*3 Mikako AOKI：日本医科大学皮膚科

図1. 初診時臨床像

図2. CT スキャン像
腫瘍は骨とわずかに接している

図3. 皮膚生検後の臨床像とMRI

紹介となった。

初診時所見(図1): 腫瘍は左頬部やや中央より鼻側寄りに存在し、大きさは $2.7 \times 2.5 \times 1$ cmの弾性硬、黒褐色を呈し、広基性に隆起していた。境界は不明瞭であり、周囲との可動性は不良であった。頸部、耳前部のリンパ節は触知しなかった。

臨床検査成績: 入院時の末梢血、尿、胸部X線像、心電図など一般検査所見は正常であった。また、全身CT、Ga シンチグラム等の全身検索において所属リンパ節、遠隔臓器への転移

は認められなかった。顔面のCT像には腫瘍は一部、骨と僅かに接して描出された(図2)。

経過: 皮膚科での皮膚生検にて間葉系悪性腫瘍が疑われ、初診より3週後には腫瘍は $6 \times 6 \times 3$ cmにまで増大してきた(図3)。

手術: 1986年6月21日、腫瘍辺縁より最大5cm離し皮切を加え、周辺部は下眼瞼を含め、鼻部正中は鼻翼軟骨膜上より剥離し、腫瘍底部は上顎骨の一部を含め上顎洞粘膜を残し、拡大切除を行った(図4)。腫瘍切除後の皮膚軟部組織欠損部は約 10×11 cmの範囲となった。

図4. 術前デザイン

図5. 術後の状態

図6. 術後3週の状態

図7. 典型的な storiform pattern はみられない

頸部リンパ節郭清は行わなかった。

組織欠損部は同側乳様突起下部を茎とし、大きさ約 15×8 cm の Cervico-facial flap を広頸筋を含めて挙上し、さらに前額部に Glabellar flap を作成し左内眼角部を再建した。これらの皮弁でも被覆しきれなかった鼻背部の組織欠損には下腹部よりの遊離分層植皮術を追加した。下眼瞼部には同側より耳介軟骨を移植した。皮弁採取部は可能な限り縫縮したが一部植皮を追加せざるを得なかった(図5)。皮弁および植皮はほぼ完全生着した(図6)。

病理組織学的所見：腫瘍細胞は好酸性の胞体を有する紡錘形，短紡錘形，あるいは類上皮細胞で，束を作り増生，交錯しているが，典型的な storiform pattern はみられない(図7)。腫瘍細胞の異型性，多形性は極めて強く，多数の細胞分裂像，異型分裂像がみられる(図8)。一部では破骨型巨細胞様の大型細胞が認められる(図9)。

本症例では紡錘型細胞の増生を主体とし，異型性，多形性が極めて強く，巨細胞を混じていることから，明らかな storiform pattern を欠い

図 8. 腫瘍細胞の拡大像

図 9. 一部に巨細胞も認められた

ているが、最終的に MFH と診断した。

結 果：当院退院後は患者の自宅が遠いこともあり、定期的なフォローアップはできていないが、患者家族へ電話で問い合わせたところ、術後2年を経過し、局所再発は今のところは認められず、縫合線の赤みも消え患者本人は整容的にも十分満足しているとのことであった。

考 察

MFH は主に四肢、臀部に好発するが顔面に発生した例においては形成外科の手技が必要となってくる。顔面における外科的手技の原則として、(1)縫合線を可能なかぎりエステティックユニットに一致させること、(2)テクスチャ、カラーマッチの観点からできるだけ局所皮弁を植皮に優先させる、といったことが重要である¹⁾。

Cervico-facial flap は 1979 年、Juri らにより発表された²⁾。この皮弁は cheek rotation flap と Stark らが報告している³⁾ cervical rotation skin flap を合成した皮弁であり、下眼瞼と頬部の大きな皮膚欠損の同時再建に適している。この皮弁の特徴として(1)縫合線がエステティックユニットに一致させやすいので瘢痕が目立たない(2)皮膚の色調やテクスチャが良く適合する(3)皮弁の血行が安定している(4)大きな頬部の皮膚欠損を被覆できる、などが挙げられる⁴⁾。

今回の症例においては、腫瘍拡大切除後にお

表 1. 1980 年から 1998 年において当科にて手術を施行した MFH の 5 例

症例	年齢	性	部位	性状、大きさ	再建法
1	43 才	男	左頬部	小指頭大、半球状	free DP flap
2	66	女	右前腕	2 × 1 cm, 半球状	mesh skin graft
3	53	男	右下腿	2 × 1 cm, 半球状	cross-leg F-C flap
4	75	女	左頬部	小指頭大、半球状	skin graft
5	55	男	右側胸部	手拳大、凸凹不整	F-C flap

ける頬部皮膚軟部組織欠損が広範囲であったため、先に述べた Juri's cervico facial flap の様なデザインはできなかった。今回用いた皮弁は cheek flap よりも、cervical flap に近いデザインで挙上し、乳様突起後方を茎とし、頬部に反時計周りに移動した。しかし、頬部の皮弁も同時に挙上する点において cervical flap とは異なっており、便宜上 Cervico facial flap と呼ぶことにした。

表 1 にこれまで当科で経験した MFH を列挙する⁵⁾⁶⁾。症例は 1980 年から 1998 年の 18 年間において当科にて手術を施行した 5 例である。年齢は 43 歳から 75 歳、平均年齢は 58.4 歳であった。発生部位は顔面 2 例、上肢 1 例、体幹 1 例、下肢 1 例で、性状は 4 例が半球状であった。転帰として、症例 5 のみ死亡しているが、これは当科紹介の前に他医にて再発、転移を繰り返し、計 26 回の手術を行った症例である。

図10. 症例1の術前（左），術後（右）

図10は先に紹介した症例1の術前，術後の状態である。左頬部のMFHであり腫瘍辺縁より4cm離して切除を行った。この症例は年齢も43歳と若いため局所皮弁を用いての被覆は不適當であると判断し，遊離皮弁の適応と考え，遊離DP皮弁により再建を行った。

今回の症例に関しては(1)患者が高齢であり，(2)腫瘍は顔面に発生し，大きなものであったことから，症例1の様な根治的手術よりも，手術侵襲が比較的少なく，術後の整容面を重視した手技が必要であったと思われる。よって本症例に対して本皮弁は良い適応であったと思われる。

結 語

最近経験した顔面に発生したMFHの1例について再建手術を中心に発表した。MFHは局所再発傾向が強く初回手術を誤ると再発を繰り返し，転移を来す事が多いので十分な切除が必要であるが，顔面に関しては時には拡大切除ではなく患者のQOLを重視した治療法が必要となる。今回我々が用いた cervico facial flap はこ

のようなMFH摘出後の大きな皮膚欠損を被覆するには非常に有効な皮弁であると思われた。

なお，本論文の要旨は第14回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（1998年7月11日，於横浜）において発表した。

文 献

- 1) 児島忠雄，木下行洋，新橋武，他：植皮か皮弁かの適応についてのわれわれの見解．形成外科，33(7):621,621-630,1990.
- 2) Juri, J., Juri, C.: Advancement and rotation of a large cervico facial flap for cheek repairs. Plast. Reconstr. surg., 64:692-696, 1979.
- 3) Stark, R., Kaplan, J. M.: Rotation flaps, neck to cheek. plast. Reconstr. Surg., 50:230-233, 1972.
- 4) 山田敦，波利井清紀，吉村浩太郎，他：Juri, cervico facial flap の変法による頬部の再建．形成外科，36(6):619-625,1993.
- 5) 秋元正宇，百束比古，白井洋司，他：悪性線維性組織球腫（MFH）の5例の治療経験．形成外科，34:191-198,1991.
- 6) 百束比古，末延自顕，白井洋司，他：顔面に発生した悪性線維性組織球腫も1例．形成外科，25:506-509,1982.