腋窩 Paget 病

腋窩 Paget 病の 1 例

青木 律* 梅田 敏彦* 白井 洋司* 百束 比古*
 文入 正敏* 青木美佳子** 本田 光芳**

Summary

腋窩 Paget 病の 1 例を報告した。乳房外 Paget 病の予後は一般に良好とはいえず、治療に関しては扁平上皮癌に準じた手術が必要であると考えられた。

緒 言

Paget 病はその発生部位より乳房 Paget 病と乳房外 Paget 病に分類され、その好発部位としては乳房の他に外陰部、腋窩、肛門が挙げられる。本症は同部の湿疹様症状と、Paget 細胞と称される、明るい原形質を持つ大型で類円形の細胞によって特徴付けられる。乳房外 Paget 病はそのほとんどが外陰部に発生し、腋窩や肛門にのみ発生するものは稀である。また、病変は通常長期間上皮内に止まるが、放置すると浸潤し、リンパ節転移、遠隔転移をきたすため、近年は癌前駆症とするよりも癌そのものと見なすべきだという傾向にある。

我々は腋窩に発生した乳房外 Paget 病の 1 例を経験したので報告し、手術範囲の選択についての若干の考察を加える。

症 例

患 者：66歳，女

初 診：昭和61年 8 月

家族歴・既往歴：特記することはない。

現病歴：昭和61年 5 月ごろ、左腋窩部に紅斑を認めたが自覚症状なく放置していたところ徐々に拡大したため、当院皮膚科外来を受診した。直ちに皮膚生検施行し、Paget 病の診断で手術目的にて当院形成外科紹介となった。

入院時現症：左腋窩部に 4 cm × 2 cm の一部辺縁不整の楕円形の紅斑を認めた。自覚症状はなく、また乳房および外陰部など含め他部位に病変は認められなかった(図 1)。所属リンパ節は触知せず、また病変下床に腫瘤を触知しなかった。

治療および経過

手術は病巣辺縁より 5 cm 離して切開し、下層は筋膜上にて一括して病巣部を摘出した(図 2)。同時に腋窩リンパ節郭清術を施行し、下腹部より 20/1000 インチの遊離分層植皮にて欠損

* Ritsu AOKI, Toshihiko UMEDA, Hiroshi SHIRAI, Hiko HYAKUSOKU, Masatoshi FUMI-IRI : 日本医科大学形成外科学教室

** Mikako AOKI, Mitsuyoshi HONDA : 日本医科大学皮膚科学教室

図 1. 左腋窩部の 4 cm × 2 cm の紅斑

図 2. 病巣は筋膜上にて切除した

図 3. 術後 5 年の写真。上肢の十分な挙上が可能である

部を被覆した。術後 5 年を経た現在、再発は認められず、また同部の拘縮もなく、患者は左上肢の十分な挙上が可能である（図 3）。

病理組織学的所見

病変部の HE 染色像である（図 4）。腫瘍細胞は表皮基底層中心に胞巣状を呈し、増殖しており、一部の腫瘍細胞は角質層直下まで浸潤増殖している。真皮上層には炎症性小円形細胞浸潤を認め、真皮内には腫瘍細胞は認められなかつ

図 4. 摘出された病変の HE 染色像

図 5. 図 4 の拡大像

た。また同部の拡大像（図 5）では腫瘍細胞は大型、類円形で豊富な細胞質を持ち、いわゆる Paget 細胞の特徴を有している。これらの腫瘍

細胞はPAS染色に陽性であった。

以上より腋窩部に認められた乳房外 Paget 病と診断した。

考 案

乳房外 Paget 病はそのほとんどが外陰部 Paget 病であり、腋窩や肛門に発生したものは同時に乳房や外陰部にも発生を認めることが多い。外陰部とともに両腋窩に併発した triple extramammary Paget's disease の報告もある¹⁾。我が国での乳房外 Paget 病は男性に圧倒的に多く見られ、森の集計によると男女比は約 6 対 1 である²⁾。本症例のように、腋窩に単独で発生した女性の Paget 病は稀である。

乳房外 Paget 病の予後は一般に良好とはいえない。Graham らは 57 例中 19 例が 25 ヶ月以内に死亡し、更に 11 例に再発を認めたと報告している³⁾。宮里は 50 例中 10 例が Paget 病の全身転移により、5 例が他の臓器癌により死亡、生存例中 13 例に組織学的に真皮に癌の再発を認めて

いる⁴⁾。当施設においても腫瘍辺縁より 2 cm の健常皮膚を含めた切開を施行した症例において局所再発および所属リンパ節転移を認め治療に難渋した経験があり、それ以降、我々は Paget 病に対しては扁平上皮癌に準じた手術、すなわち腫瘍辺縁より 5 cm 幅の健常皮膚を含めた切離と所属リンパ節の郭清を原則としている。以来局所再発、リンパ節転移、遠隔転移を認めていない。Paget 病に対しては皮膚癌としての認識を持ち、早期診断、早期治療は勿論の事、十分な切除、他臓器悪性腫瘍合併の検索が重要と思われる。

文 献

- 1) Kawatsu, T. & Miki.: Triple extramammary Paget's disease. Arch. Dermatol., 104 : 316, 1971.
- 2) 森俊二: 乳房外 Paget 病の研究. 日皮会誌, 75 : 21, 1965.
- 3) Graham, J. H. & Helwig, E. B.: Cutaneous premalignant lesions. Adv. Biol. Skin., 7 : 277, 1966.
- 4) 宮里肇: 乳房外 Paget 病の知見補遺. 日皮会誌, 82 : 519, 1972.