有棘細胞癌

有棘細胞癌の足背発生例について

外山 馨^{*1} 熊坂久美子^{*1} 高橋 和宏^{*1}
末武 茂樹^{*1} 加藤 泰三^{*1} 谷田 泰男^{*2}

Summary

The acantholytic variety of squamous cell carcinoma consists of tubular and alveolar lumina lined with one or several layers of epithelium. In our report, the clinical and histological features of 6 cases of squamous cell carcinomas developing on dorsal aspect of the foot are described. Five of the 6 cases were histologically proven to be acantholytic squamous cell carcinomas, and 4 of them had extensive areas of acantholytic changes. Among 5 patients there was metastasis to regional lymph node in one patient which led to the death of the patient.

Acantholytic squamous cell carcinoma, which is often attributed to solar damage, has previously been described mainly in the head and neck regions in persons who spent considerable time outside. Our report is the second describing of this entity on the dorsal foot in Japan.

緒 言

Acantholytic squamous cell carcinomaはそのほとんどが高齢者の頭頸部に生じ, acantholytic type の solar keratosis を経て発生することが多い¹⁾²⁾とされている。最近8年間に当科では足背の有棘細胞癌を6例経験したが, このうち5例が acantholytic squamous cell carcinoma であった。足背の acantholytic squamous cell carcinoma は我々が検索した限りでは国内で1例が報告されている³⁾のみで海外

においては報告例がなく, 文献的考察を加えてここに報告する。

症 例

症例1: 64歳, 男性

初 診: 平成2年11月21日

現病歴: 1年前, 左足背に疣贅様の皮疹が生じ, イボコロリをつけて一時縮小したが, 表面が糜爛化して上皮化せず, 当科を紹介された。足背を日光に特に強く当てることはなかったという。

現 症: 左足背に表面が糜爛化した10×16 mm 大の扁平な結節を認める(図1)。

病理組織学的所見: 真皮上層に腺腔様の構造を認め, 内部では棘融解を起こしている(図2)。Acantholytic squamous cell carcinoma と診

^{*1}Kaoru TOYAMA, Kumiko KUMASAKA, Kazuhiro TAKAHASHI, Takaki SUETAKE, Taizo KATO: 東北大学皮膚科学教室

^{*2}Yasuo TANITA: 谷田皮膚科医院

断した。

治療および経過：辺縁より3cm離して全摘し、分層植皮術を施行した。併せて左鼠径リンパ節を郭清し、PM(ペプレオマイシン、マイトマイシンC)併用療法を施行した。術後約1年の現在まで再発・転移を認めていない。

症例2：64歳、女性

初診：昭和61年6月17日

現病歴：1年前左足背の外側に靴ずれのような皮疹が生じ、半年後に近医で鶏眼として切除を受けたが再発し、徐々に隆起してきたため当科を紹介された。

現症：左足背外側縁(日光の当たりにくい部位と考えられる)に周囲が堤防状に隆起した18×19mm大の潰瘍を認める(図3)。

病理組織学的所見：真皮に腫瘍塊を認め、その内部で角化傾向の強い腫瘍細胞が棘融解を起こしている(図4)。Acantholytic squamous cell carcinomaと診断した。辺縁の健常部に

solar elastosisは認められない。

治療および経過：腫瘍を全摘し分層植皮術を施行した。現在まで再発を認めていない。

症例3：85歳、女性

初診：昭和60年6月6日

現病歴：正座していることが多く、右の足背に“たたみこぶ”があった。初診の3年前にこれを自分ではがしたあとが治らず、当科を紹介された。

現症：右足背に10×20mm大の結節状局面があり、表面はカリフラワー状に隆起している(図5)右鼠径リンパ節をうずら卵大に触知する。

病理組織学的所見：腺腔様構造が真皮全層にわたって存在し、内部では腫瘍細胞の棘融解と好中球浸潤を認める(図6)。Acantholytic squamous cell carcinomaと診断した。

治療と経過：一般状態が不良であることと、所属リンパ節への転移が考えられるため、近医

図1. 症例1の臨床像

図2. 症例1の組織像(H.E.染色, ×50)

図3. 症例2の臨床像

図4. 症例2の組織像(H.E.染色, ×50)

図 5. 症例 3 の臨床像

図 6. 症例 3 の組織像 (H.E.染色, ×40)

図 7. 症例 4 の組織像 (H.E.染色, ×50)

で保存的な治療を受けたが、同年 9 月死亡した。

症例 4：87歳，女性（元専業主婦）

初 診：昭和58年11月25日

現病歴：初診の約20年前から右足背に胼胝腫のような皮疹があり，イボコロリをつけていたところ自壊・拡大したため当科を紹介された。

現 症：右足背に直径約 3 cm のドーム状腫瘤があり，腫瘤の左遠位部は潰瘍化している。

病理組織学的所見：真皮上層から中層にかけて腺腔様の腫瘍細胞塊があり，角化傾向の強い腫瘍細胞が棘融解を起こしている（図 7）。Acantholytic squamous cell carcinoma と診断した。

治療と経過：腫瘍を全摘し分層植皮術を施行した。現在まで再発を認めていない。

症例 5：73歳，女性

初 診：昭和58年 4 月13日

現病歴：初診の 4 ヶ月前に右足背に疣贅様の

図 8. 症例 5 の臨床像

図 9. 症例 5 の組織像 (H.E.染色, ×50)

結節ができた。イボコロリを使用したところ糜烂になり隆起してきたため当科を紹介された。

現 症：右足背に11×14mm 大の一部表面に鱗屑を付着する紅斑性結節を認める（図 8）。

病理組織学的所見：表皮は欠損し，真皮に有棘細胞様の腫瘍細胞を認める。腫瘍細胞は一部で棘融解を起こしており，Acantholytic squamous cell carcinoma と診断した（図 9）。

治療と経過：腫瘍を全摘し、分層植皮術を施行した。術後3ヵ月までは再発しなかったが、それ以降の経過は不明である。

症例6：59歳、男性

初診：平成3年9月6日

現病歴：初診の2年前に左足底に堅い腫瘍が出現した。足背には以前から疣贅様の結節があったが、半年前から表面が湿潤してきたため近医を受診し、当科を紹介された。

現症：左足背に30×20mm大の表面が潰瘍化した結節と直径20mmの表面が顆粒状の有茎性の結節を認める(図10)。左足底には35×25mm大および直径20mmの表面が潰瘍化した結節を認める。左足背には直径7mmまでの黒褐色斑が散在している。両側鼠径リンパ節を触知する。

図10. 症例6の臨床像

図11. 症例6の組織像 (H.E.染色, ×25)

病理組織学的所見：通常の squamous cell carcinoma と診断した (図11)。

治療と経過：Ga シンチおよび骨シンチで遠隔転移を示唆する所見はなかった。左足の腫瘍を切除して分層植皮術を施行し、同時に左鼠径リンパ節を郭清した。病理組織学的にリンパ節に腫瘍細胞を認めなかった。術後にペプレオマイシンとマイトマイシンC、パラプラチンおよび5-フルオロウラシルを用いた化学療法を施行した。現在まで再発および転移を認めていない。

考 察

東北大皮膚科において1983年から1991年までの9年間に経験した有棘細胞癌56例を発生部位と組織型で分類した(表1)。Acantholytic squamous cell carcinoma の診断はLeverらの記載¹⁾に従った。足背以外の発生例は50例、足背発生例は6例であり、これらのうちAcantholytic squamous cell carcinoma はそれぞれ11例(22.0%)、5例(83.2%)であった。自験例ではacantholysisは症例1から4までは腫瘍組織のほぼ全体に、症例5では一部にのみ認められた。Acantholytic squamous cell carcinoma は長期間の日光暴露後に生じ、頭頸部が好発部位である¹⁾²⁾⁴⁾という記載が大勢を占め、acantholytic type の solar keratosis から生じることが多い^{1)~3)}とされる。しかし、自験例は5例ともはっきりした露光歴はなく、組織学的に辺縁の健常部に solar elastosis を認めなかった。非露光部に発生した acantholytic squamous cell carcinoma としてはLasserらによる女性外陰部に生じた報告例⁵⁾、Takagiらによる口腔粘膜に生じた報告例⁶⁾がある。Takagiらは歯肉および舌に生じた通常の組織型の有棘細胞癌を radiation で治療したところ再発して acantholytic type に変化していた症例を報告している。そして、acantholytic squamous cell carcinoma は露光部に acantholytic

表 1. SCC の部位別, 組織別発生頻度

acantholysis		+	-	合 計(%)
頭 部 被 髪 頭 部 前 額		0	1	1
		1	2	3(5.3)
	計	1	3(5.3)	4(7.1)
顔 面 眼 脣 頬 部 介 耳 鼻 下 顎 部 上 口 唇 口 腔 粘 膜		0	1	1
		2	5(0.1)	7(12.5)
		1	2	3(5.3)
		1	0	1
		0	1	1
		2	5(9.1)	7(12.5)
		0	2	2
計		6(10.7)	17(30.4)	23(41.0)
軀 幹 胸 部 腹 部 背 部 腰 部 腎 部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	1	1
		0	1	1
	計	0	2	2
外陰部		0	0	0
上 肢 上 腕, 前 腕 手 , 指		0	1	1
		3(5.3)	6(10.7)	9(16.0)
	計	3(5.3)	7(12.5)	10(17.8)
下 肢 大 腿 膝 下 腿 足 (足背を除く) 足 背		0	0	0
		0	1	1
		0	5(9.1)	5(9.1)
		1	4(7.1)	5(9.1)
		5(9.1)	1	6(10.7)
	計	6(10.7)	11(19.6)	17(30.4)
合 計		16(28.6)	40(71.4)	56(100.0)

type の solar keratosis を経て発生するという発生機序は自分達の症例には当てはまらなとし、通常の solar keratosis あるいは squamous cell carcinoma の細胞間の接着性が障害されることにより発生する可能性を述べている。彼らはその引き金として radiation を考えているが、今回の自験例においてイボコロリや切除および部位的に考えて擦過などの機械的刺激が radiation 同様変化の原因になっている可能性は否定できない。

Acantholytic squamous cell carcinoma の臨床像はほとんどの場合、通常の組織型を呈する有棘細胞癌と同じである¹⁾。我々が経験した 5 症例はいずれも潰瘍化した結節状局面であ

り、有棘細胞癌の臨床像として一般的なものであった。予後については Johnson らは所属リンパ節ないし遠隔転移をきたしたのは 155 症例中 3 例 (2%) であったとしている²⁾が、Wick らは 14% が致命的な転移をきたしたと報告している⁴⁾。Lasser らは女性外陰部に生じた有棘細胞癌について統計学的に有意ではないながらも死亡率が acantholytic squamous cell carcinoma (28%) で non-acantholytic よりも高値であり、組織型と予後の関係についてさらに検討を加えることが必要であると述べている⁵⁾。自験例では症例 3 が初診から 2 ヶ月後に死亡しており、足背の有棘細胞癌において acantholysis が認められた場合は基本的に症例 1 のように所属リンパ節郭清を含めた広範囲な腫瘍切除術と化学療法を施行すると同時に症例を蓄積して予後について検討していくことが必要であると考えられる。

今回我々は足背に生じた有棘細胞癌の自験例を病理組織学的に検討し、足背が acantholytic squamous cell carcinoma の 1 つの好発部位となる可能性を指摘した。

文 献

- 1) Lever, W. F., Lever, G. S.: Histopathology of the Skin. 7th ed., 556-557, 1990.
- 2) Johnson, W. C. and Helwing, E. B.: Adenoid squamous cell carcinoma (Adenoacanthoma). Cancer, 19: 1639-1650.
- 3) 井料香代子, 他: 偽腺性有棘細胞癌と限局性多発性神経線維腫の併発. 西日皮膚, 50: 230-233, 1988.
- 4) Wick, M. R. et al.: Adenoid (Acantholytic) Squamous Carcinoma of the Skin. J. Cutan. Pathol., 15: 351, 1988.
- 5) Lasser, A., et al.: Adenoid squamous cell carcinoma of the vulva. Cancer, 33: 224-227, 1974.
- 6) Takagi, M., et al.: Adenoid squamous cell carcinoma of the oral mucosa. Cancer, 40: 2250-2255, 1977.