小児悪性黒色腫

小児悪性黒色腫の1例

石原 剛^{*1} 井上 雄二^{*1} 木下 忠嗣^{*1}
影下登志郎^{*2} 小野 友道^{*2}

Summary

We reported a case of a 13-year-old girl with malignant melanoma and her elder brother had dysplastic nevus. A small papule on the right dorsal hand had been appeared since a few years ago and grew rapidly up to tip of little finger size. Excisional biopsy was done and histological examination revealed nodular melanoma. The lesion was widely excised and reconstructed with groin flap and axillary lymph node dissection was done. Post-operative course was good and no recurrence was found so far.

はじめに

小児悪性黒色腫（小児メラノーマ）はまれであるが、その予後は成人メラノーマと同様に不良であり、早期診断、早期治療の重要性が指摘されている。

最近我々は13歳女児右手背に発生した小児メラノーマを経験したので報告する。本例は長兄に dysplastic nevus が認められたことも特異であった。

症 例

患 者：13歳，女児

初 診：平成4年10月29日

家族歴：長兄に dysplastic nevus (DN) を認めた。

既往歴：特記することなし。

現病歴：3～4年前より右手背に米粒大の黒色小丘疹が出現したのに気付いた。放置していたが、1年前より急速に増大し小指頭大となり、家人がメラノーマを心配して当科受診となった。

現 症：右手背に $8 \times 7 \times 2$ mm の黒色腫瘤を認める（図1）。表面は角化を伴いやや粗澀で、その中央部は軽度陥凹しているが、潰瘍や滲出液は認めない。腫瘤はやや硬く周囲との境界は比較的明瞭である（図2）。腋窩リンパ節は触知せず、色素性母斑は全身に11個存在したが、DN を思わすものは認めない。

臨床検査所見：一般臨床検査、胸部 X 線、Ga シンチなど異常所見は認められない。血清5S-CD 値、ICAM-1値も正常範囲である。

病理組織学的所見：病変は隆起性であり、角層は肥厚し角層内にはメラニン顆粒の集塊や一

^{*1} Tsuyoshi ISHIHARA, Yūji INOUE, Tadashi KINOSHITA：熊本大学皮膚科形成外科診療班

^{*2} Toshiro KAGESHITA, Tomomichi ONO：熊本大学皮膚科教室

図1. 13歳女児右手背に生じた黒色腫瘍

図2. 境界鮮明で隆起性黒色腫瘍
表面は粗澁で核化している

部出血も認められる。表皮は肥厚し異型メラノサイトが散在しているが一部では腫瘍細胞巢によって圧排され辺縁では表皮索の延長がみられる。腫瘍細胞は表皮真皮境界部から真皮下層まで連続して増殖している(図3)。腫瘍細胞は主に類円形ないし楕円形の核を有する類上皮様細胞で核小体も明瞭である(図4)。真皮上層には大型の細胞やKamino body, 分裂像も散見される。腫瘍細胞はメラニン顆粒を多量に有する部位とそうでない部位に区別できる。リンパ球浸潤は真皮上層や腫瘍巢先端部に認められるが、腫瘍細胞の下層での境界は比較的不明瞭でいわゆる maturation もみられない。以上の所見より, nodular melanoma, thickness 2.8mm level 4と診断した。

免疫病理学的所見：パラフィン包埋切片および凍結切片を用いて種々のモノクローナル抗体に対する反応性をABC法で検討した。腫瘍細胞はS-100蛋白, メラノーマ関連抗原, ガングリオシドGD2, GD3, 接着分子および増殖因子レセプター, HLA Class 1 および Class 2 抗原陽性を示した(表1)。

治療および経過：Excisional biopsyを行いメラノーマと診断した後, DAV1クール施行した。平成4年11月20日全麻下に右手背創部より中枢側に4cm末梢側に3cm離して伸筋腱を温存し拡大切除を行った。同時に右腋窩リンパ節郭清術, groin flapによる手背再建を行った

図3. H & E 染色像(弱拡大)
隆起性病変で腫瘍細胞はメラニン色素を有し、真皮下層まで密に増殖している

図4. H & E 染色像(強拡大)
腫瘍細胞は類円形ないし楕円形の核を有する類上皮様細胞で核小体も明瞭である

表1. 原発巣におけるメラノーマ関連抗原および HLA 抗原の発現

MAA		HLA	
HMW-MAA	+++	Class 1	++
115kd-MAA	+++	β 2-u	++
110kd-MAA	++	A2,28	-
100kd-MAA	++		
97kd-MAA	++	DR	++
		DP	+
GD3	++	DQ	+
GD2	+		
acetyl-GD3	-		
ICAM-1	++		
LFA-3	++		
VN-R	+++		
NGF-R	++		
TF-R	++		

(図5)。郭清したリンパ節には転移を認めず(pT3aN0M0), 術後経過良好で同年12月3日皮弁切離術を行った。平成5年1月DAV2クール施行。その後外来にて経過観察中であるが平成5年8月現在再発, 転移は認めていない(図6)。

考 察

小児におけるメラノーマの発生頻度は極めて低い¹⁾²⁾。最近 Mehregan ら³⁾は7,620例のメラノーマのうち14歳以下の症例はわずか6例(0.08%)と報告した。その他の諸外国の報告⁴⁾⁵⁾では小児例は全体の0.4~0.8%であり, Mehregan のそれよりは多いが, その発生頻度はやはり低いものと考えられる。ちなみに当教室におけるメラノーマ156例の年齢分布をみると50~70歳代が多く, 約70%を占め, 15歳以下は2例(1.3%)のみで, そのうち1例は巨大色素性母斑より発生したものであった(図7)。自験例は前駆病変がないメラノーマとしては当教室例中最若年例である。15歳以下の本邦報告例は29例あり, その1/3は巨大色素性母斑から発生し10歳以下に多くみられるのが特徴である。残りは明らかな前駆病変はない(表2)。自験例も外傷などの誘因はなく *de novo* で発症し, これまでに報告がない手背に発生している点が注目される。小児メラノーマの予後は成人例と変わら

図5. Groin flapによる手背再建

図6. 術後1箇月の臨床像

ず, 原発巣の thickness と最も関連しており, 発見が遅れることが問題となる。小児でもまれではあるがメラノーマが発生しうることを念頭に入れておきたい。

小児メラノーマの鑑別疾患として重要なのは Spitz nevus⁶⁾やメラニン色素が多い pigmented spindle cell nevus⁷⁾である。Spitz nevus の特徴は境界が明瞭で, Kamino body が高頻度にみられ, 細胞の maturation がみられることなどが挙げられる。自験例では比較的境界が明瞭で一部に Kamino body がみられたが, 腫瘍細胞が表皮真皮境界部より連続して真皮下層まで浸潤し, 下端部が不明瞭であり maturation がはっきりしないことなどの点から Spitz nevus ではなくメラノーマと診断した。さらにメラノサイ

図7. 熊本大学皮膚科メラノーマ156例の年齢別分布

表2. 本邦小児メラノーマ報告例

前駆病変	巨大色素性母斑	その他
10歳以下	12例	15例
11～15歳	1例	10 + 自験例
計	13例	26例

ト系細胞の悪性化のマーカーとされている種々の接着分子や増殖因子レセプターが陽性を示したこともメラノーマを支持するデータと考えた。文献上病理組織学的に Spitz nevus と診断を受けたが実際はメラノーマで転移を起し死

亡した例も報告されており、その鑑別はきわめて困難な例も存在する。

また、自験例で特徴的なのは長兄に DN を認めている点である。DN が本当にメラノーマの前駆病変であるかは未だ議論の別れるところであるが、メラノーマの risk marker としては一般に受け入れられている。長兄が DN の診断を受けた後、両親は長兄はもちろんほかの子供に対してもメラノーマ発生について注意をはらっており、比較的早く受診したようである。

小児のメラノーマはまれで診断は容易ではないが、社会的啓蒙を行ったり、家族歴を詳しく聴取することは診断の重要な手掛かりになる。

文 献

- 1) 石原和之：メラノーマの臨床と治療、病理と臨床、5：1088-1094, 1987.
- 2) 福井良昌, 小野博紀, 梅村忠弘, 他：小児の悪性黒色種。日皮会誌, 100：597-605, 1990.
- 3) Mehregan, A.M., Mehregan, D.A.: Malignant melanoma in childhood. Cancer, 71: 4096-4103, 1993.
- 4) Roth, M.E., Grant-Kels, J.M., Kuhn, K., et al. Melanoma in children. J. Am Acad. Dermatol, 22: 265-274, 1990.
- 5) Bono, A., Bartoni, C., Zurrida, S., et al.: Childhood cutaneous melanoma. Melanoma Res. 3: 42, 1993.
- 6) McGovern, V.J.: Spitz nevus. In Melanoma: Histological diagnosis and prognosis. Raven Press. New York, pp37-44, 1982.
- 7) 鈴木公明, 竹内美奈子, 兼松秀一, 他：Pigmented spindle cell nevus を思わせた spindle cell malignant melanoma —腫瘍マーカーとしての5-S-CD値—。臨皮, 44: 1093-1096, 1990.