WPG の臨床第II相試験

皮膚悪性腫瘍に対する WPG の臨床第II相試験

WPG 研究会皮膚科領域分科会

石原 和之*

Summary

A Phase II clinical study to evaluate the efficacy and safety of a BRM, Whole peptidoglycan (WPG), was conducted in 104 patients with malignant tumors of skin. All patients received WPG by intratumoral injection. Ninety patients were evaluable for the efficacy. Overall response rate on malignant tumors of skin was 57.8% (52/90). The satisfactory result was obtained in patients with mycosis fungoides (5/5: 100.0%), solar keratosis (11/15: 73.3%), Bowen's disease (13/18: 72.2%) and squamous cell carcinoma (4/6: 66.7%). WPG was also effective on metastatic malignant melanoma (6/12: 50.0%) and CTCL (4/8: 50.0%) and ATLL (3/6: 50.0%). The main adverse reactions were fever, anorexia and local pain at the injection site, but which were tolerable and reversible. These results suggest that local therapy using WPG is useful for the patients with malignant tumors of skin, particularly malignant melanoma and malignant lymphoma.

諸 言

皮膚悪性腫瘍に対する治療法として、外科療法を始めとする局所療法は重要な位置を占める。しかし、皮膚科領域では、多発のため切除不能、あるいは対象とする腫瘍が放射線に抵抗性などの理由により、外科あるいは放射線以外の療法に頼らざるを得ない場合が多くあることも事実である。

皮膚悪性腫瘍に対する薬物療法は、近年 Biological response modifiers (BRM) の登場により新しい展開をみせている。従来主体であっ

た全身化学療法に加えて、IFN を始めとする BRM^{1)~9)}の腫瘍内投与が試みられるにつれ、治療成績が向上し、現在では、BRM による局所薬物療法は、皮膚科領域における重要な治療法のひとつとして位置付けられつつある。

Whole peptidoglycan (WPG) は、ヒト腸内常在菌 (*Bifidobacterium infantis*) より分離、精製された全細胞壁骨格¹⁰⁾で、IL-1あるいは TNF- α などのサイトカインを産生し¹¹⁾、かつマクロファージや好中球に対する活性化作用^{12)~14)}を有する宿主介在性の抗腫瘍剤として開発が進められてきたものである。本剤は、動物実験において各種同系移植腫瘍¹⁰⁾¹²⁾¹⁵⁾の他、ヒト悪性黒色腫とヌードマウスの系で腫瘍内投与により優れた抗腫瘍効果を示すことが明らかとなっている¹⁶⁾。

*Kazuyuki ISHIHARA: 国立がんセンター中央病院
皮膚科 (WPG 研究会代表世話人)

今回、我々は WPG の腫瘍内投与による有効性および安全性を検討するため、皮膚悪性腫瘍を対象とした臨床第II相試験を実施したので報告する。

なお、本試験は初期のパイロット試験を含め昭和63年1月より平成5年3月まで表1に示す全国24施設で実施した。

対象および方法

1. 対象

皮膚悪性腫瘍

転移性悪性黒色腫、悪性リンパ腫、表皮内癌など

1) 選択基準

- (1)組織学的、細胞学的に悪性腫瘍と確認されている症例
- (2)原発巣の有無は問わない
- (3)測定可能病変・評価可能病変を有する症例
- (4)治療開始後3ヵ月以上の生存が予想される患者
- (5)原則としてP.S. (Performans status) 0～3の症例
- (6)先行治療終了後4週間以上経過し、かつ前治療の影響が全く認められない症例
- (7)年齢15歳以上80歳以下、性別不問

(高齢などの理由で外科療法が適用できない症例はその限りではない)

(8)活動性の重複癌のない症例

(9)実質臓器の機能が十分に保持されている症例

2) 除外基準

(1)妊婦、授乳婦および妊娠の可能性のある症例

(2)アレルギー素因のある症例およびワクチン等による過敏症の既往を有する症例

(3)重篤な感染症および合併症を有する症例

(4)プリック試験陽性例

3) 同意の取得方法

試験の開始に先立ち、本試験の目的および内容について本人に十分説明し、文書または口頭で試験参加の同意を得た。本人の同意を得ることが困難な場合には、その法定代理人、配偶者等の同意を得た。

2. 試験薬剤

WPG 製剤は森永乳業株式会社より提供された。本剤は、1バイアル中にビフィズス菌 (*Bifidobacterium infantis* ATCC 15697) 由来の精製全細胞壁 (WPG) 4 mg と賦形剤 (日局D-マンニトール) 50mg を含む凍結乾燥製剤であり、用時、日局注射用水 1 ml に懸濁して使用した。

表1. 試験実施施設および実施責任医師

試験実施施設	科名	実施責任医師	試験実施施設	科名	実施責任医師
北海道大学	形成外科	大浦武彦	岐阜大学	皮膚科	森俊二 ^{1),2)}
札幌医科大学	皮膚科	高橋誠	金沢大学	皮膚科	広根孝衛 ¹⁾
弘前大学	形成外科	菅原光雄	大阪市立大学	皮膚科	濱田稔夫
東北大学	皮膚科	田上八朗	和歌山県立医科大学	皮膚科	松中成浩
福島県立医科大学	皮膚科	金子史男	岡山大学	皮膚科	荒田次郎
埼玉医科大学総合医療センター	皮膚科	池田重雄 ^{1),2)}	山口大学	皮膚科	麻上千鳥
千葉大学	皮膚科	北村啓次郎	香川医科大学	皮膚科	高岩堯
国立がんセンター	皮膚科	岡本昭二	九州大学	皮膚科	堀嘉昭
虎の門病院	皮膚科	石原和之 ^{1),3)}	熊本大学	皮膚科	小野友道
横浜市立大学	皮膚科	大原国章	熊本労災病院	皮膚科	荒尾龍吉 ¹⁾
北里大学	皮膚科	中嶋弘	鹿児島大学	皮膚科	瀬戸山充
		西山茂夫	琉球大学	皮膚科	名嘉真武男

¹⁾ 薬効判定委員 ²⁾ 世話人 ³⁾ 代表世話人 (治験総括医師)

3. 投与方法

投与前にプリップ試験を実施し、アレルギー反応等のないことを確認した。1回用量を原則として2 mg/body または 4 mg/body とし、疾患、症状、治療方法に応じて適宜増減し、腫瘍内または辺縁部に分割投与した。投与回数は、原則として連日投与（10回以上）または、隔日投与（1ヵ月以上）とした。

4. 併用薬剤・療法

本剤の単独投与とし、抗腫瘍効果が期待される薬剤および療法の併用は禁止した。ただし、発熱に対しては解熱剤等の使用は可とした。また、皮膚病変の切除は、効果判定後4週間以上の肉眼的経過観察を行ったあとに実施した。

5. 効果判定基準

皮膚病変の効果判定は、日本皮膚悪性腫瘍学会の「皮膚悪性腫瘍における固形がん薬物療法効果判定基準」¹⁷⁾¹⁸⁾に従い、肉眼的効果判定（表

2-1、表2-2）または病理組織学的効果判定（表2-3）を行った。また、本試験では、全病巣に投与した症例を個別別Ⅰ、一部の病巣のみに投与した症例を個別別Ⅱとして区分し、総合判定（表2-4）を行った。副作用については日本癌治療学会の「副作用の記載様式」¹⁹⁾に従い、分類した。

なお、症例の取扱いおよび効果判定は別途薬効判定委員会にて行った。

6. 皮膚以外の他臓器病変の検索

投与開始前および効果判定時以降にシンチグラム、X線、CTなどの検査を行い、他臓器の病変の有無およびその推移について検索した。

成 績

1. 評価症例

登録症例は105例であり、症例の取扱いを表3に示した。不適格例は1例で、選択基準に満た

表2-1. 縮小率による効果判定基準

	測定法	3方向, 2方向, 1方向		
	縮小率	同一皮膚で測定可能病変が二つ以上ある場合、積又は径の総和を求め算出する。 $\text{縮小率}(\%) = \frac{(\text{治療前の積又は径の総和}) - (\text{治療後の積又は径の総和})}{(\text{治療前の積又は径の総和})} \times 100$		
測定可能病変	判定*)	縮 小 率	持続期間	判定
		100%の縮小（消失）	4週間以上	CR
		3方向で 70%以上の縮小 2方向で 50%以上の縮小 1方向で 30%以上の縮小	4週間以上	PR
		3方向で 70%以上の縮小 2方向で 50%以上の縮小	4週間未満	MR
		3方向で 70%から40%の縮小 2方向で 50%から25%の縮小	4週間以上	
		3方向で 40%から－40%の縮小 2方向で 25%から－25%の縮小 1方向で 30%から－25%の縮小	4週間以上	NC
		腫瘍増悪率が1方向, 2方向で25%以上, 3方向で40%以上, 又は他病変の増悪, 新病変の出現		PD

*) 縮小率は投与病変のみ計測して算出する。非投与病変については別途経過を記載する。

表2-2. 臨床症状による効果判定基準

評価可能病変	紅斑	色素沈着のみ	4週間以上	CR
		完全消褪	4週間以上	
		明らかに50%以上消褪	4週間以上	PR
			4週間未満	MR
		やや消褪(紅斑の25%以上, 50%未満消褪)	4週間以上	
		不変(紅斑の25%未満消褪, 25%未満増強)	4週間以上	NC
		増強(紅斑の25%以上増強), 新病変出現		PD
	浸潤	色素沈着のみ又は完全消褪	4週間以上	CR
		紅斑のみ	4週間以上	PR
		明らかに50%以上消失あるいは紅斑のみ	4週間以上	
			4週間未満	MR
		やや消失(浸潤の25%以上, 50%未満消失)	4週間以上	
		不変(浸潤の25%未満消失, 25%未満増強)	4週間以上	NC
		増強(浸潤の25%以上増強), 新病変出現		PD

表2-3. 病理組織学的判定基準

判定時期	試験薬剤投与開始後, 肉眼的に4週間以上の観察を行った後, 病変部を切除して組織学的判定を行うものとする。なお, 投与開始後肉眼的に4週間の観察を行わずして病変部を切除し, 組織学的判定を行った場合, 切除時の判定を1ランク下げて判定する。切除後4週間以内にその局所に再発, あるいは他部位に新生があればPDとする。	
判定基準	組-CR	腫瘍細胞が完全に消失したもの
	組-PR	腫瘍細胞がほとんど消失あるいは壊死が著明で, 一部のみ腫瘍細胞が認められるもの(残存腫瘍細胞<1/3)
	組-MR①	腫瘍巣の構築の崩壊が認められ, かつ腫瘍細胞の変性・壊死像も認められるもの(1/3≤残存腫瘍細胞<2/3)
	組-MR②	組-MR①の変化は明らかでないが, リンパ球浸潤などの何らかの反応の認められるもの(2/3≤残存腫瘍細胞<1)
	組-NC	大部分の腫瘍巣において, 腫瘍細胞の変性・壊死がほとんど認められないもの, あるいはリンパ球浸潤などの何らかの反応も認められないもの

表2-4. 効果判定基準（総合判定）

CR	……	評価病変の判定全てがCRに該当する効果を示した場合。
PR	……	各評価病変の判定が全てPRか、又はCR, PR, MR, NCが混在するときはCR+PRの数が半数以上の場合はPRとする。
MR	……	各評価病変の判定が全てMRか、又はCR, PR, MR, NCが混在するときはCR+PRの数が半数に満たないが、CR+PR+MRの数が半数以上の場合はMRとする。
NC	……	各評価病変の判定が全てNCか、又はCR, PR, MR, NCが混在するときにはNCの数がCR+PRの数より多い場合はNCとする。
PD	……	各評価病変の判定の何れかがPDの場合、又は新病変の出現がある場合はPDと判定する。

表3. 症例の取扱い

登録症例	-----	105

	不適格症例	----- 1

適格症例	-----	104 (99.0%)

	不完全症例	----- 14*

完全症例	-----	90 (85.7%)

*不完全症例内訳：中止 10例、脱落 3例、
観測不備 1例。

ないものであった。また、不完全性は14例で、その内訳は中止10例、脱落3例および観測不備が1例であった。従って、完全例90例(85.7%)を有効性の評価症例とし、適格例104例(99.0%)を安全性の評価症例とした。適格例104例の診断名と患者背景を表4に示した。

2. 有効性

疾患別の効果を表5に示した。WPGの皮膚悪性腫瘍に対する全体の奏効率は57.8%(52/90)であった。疾患別では、菌状息肉症100%(5/5)、日光角化症73.3%(11/15)、Bowen病72.2%(13/18)、有棘細胞癌66.7%(4/6)で高い奏効率を示した。また、転移性悪性黒色腫(50%：6/12)、菌状息肉症以外のCTCL(cutaneous T cell lymphoma)：(50%：4/8)およびATLL(adult T cell leukemia/lymphoma)：(50%：3/6)に対しても優れた効果が認められた。これら効果のみられた腫瘍のうち、今回、我々は特

に転移性悪性黒色腫(表6)と悪性リンパ腫(表7)に注目して有効性の検討を行った。その結果、悪性黒色腫においては、発生頻度が高く、かつ予後不良とされる病型のALM(acral lentiginous melanoma)およびNM(nodular melanoma)に対して33.3%(ALM：1/3, NM：2/6)の奏効率を示した。また、Stage IVの症例に対しても55.6%(5/9)の症例に有効であった。Stage IVにおける奏効症例の内訳は、LMN(lentigo maligna melanoma)：100%(1/1)、SSM(superficial spreading melanoma)：100%(1/1)、ALM：33.3%(1/3)およびNM：50%(2/4)であった。個体別効果は、Iの症例に対して60%(3/5)、IIの症例で42.9%(3/7)であった。一方、悪性リンパ腫に対しては、特に菌状息肉症に100%(5/5)と高い有効性が認められ、その他のCTCLおよびATLLに対しても50%の奏効率が得られた。また、悪性リンパ腫でCRもしくはPRとなった症例ではその効果が比較的長期間持続した(図1)。

3. 投与方法別効果

WPGの1回投与量、総投与量および投与回数別の効果について解析した(表8)。その結果、対象とする腫瘍によっては、必ずしも大量あるいは長期間の投与は必要なく、1回の投与量が2～4mgで10～15回(総投与量20～40mg)の投与で十分に効果が期待できることが示唆された。

表 4. 適格例の診断名および患者背景

項 目		症例数 (%)	項 目		症例数 (%)
適 格 例		104 (100.0)	Stage	I	24 (23.1)
診断名	悪性黒色腫	13 (12.5)		II	11 (10.6)
	CTCL (MF を含む)	14 (13.5)		III	3 (2.9)
	ATLL	7 (6.7)		IV	12 (11.5)
	有棘細胞癌	9 (8.7)		再発又は分類なし	54 (51.9)
	乳房外 Paget	18 (17.3)	P.S.	0	85 (81.7)
	日光角化症	16 (15.4)		1	10 (9.6)
	Bowen 病	20 (19.2)		2	4 (3.8)
	その他	7 (6.7)		3	4 (3.8)
性 別	男	56 (53.8)		4	1 (1.0)
	女	48 (46.2)	原発巣	無	17 (16.3)
年 齢 (歳)	28～50	10 (9.6)		有	87 (83.7)
	51～60	18 (17.3)	転 移	無	84 (80.8)
	61～70	28 (26.9)		有	20 (19.2)
	71～80	37 (35.6)		CTCL 及び ATLL	21 (20.2)
	81～92	11 (10.6)	前治療	無	60 (57.7)
		有		44 (42.3)	

表 5. 組織診断名別効果

組 織 診 断 名	抗 腫 瘍 効 果					奏効率 (%)
	CR	PR	MR	NC	PD	
悪性黒色腫	3	3	1		5	6/12 (50.0)
菌状息肉症		5				5/ 5 (100.0)
CTCL (菌状息肉症以外)	2	2			4	4/ 8 (50.0)
ATLL		3			3	3/ 6 (50.0)
有棘細胞癌 (verrucous carcinoma 1例を含む)	1	3	1	1		4/ 6 (66.7)
基底細胞癌			2			0/ 2 (0)
乳房外 Paget 病	1	4	7	3	1	5/16 (31.3)
Bowen 病	3	10	2	3		13/18 (72.2)
日光角化症	6	5	1	3		11/15 (73.3)
白板症		1				1/ 1 (100.0)
砒素角化症				1		0/ 1 (0)
計	16	36	14	11	13	52/90 (57.8)

表 6. 悪性黒色腫に対する抗腫瘍効果

疾 患 名		症例数	抗腫瘍効果				不完全	奏効率(%)
			CR	PR	MR	NC PD		
悪性黒色腫		13	3	3	1	5	1	6/12(50.0)
病型分類	LMM	1	1					1/1 (100.0)
	SSM	2		1			1	1/1 (100.0)
	ALM	3		1	1	1		1/3 (33.3)
	NM	6	1	1		4		2/6 (33.3)
	不明	1	1					1/1 (100.0)
個体別	I	6	3			2	1	3/5 (60.0)
	II	7		3	1	3		3/7 (42.9)
Stage	II	2	1				1	1/1 (100.0)
	III	2				2		0/2 (0)
	IV	9	2	3	1	3		5/9 (55.6)

表 7. 悪性リンパ腫に対する抗腫瘍効果

疾 患 名	症例数	抗腫瘍効果			不完全	奏効率(%)
		CR	PR	MR NC PD		
CTCL	14	2	7	4	1	9/13(69.2)
菌状息肉症	5		5			5/5 (100.0)
その他	9	2	2	4	1	4/8 (50.0)
個体別 I	10	2	4	4		6/10(60.0)
II	4		3		1	3/3 (100.0)
ATLL	7		3	3	1	3/6 (50.0)
個体別 I	3		1	2		1/3 (33.3)
II	4		2	1	1	2/3 (66.7)

4. 奏効症例の検討

WPG が転移性悪性黒色腫, ATLL および CTCL に対して奏効した症例のうち, 代表例の現在までの経過を表 9 にまとめた。最終の調査時点では, 5 例が生存しており, そのうち, 本剤投与終了後 (効果判定後) に再発が認められ, 他の療法により治療を受けた症例は CTCL の 2 例であった。

以下にそれぞれの腫瘍について代表的な 1 例を選び, 治療経過とその後の経過について述べる。

症例 1 病名: 転移性悪性黒色腫

60歳, 女性 (症例 No.D-51)

1987年, 右耳前部に黒色腫瘍が発生。次いで, 1989年 2 月, 右下顎部に小豆大の褐色腫瘍が発生した。同年 7 月, 某病院を受診し, 4 病巣切除を施行し, 悪性黒色腫 (悪性黒子黒色腫, LMM, lentigo maligna melanoma) の皮膚転移と診断された。1989年 9 月, 化学療法剤による治療のため, 当施設に紹介された。

DAV 併用療法を施行後, 経過観察。1990年 11 月, 右頬部に米粒大の褐色腫瘍 3 病巣発生。1 病巣を切除し, 悪性黒子黒色腫の皮膚転移と診断した。残り 2 病巣に対し, 11月29日より主に週 2 回, WPG を 1 mg より腫瘍内投与を開始。6 回目より 2 mg に増量した。

図 1. 悪性リンパ腫および悪性黒色腫における奏効期間

PR または CR に相当する縮小率 (測定可能病変) または判定 (評価可能病変) が 2 週間以上継続した症例および組織学的判定から PR 以上と判定された症例について、1 度縮小した病変に明らかな増大または新病変の出現を認めた日までの期間 (日数) の分布を示した。ただし、PR 相当に至ったが病理組織学的に NC または MR と判定された症例は含まない。

表 8. 投与方法別効果

項 目		症例数	抗腫瘍効果						奏効率(%)
			CR	PR	MR	NC	PD		
適格完全例		90	16	36	14	11	13	57.8	
1 回投与量	～ 2	31	10	16	2	2	1	83.9	p<0.001
	2.1～ 4	54	6	17	12	8	11	42.6	
	4.1～ 8	5		2		1	2	40.0	
総投与量	～20	26	10	13	1	1	1	88.5	p<0.001
	20.1～40	32	5	12	8	4	3	53.1	
	40.1～60	7		2	2	1	2	28.6	
	60.1～	25	1	8	3	5	8	36.0	
投与回数	～10	41	10	17	7	3	4	65.9	p<0.042
	11 ～15	17	3	8	2	3	1	64.7	
	16 ～20	17	3	4	5	2	3	41.2	
	20 ～	16		7		3	6	43.8	

写真1-A は投与前。褐色の腫瘍を 2 病巣 (矢印) 認める。写真1-B は 6 回投与後。腫瘍は 75% の縮小。写真1-C は 8 回投与後。ほぼ 100% 近い縮小。写真1-D は 11 回投与後 3 週目。腫瘍は消

失したままである。

副作用は、注射部位に一過性の軽度の発赤が発現したが、その他、特に自覚、他覚所見に異常は認められなかった。

表9. 悪性黒色腫および悪性リンパ腫の奏効症例 (代表例)

症例 No.	性別 年齢 (歳)	(組織)診断名 Stage	原発 転移	合併症	前治療歴 及び方法	病 果 数	投 与 方 法			抗 腫 瘍 効 果				転 帰 再発・転移
							投与回数 ・量(mg)	投与間隔 期 間	総投与 量(mg)	評価可能 病 変	評 価	効果発現まで の日数と(回数)	判定	
D-51	女 60	悪性黒色腫 IV	転移	なし	DAV×3	2	1.0×5 11 2.0×6	1~3/w28日間	17.0	右 頬	100%縮小	7日(3回)	CR	死亡(860日<) 事故死('93年5月) なし
D-70	女 59	悪性黒色腫 III	転移	なし	サイクロリン中性繊維 DAVP IFN-β 等	1	1.0×10 10	2~3/w23日間	10.0	膝 外側	100%縮小	8日(3回)	CR	生存(694日<) ('93年9月30日) なし
D-21	男 75	CTCL IA	原発	糖尿病 狭心症	TNF 局注	3	1.6×2 12 2.0×9 2.8×1	1~2/w49日間	24.4	右 前腕	100%縮小	14日(5回)	CR	生存(1226日<) ('93年6月12日) 再発治療有
D-91	男 57	CTCL IA	原発	腎障害	リニアック Co IFN-α・β IL-1 等	1	1.0×1 4 1.2×1 0.4×2	1/w21日間	3.0	左 膝裏	100%縮小	4日(2回)	CR	生存(190日<) ('93年9月28日) 再発治療有
D-48	女 72	ATLL II B	原発	心不全	IFN-γ	1	4.0×22 22	4~5/w34日間	88.0	右大腿部	50%以上 縮小	12日(10回)	PR	生存(184日<) ('93年6月10日) なし
D-83	女 41	ATLL IA	原発	なし	なし	1	2.0×7 7	2~3/w17日間	14.0	左大腿部	96%縮小 ↓ 100%縮小	8日(3回)	PR	生存(114日<) ('93年2月3日) なし

写真1-A.
症例1, 女性60歳
病名: 転位性悪性黒色腫
治療前

写真1-B.
症例1, 同上
6回投与後

写真1-C.

症例 1, 同上
8 回投与後

写真1-D.

症例 1, 同上
11回投与後, 3 週目

本患者は1991年9月、脳転移が発見され、化学療法および脳転移巣の摘出を行った。その後、特に異常は認められなかったが、1993年5月、自宅において事故により死亡した。

症例 2 病名：CTCL

57歳、男性（症例 No.D-91）

昭和56年頃より軀幹に難治性の紅斑が出現し、昭和63年8月に初診。生検にてCTCL [CD3(+), CD4(+), 抗 HTLV-I 抗体(-)] と診断し、IFN- α を筋肉内投与し、1ヵ月後にCR。平成元年8月に再発したため、MY-1の局注を行い、同年12月にPR。その後の再発に対して、TNF- α および IFN- α の局注を行い、PRとなった。平成3年7月より再発部位に IFN- γ を投与し、再びPRとなった。同年10月に再発したため、IL-1を投与したが無効であった。その

後、電子線（リニアック）の全身照射を施行して寛解した。

平成5年3月より左膝窩に半環状に手掌大浸潤局面が出現したため、その部位にWPGの腫瘍内投与を行った(写真2-A)。WPG 1mg/body $\rightarrow$ 1.2mg/body $\rightarrow$ 0.4mg/body $\rightarrow$ 0.4mg/body を約1週間間隔でそれぞれ1回、計4回投与した。投与終了1週間後の診断時にはほぼ偏平化し、CRと判定した(写真2-B)。その後、この効果は3ヵ月以上持続した。

同年9月に量腋窩および鼠径部リンパ節に転移がみられたため、現在、放射線により治療中である。

症例 3 病名：ATLL

41歳、女性（症例 No.D-83）²⁰⁾

初診の2ヵ月前から、左大腿部に孤立性の結

写真2-A. 症例 2, 男性57歳 病名: CTCL
治療前

写真2-B. 症例 2, 左に同じ 4 回投与後,
1 週目

節が出現した。初診時、左大腿部に基底部24×28mm、高さ5mmの表面淡紅色で凹凸不正の小結節を認めた(写真3-A)。末梢血に異型リンパ球はなく、リンパ球サブセットでは、CD4は正常の範囲内(56.4%)であるが、CD8は軽度減少(16.6%)がみられた。血清 HTLV-I 抗体は陽性であった。皮疹部生検組織の免疫組織学的検

査および HTLV-I proviral DNA の取込みなどから、本症例を ATLL と診断し、大腿部の結節を ATLL の特異疹と考えた。この結節に対して WPG の腫瘍内投与を行った。

プリック試験で陰性を確かめた後、WPG 2 mg/body/day を週に 2 ないし 3 回投与した。WPG 3 回投与後、結節の大部分は平坦化

写真3-A. 症例 3, 女性41歳 病名: ATLL
治療前

写真3-B. 症例 3, 左に同じ 7 回投与終了後,
4 週目

し、さらに6回投与終了時点では結節は完全に平坦化し、浸潤も軽度になった。WPGの投与は計7回(総量14mg)行い、投与終了4週間後には炎症後の色素沈着を残すのみとなり、浸潤もほとんど認められなかった(写真3-B)。効果判定時の縮小率は96.0%で、PRと判定した。

副作用として、初回の投与時のみ軽度の発熱と全身倦怠感を認めたが、非ステロイド系消炎鎮痛剤にて緩解した。その他、局所疼痛が認められた。臨床検査値異常は認められなかった。

最終調査の投与後114日目の時点で生存しており、再発ならびに転移は認められなかった。

5. 副作用

適格例104例における副作用の種類と発現頻度を表10に示した。全身症状における主な副作用は、発熱(64.4%)、悪寒・戦慄(24.0%)および全身倦怠感(26.0%)であった。局所症状としては、注射部位の発赤(22.1%)、疼痛(72.1%)および腫脹(22.1%)であった。臨床検査値異常の発現頻度は低く、わずかにCRP

表10. 副作用の種類と発現頻度

種 類*		Grade			件数(発現率 %)
		1	2	3	
全 身 症 状	発 熱	30	35	2	67/104(64.4)
	悪寒・戦慄	10	5	10	25/104(24.0)
	全身倦怠感	14	5	8	27/104(26.0)
	悪心・嘔吐	4	6	1	11/104(10.6)
	食欲不振	3	4	6	13/104(12.5)
局 所 症 状	局所疼痛	24	47	4	75/104(72.1)
	局所発赤	5	16	2	23/104(22.1)
	局所腫脹	8	13	2	23/104(22.1)
	局所硬結	3	9		12/104(11.5)
	局所潰瘍	1	3		4/104(3.9)
	紅 斑	1	3	1	5/104(4.8)
臨 床 検 査 値 異 常	ヘマトクリット値減少	4			4/104(3.9)
	ヘモグロビン減少	3	1		4/104(3.9)
	赤血球数減少	3			3/104(2.9)
	白血球数増加	3			3/104(2.9)
	好中球数増加	4	1		5/104(4.8)
	リンパ球数減少	4			4/104(3.9)
	GPT 上昇	3			3/104(2.9)
	ALP 上昇	4			4/104(3.9)
	LDH 上昇	3			3/104(2.9)
	BUN 上昇	3			3/104(2.9)
	Ca 減少	3			3/104(2.9)
	CRP 上昇	10			10/104(9.6)

*発現率が2%以上のものを記載

上昇 (9.6%) および好中球数の上昇 (4.8%) がみられる程度であった。その他、肝機能および腎機能に対して特に重篤な副作用は認められなかった。なお、発熱および疼痛については、必要により解熱剤およびキシロカイン等の局所麻酔剤で前処置することで、より安全に、かつ疼痛なく投与出来た。

考 察

今回、我々は皮膚悪性腫瘍に対する WPG の第 II 相試験を実施し、有効性および安全性について検討した。

WPG の皮膚悪性腫瘍に対する効果は、基底細胞癌を除き、全般的に良好な成績が得られ、症例によっては他剤に抵抗性の腫瘍に対しても効果が認められた。診断名別の効果では、特に菌状息肉症 (100%), 日光角化症 (73.3%), Bowen 病 (72.2%), 有棘細胞癌 (66.7%) に優れた効果がみられた。また、転移性悪性黒色腫、ATLL および菌状息肉症以外の CTCL に対しても 50% の奏効率が得られた。一方、主な副作用としては、発熱、全身倦怠感および投与局所の発赤、疼痛などが認められたが、重篤なものはなく、可逆的であり、投与中または投与終了後には消失した。

今回の試験では、本剤の悪性黒色腫および悪性リンパ腫に対する効果に注目し、有効性の検討を行った。悪性黒色腫の皮膚転移に対する化学療法の効果は一般に 10% 以下と感受性が低く、放射線にも抵抗性である。しかし、近年 BRM の腫瘍内投与が試みられるにつれ、優れた治療効果が期待できるようになってきた。今回、我々が使用した WPG は、悪性黒色腫の皮膚転移に対して 12 例中 6 例 (CR 3 例) に効果がみられ、奏効率において、本症に対し既に報告されている IFN- β あるいは IFN- $\alpha^{2(3)(21)}$ および TNF- $\alpha^{7)}$ などと比較して遜色のない成績が得られた。また、悪性黒色腫の病型分類において、発生頻度が高く、かつ予後も極めて不良と

される結節型黒色腫 (NM) に対して、6 例中 2 例、うち CR 1 例と 33.3% の奏効率を示した。病期別効果についても、Stage IV の症例に対し、前述の NM の奏効例 2 例を含め全体で 55.6% (5/9) (CR 2 例) の症例に有効であった。今回の試験では、放射線照射部位からの再発に対して奏効した症例もみられ、本剤は、今後、悪性黒色腫の皮膚転移に対する新たな治療薬として、その臨床上的有用性が期待される。一方、悪性リンパ腫に関しては、CTCL に対して全体で 69.2% (9/13) の症例に効果がみられた。特に菌状息肉症に対しては、100% (5/5) の奏効率が得られ、例数は少ないものの本症に対して報告されている組み換え型 IFN- $\alpha^{22)(23)}$ ならびに IFN- $\gamma^{4)}$ の成績と比較して同等以上の効果を有することが示された。また、ATLL に対しても 50% (3/6) の奏効率が得られており、本剤は悪性リンパ腫に対しても有効と考えられる。

投与方法別効果の検討では、1 回の投与量が 2 ~ 4 mg で 10 ~ 15 回 (総投与量 20 ~ 40 mg) の投与で十分に効果が期待できることが示された。従って、この投与方法は、対象とする腫瘍が WPG に対し感受性を有するか否かを判断するひとつの指標になるものと考えられる。

WPG は、従来の基礎試験の結果から、投与局所に好中球およびマクロファージを集積させ、活性化し、それらが直接エフェクター細胞として抗腫瘍性に働く^{12)~14)}とともに、それらの細胞から IL-1 $\alpha^{11)}$ 、TNF- $\alpha^{11)}$ あるいは IFN²⁴⁾などのサイトカインの産生を促進して免疫カスケードを動かし、細胞障害性 T 細胞や NK 細胞²⁴⁾を中心とする抗腫瘍免疫を誘導するものと考えられている。従って、今回の試験のごとく、腫瘍局所に直接投与する方法は、本剤の抗腫瘍効果を最も効率良く発現させる投与方法と考えられる。

薬物の局所投与は腫瘍局所の一定の範囲を対象とするところから、全身的な副作用の発現率が低く、しかもその部位で高濃度の薬剤と腫瘍細胞とが接触するため、全身療法に比較して有

効性が得られやすい投与方法と考えられる。1970年に Morton ら²⁵⁾は 8 症例の悪性黒色腫を対象として、BCG 生菌の腫瘍内投与を実施したが、その際に得られた好成績が、その後の癌の局所薬物療法に対して世間の関心を集めることとなったのは周知の通りである。その後、Morales ら²⁶⁾が再発性膀胱癌を対象とした BCG の膀胱内注入による治療を行い、本症に対する有効性を報告した。最近では、膀胱内注入による作用機序も細胞レベルで検討され^{27)~29)}、1991年5月には FDA により、BCG 生ワクチンが膀胱内注入による第 I 期および再発膀胱癌の治療剤として承認されるに至った。悪性黒色腫においても、近年、BRM の腫瘍内投与により、優れた治療成績が報告されている。

皮膚科領域の腫瘍は、患者自身の目に触れる機会が多いため、局所の病巣を消失せしめること自体が臨床に極めて意義のあることであり、ひいては患者の QOL の改善にもつながるものと考えられる。本剤においても、有効性ならびに安全性の面から、今後、皮膚悪性腫瘍の中でも、特に予後不良とされる悪性黒色腫および悪性リンパ腫に対する臨床適応が期待される。

文 献

- 1) 山下正徳：インターフェロンの抗腫瘍効果。日本臨床, 48: 166-176, 1990.
- 2) 石原和之：生物的反応調節剤による皮膚悪性腫瘍の治療：臨床皮膚, 44: 606-610, 1990.
- 3) 石原和之：日本における BRM の現況。Skin Cancer, 4: 313-321, 1989.
- 4) 石原和之, 池田重雄, 森俊二, 他：皮膚悪性腫瘍における SUN4800後期臨床第II相試験。西日本皮膚, 251: 766-775, 1989.
- 5) 池田重雄, 石原和之：皮膚悪性腫瘍に対する S-6820 (ヒト組換えインターロイキン 2) の臨床的研究。BIOTHERAPY, 3: 811-819, 1989.
- 6) 池田重雄, 石原和之：皮膚悪性腫瘍に対する遺伝子組み換え型ヒトインターロイキン 2 (rIL-2: TGR-3) の臨床第 2 相試験。Skin Cancer, 4: 367-387, 1989.
- 7) 石橋康正, 石原和之, 大原国章, 他：皮膚悪性腫瘍に対する MHR-24 (天然型ヒト腫瘍壊死因子) の臨床第II相試験。臨床医薬, 8: 775-792, 1992.
- 8) 池田重雄, 石原和之：皮膚悪性腫瘍に対する遺伝子組み換え型ヒト腫瘍壊死因子 Sertenef (PT-050) の臨床第 2 相試験。Skin Cancer, 5: 210-226, 1990.
- 9) 石原和之, 池田重雄, 古江尚：皮膚悪性腫瘍に対する MY-1 の後期第II相臨床試験。Skin Cancer, 5: 458-468, 1990.
- 10) Sekine, K., Toida, T., Saito, M., et al.: A new morphologically characterized cell wall preparation (Whole Peptidoglycan, WPG) from *Bifidobacterium infantis* with a higher efficacy on the regression of an established tumor in mice. Cancer Res., 45: 1300-1307, 1985.
- 11) 仁井昌彦, 水野和人, 矢野型二, 他：癌性胸膜炎に対する Whole Peptide Glycan (WPG) の抗腫瘍機構の解析。BIOTHERAPY, 6: 325-326, 1992.
- 12) 山本崇, 関根一則, 樋田知宏, 他：ビフィズス菌精製細胞壁 (WPG) のマウス同系腹水型腫瘍に対する抗腫瘍効果。BIOTHERAPY, 4: 638-642, 1990.
- 13) 太田淳, 関根一則, 樋田知宏, 他：ビフィズス菌精製細胞壁 WPG によって活性化される好中球及びマクロファージの抗腫瘍作用機序の検討。BIOTHERAPY, 6: 327-328, 1992.
- 14) Tsuyuki, S., Yamazaki, S., Akashiba, H., et al.: Tumor suppressive effect of a cell wall preparation, WPG, from *Bifidobacterium infantis* in germfree and flora-bearing mice. Bifidobacteria and Microflora, 10: 43-52, 1991.
- 15) 関根一則, 田付太郎, 渡辺恵美子, 他：ビフィズス菌精製細胞壁 (WPG) の調製とマウス同系腫瘍に対する抗腫瘍効果。ビフィズス, 3: 135-141, 1990.
- 16) 石原和之, 小出勉, 小松輝夫：ヌードマウス可移植性ヒト悪性黒色腫および腎癌に対する WPG の抗腫瘍効果。Skin Cancer, 5: 227-238, 1990.
- 17) 石原和之, 池田重雄, 荒尾龍喜, 他：皮膚悪性腫瘍における固形がん薬物療法効果判定基準。Skin Cancer, 2: 1-13, 1987.
- 18) 石原和之, 池田重雄, 荒尾龍喜, 他：皮膚悪性腫瘍における固形がん薬物療法効果判定基準。日癌治, 25: 2609-2620, 1990.
- 19) 小山善之, 齊藤達雄：日本癌治療学会固形がん化学療法効果増強の判定規準。日癌治, 21: 943-953, 1986.
- 20) 兼藤紀美子, 中川浩一, 小林裕美, 他：孤立性の

- 皮疹で発症した ATL の 1 例, 皮膚, 35 : 662-667, 1993.
- 21) 石原和之 : 腫瘍内投与法の有用性をめぐって. 癌治療と宿主, 5 : 263-268, 1993.
- 22) Tura, S., et al. : Alpha recombinant interferon in the treatment of mycosis fungoides (MF). *Hematologica*, 72 : 337-340, 1987.
- 23) Naicolas, J.F., et al. : Treatment of cutaneous T cell lymphoma with intermediate doses of interferon alpha 2a. *Dermatologica*, 179 : 34-37, 1989.
- 24) 五十嵐稔, 高橋哲, 熊谷勝男 : ビフィズス菌由来精製細胞壁 (Whole Peptidoglycan, WPG) によるインターフェロン (IFN) の誘導と NK 活性の増強. *BIO THERAPY*, 4 : 638-642, 1990.
- 25) Morton, D.L., et al. : Immunological factors which influence response to immunotherapy in malignant melanoma. *Surgery*, 68 : 158, 1970.
- 26) Morales, A., Eidinger, D., Bruce, A.W. : In BCG in Cancer Immunotherapy, eds. Lamoureux, G., Turcotte, R., Portelance, V. p. 247, Grune and Stratton, New York, 1976.
- 27) De Boer, E.C., De Jong, W.H., et al. : Presence of activated lymphocytes in the urine of patients with superficial bladder cancer after intravesical immunotherapy with bacillus Calmette-Guérin. *Cancer Immunol. Immunother.*, 33 : 411-416, 1991.
- 28) Jackson, A.W., Prescott S., et al. : The immunomodulatory effects of urine from patients with superficial bladder cancer receiving intravesical evans BCG therapy. *Cancer Immunol. Immunother.*, 36 : 25-30, 1993.
- 29) Thanhauser, A., Bohle, A. : Induction of bacillus Calmette-Guérin activated killer cells from human peripheral blood mononuclear cells against human bladder carcinoma cell lines in vitro. *Cancer Immunol. Immunother.*, 37 : 105-111, 1993.