■シンポジウム 6

頸部椎間板障害に対する手術適応

Key words : cervical spondylosis
soft disc, operative method
surgical application

岩 崎 喜 信* 秋 野 実*
井 須 豊 彦* 阿 部 弘*

1. は じ め に

今回、我々は頸椎椎間板障害のうち、当科で en bloc wide laminectomy および Smith-Robinson 法を導入した1976年以降の手術症例中、6 カ月以上の follow up が行い得たものに関して検討した。

2. 症 例

症例数は112例であり、soft disc が46例 spondylosis は66例である。なお、spondylosis の症例中、18例に分節型の後縦靱帯骨化（以下 OPLL と略す）を合併していた（Table 1）。術式別では、en bloc wide laminectomy（以下単に laminectomy と略す）のみ行った例は19例で、全例が multiple level の spondylosis および、脊椎管狭窄を有していた。前方到達法（anterior approach）は85例であるが、このうち17例は突出椎間板または骨棘の除去のみのいわゆる without fusion 例である。残りの68例は腸骨片による固定も行ったが、このうち12例は、OPLL の合併等により、病巣が広範なため vertebrectomy を行った。laminectomy と anterior approach との併用例は 8 例であり、これらは著明な脊椎管狭窄ないしは、黄色靱帯の肥厚または石灰化を伴った mulitiple level の障害例であった（Table 2）。

Table 1 Summary of cases (1976~1985)

	Total		112 cases	
		F	M	
Soft disc	17	29	/46	
Spondylosis	15	51	/66	
(combined segmental OPLL 18 cases)				

Table 2 Summary of operative methods

	total 112 cases
1. En bloc wide laminectomy	19 cases
2. Anterior approach	85 cases
< without fusion	17 cases
* with bone graft	68 cases
* (Smith-Robinson	56 cases
with vertebrectomy	12 cases
3. Laminectomy+anterior approach	8 cases

3. 治 療

112例の頸部椎間板障害手術例において、soft disc 例では laminectomy のみの例は無く、全例が前方到達ないしは laminectomy と anterior approach との併用例であり、特に、ここ数年では全てが anterior approach であり、特に without fusion 例が増加してきている。一方、spondylosis においても年々、laminectomy の件数は減少し、逆に最近はほとんどの例が anterior fusion であり、症例によっては without fusion も行われるようになってきてい

*北海道大学脳神経外科
Address reprint requests to: Yoshinobu Iwasaki, M.D., Department of Neurosurgery,
Hokkaido University School of Medicine, North 15, West 7, Kita-ku, Sapporo 060

る。これは、後に記すごとく、我々は過去の分析をもとに、近年、手術法の選択基準を変更してきたことによる。

4. 成績

soft disc では segmental および long tract sign 共に全体で90%以上の改善率を見ている。このうち anterior approach 施行群では、fusion 群と without fusion 群とを比較すると、多椎体レベルの障害または椎体の subluxation を伴っているため fusion を行わざるを得なかったものは、術前症状が重篤の傾向があることもあり、改善率は without fusion の群よりもやや劣るが、術後の悪化例は全く無い。一方 without fusion の群はその適応を厳密に行っていることもあり改善率は100%で、excellent の

症例がほとんどである (Table 3). 次に spondylosis では、一般に症状が重篤、かつ発症から手術までの期間が長いこと全体で segmental sign および long tract sign 共に soft disc よりも改善率は劣り、またその程度も excellent の占める率は低い傾向にある。術式別では、laminectomy の成績が最も悪く、特に segmental sign は約半数に改善が見られたにすぎない。一方、anterior approach の群は椎体削除の例を含め、segmental および long tract sign 共に良好な結果を得ている (Table 4). なお、soft disc, spondylosis 共に fair の例は術前症状が非常に重篤で、かつ放射線学的検索で脊髄の萎縮を呈していたものがほとんどであった。

Table 3 Operative results (soft disc)

	Total		Anterior discectomy (42)				Laminectomy & Anterior fusion (4)	
			interbody fusion (25)		without fusion (17)			
	S (43)	L (35)	S (23)	L (22)	S (16)	L (9)	S (4)	L (4)
Excellent	30	23	13	14	15	7	2	2
Good	8	9	6	5	1	2	1	2
Fair	5	3	4	3	0	0	1	0
Poor	0	0	0	0	0	0	0	0
Rate of improvement	90 %	91 %	83 %	86 %	100%	100%	75 %	100%

S : Segmental sign, L : Long tract sign

Table 4 Operative results (spondylosis)

	Total		Laminectomy (19)		Anterior approach (43)				Laminectomy + Anterior fusion (4)	
					osteophylectomy & fusion (31)		vertebrectomy (12)			
	S (55)	L (49)	S (17)	L (17)	S (26)	L (21)	S (9)	L (8)	S (3)	L (4)
Excellent	26	23	4	8	18	12	4	3	0	0
Good	18	20	6	6	6	6	4	4	2	4
Fair	10	6	6	2	2	3	1	1	1	0
Poor	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Rate of improvement	80 %	88 %	59 %	82 %	92 %	86 %	90 %	90 %	90 %	66 %

S : Segmental sign, L : Long tract sign

Fig. 1a CT myelogram showing right lateral disc protrusion at C_{6/7} level.

5. 手術適応基準

Fig. 1b Postoperative plain film showing partial bony fusion at the same level after the discectomy without fusion.

我々の教室での手術適応の基準は1975年以前は、次のようなものであった。すなわち、1) 短期間に脊髄症状が進行性に悪化し、manometric Queckenstedt test (MQT) で脊椎管腔の髄液の通過障害、および myelography で造影剤の通過障害や閉塞が認められる場合、2) 脊髄症状が存在するが軽度で、MQT でも通過障害が著明でないときは、まず頸部カラーの装着、頸部安静で経過をみるが、それでも神経症状の改善が見られない場合、3) 保存的療法である程度改善しても、年齢が若く、長期間にわたる社会活動が営まれる場合である⁶⁾。しかしその後、各種の放射線学的検索の進歩に伴い、MQT の価値も以前ほど重要視されなくなったこと、並びに手術法および操作の改良により、手術そのものの安全性が向上してきた事などにより、適応基準も一部変更するに到った。すなわち、1976年から1982年までは、1) 全ての症例に対して4～8週の頸部安静および頸部カラーの装用を行い、経過観察とするが、これらの保存的療法により何らの改善が認められないか、いったんは改善してもすぐに再度悪化を認める

Fig. 2a Myelogram showing cervical cord compression at C_{3/4}, C_{4/5} and C_{5/6} levels.

Fig. 2b Postoperative plain film showing anterior fusion at the three levels.

場合、2)65歳以上の高齢者に対しては手術適応を厳格にし、家族および社会的環境を十分考慮して決定する、という条件に変更した¹⁾。更に1983年以降は、症状の完全回復のためには、早期治療が必要であること、および高齢化社会となってきた事を考慮し、新たな適応基準を決定した。すなわち、1)神経症状を有し、1カ月間安静、頸部カラー等の保存的治療で改善しない場合、2)神経症状が軽度でも責任病巣と考えられる椎間レベルにおいて、放射線学的検索にて著明な脊髄や神経根圧迫所見が見られる場合、3)保存的治療で一時改善したものの、再度症状の悪化が見られた場合、4)年齢的には70歳以上の高齢でも全身状態がゆるす場合である。

6. 手術術式の選択

以上のような適応基準のもと、手術を行うわけであるが、この際の術式の選択基準は、まず、soft discでは3椎間以下の病巣の場合、1～2椎間でsubluxationの無いものには without fusion (Fig. 1)、3椎間の病変、またはsubluxationがある場合は fusionを行う。4椎間レベル以上でも第1選択は前方固定術であるが、著明な脊椎狭窄や黄色靱帯の肥厚等、脊椎管後方圧迫要因が著明な場合は、時に laminectomyを併用する。spondylosisは3椎間の病変の場合、やはり2椎間以下で骨棘形成が軽度であり、かつsubluxationが無いものには without fusion, subluxationのあるものには fusionを行う。また、骨棘形成が著明なものや、3椎間

Fig. 3 Postoperative plain film showing vertebrectomy of C₅ and anterior fusion between C₄ and C₆, and anterior fusion at C_{6/7} level.

の病変の場合は、骨棘の除去と fusion を行う (Fig. 2), さらに分節型の OPLL の合併例では, vertebrectomy により骨棘および OPLL を除去し fusion する (Fig. 3). 4 椎間以上はやはり前方固定を優先させ, 時に, laminectomy を加える.

7. 考察およびまとめ

頸椎椎間板障害は高齢化社会となってきたこと, 種々の放射線学的検査法の進歩により症例数は増加してきており, また, 手術法の改良工夫により^{2,3,4,5)}, その安全性も向上してきている。我々もここに示してきたごとく適応基準, 術式選択基準を決め, 治療を行なっている^{1,2)}が, いまだ治療成績は満足すべきものとはいえず, 今後もさらに, 種々の面で, 改良, 工夫が必要と思われる。

文 献

- 1) 阿部 弘, 岩崎喜信: 頸椎症, 私の治療方針. クリニカ 82 9 (3) : 53-59, 1982
- 2) 阿部 弘, 岩崎喜信: 変形性頸椎症. Clinical Neuroscience 2 (12) : 56-59, 1984
- 3) Fager CA : Results of adequate posterior decompression in the relief of spondylotic cervical myelopathy. J Neurosurg 38 : 684-692, 1973
- 4) Hankinson HL, Wilson CB : Use of the operating microscope in anterior cervical discectomy without fusion. J Neurosurg 43 : 452-456, 1975
- 5) Smith GW and Robinson RA : The treatment of certain cervical spine disorders by anterior removal of the intervertebral disc and interbody fusion. J Bone Joint Surg 40-A : 607-624, 1958
- 6) 都留美都雄, 阿部 弘: Cervical spondylosis, disc の手術. 脳外 3 : 15-20, 1975

ABSTRACT

Operative Applications for Cervical Disc Disease

by

Yoshinobu Iwasaki, Minoru Akino, Toyohiko Isu and Hiroshi Abe

from

Department of Neurosurgery, Hokkaido University School of Medicine

Operative methods, results and our criteria of the surgical applications for the cervical disc diseases are described. One hundred twelve patients of the cervical disc diseases were operated on since 1976. These were consisted of 66 cases of the spondylosis and 46 cases of the soft disc. The operative methods include anterior discectomy without fusion, with fusion, vertebrectomy with fusion and laminectomy in which en bloc wide laminectomy was adopted. With the best selection of the methods according to the pathophysiological findings of the lesion, the operative results were improved, but they are not yet satisfied.

From the analysis about the operative results, the following criteria of the operative indication are adopted in our department; no improvement of neurological deficits in spite of the conservative treatment, marked positive findings on neuroradiological examination even with the slight neurological deficits, re-deterioration of the neurological findings after the transient improvement through conservative therapy, good physical condition even if over 70 years old.