原 著

長期透析患者の腰部脊柱管狭窄症に対する 片側進入両側脊柱管開窓術の手術成績

佐々木 学, 安部倉 信, 久村 英嗣, 谷 直樹, 後藤 哲,
杉村 武嗣*, 夫 恩澤*, 岩月 幸一**, 吉峰 俊樹**

Surgical Outcome of Bilateral Spinal Decompression through Unilateral Laminotomy for Lumbar Canal Stenosis associated with Long-Term Hemodialysis

by

Manabu Sasaki, Makoto Abekura, Eiji Kumura, Naoki Tani, Tetsu Goto,
Takeshi Sugimura*, Ontaku Fu*, Ko-ichi Iwatsuki**, Toshiki Yoshimine**

from

Department of Neurosurgery, Hanwa Memorial Hospital
Department of Artificial Kidney, Hanwa Memorial Hospital*
Department of Neurosurgery, Osaka University Medical School**

Patients undergoing long-term hemodialysis often develop spinal canal stenosis caused by β 2-microglobulin amyloid deposition in the synovial joints, the intervertebral discs and the ligamentum flavum. Minimally invasive surgery is essential to treat these patients because of their poor general condition and spinal fragility. Bilateral spinal decompression through unilateral laminotomy is one of the minimally invasive surgical techniques for lumbar canal stenosis. This surgical method can accomplish bilateral nerve root decompression without injury of supra- / inter-spinous ligament complex or contralateral paraspinal muscles. In the present study, lumbar canal stenosis of the seven patients undergoing long-term hemodialysis was treated by this technique, and the surgical outcome was evaluated using the Japanese Orthopedic Association score (JOA score) excluding the assessment of urinary function (highest possible score, 29points). The JOA score ranged preoperatively from 4 to 22 points (mean, 10.9 points), and was improved postoperatively ranging from 16 to 25 points (mean, 20.7points). The increase in points was equivalent to that of non-dialyzed patients receiving the same operation for lumbar canal stenosis: preoperative scores ranged from 13 to 21 points (mean, 16.7 points), and postoperative scores ranged from 24 to 29 points (mean, 26.7 points). Patients could walk and start rehabilitation training on the next day after their operation, and the postoperative hospital stay ranged from 17 to 39 days (mean, 25.7 days). The technique of bilateral spinal decompression through unilateral laminotomy provides a less invasive operation with an excellent outcome for lumbar canal stenosis associated with long-term hemodialysis.

Key word: long-term hemodialysis, bilateral decompression through unilateral laminotomy, lumbar canal stenosis,
 β 2-microglobulin amyloid, lumbar canal stenosis

Spinal Surgery 18 (3) : 189~195 2004

(Received : September 4, 2004, Accepted : November 4, 2004)

阪和記念病院 脳神経外科, 阪和記念病院 人工腎科*, 大阪大学医学部 脳神経外科** (連絡先: 佐々木 学, 〒558-0011 大阪市住吉区
荻田7-11-11 阪和記念病院 脳神経外科) Address reprint request to: Manabu Sasaki, M.D., Department of Neurosurgery, Hanwa
Memorial Hospital, 7-11-11 Karita, Sumiyoshi-ku, Osaka, 558-0011, Japan

Table 1 : Clinical features of the long-term-hemodialysis patients with lumbar canal stenosis

症例	年齢	性別	透析歴	症状	罹患椎間
1	61	M	27年	右	L3-4 (I度のすべり症を伴う)
2	65	M	27年	両側	L4-5
3	56	M	28年	右	L4-5
4	48	M	12年	左	L3-4, L4-5
5	66	M	24年	両側	L3-4, L4-5
6	55	M	24年	左	L2-3, L4-5, L5-S1
7	69	F	26年	両側	L2-3, L3-4

Table 2 : Past-history of the long-term-hemodialysis patients

症例	合併疾患
1	橋梗塞, 総腸骨動脈狭窄症ステント留置術後, 冠動脈狭窄症ステント術後
2	左手根管症候群術後, 両側変形性膝関節症
3	左手根管症候群術後, 右肩骨膜切除術後
4	両側手根管症候群術後, 頸椎OPLL
5	頸椎症性頸髄症術後, 両側変形性膝関節症
6	副甲状腺摘出術後, 左大腿骨頭壊死
7	副甲状腺摘出術後, 右肩関節滑膜切除術後

はじめに

長期透析患者は透析アミロイドーシスによる椎間関節や黄色靭帯、椎間板へのアミロイドの沈着から脊柱管狭窄症をしばしば合併する [3, 5]。長期透析患者数が増加する傾向にある現状では、今後は我々がこのような患者を治療する機会も増加すると考えられる。透析患者の手術では、全身状態や骨の脆弱性、関節や靭帯の変性に伴う脊椎の不安定性を考慮してできる限り低侵襲の術式を選択する必要がある。我々は以前より腰部脊柱管狭窄症に対して片側進入両側脊柱管開窓術により腰椎の後方支持組織を可及的に温存しつつ、硬膜管と両側の神経根の除圧を行ってきた [4]。今回、我々は長期透析患者の腰部脊柱管狭窄症 7 例に対して顕微鏡下で本術式を行い、良好な結果を得たので報告する。

対象及び方法

平成15年5月から平成16年5月までに当院で手術を行った10年以上の長期透析患者 7 人（年齢48～69才，平均60才）を対象とした（Table 1）。手術成績は手術前後に日本整形外科学会腰痛疾患スコア（以下JOAスコア）の

膀胱機能を除く29点満点で評価を行った。術後のJOAスコアの評価は退院後1ヶ月以上経過して症状が安定した時期に行った。JOAスコアの術前後の改善度と術後の在院日数を非透析例と比較するため、同時期に同じ術式を行った45才以上の非透析患者6人（年齢48～75才，平均62.8才）も同様に評価して比較検討した（Table 3）。

結 果

<腰椎以外の合併疾患の状態>

透析に至った原疾患は全例慢性糸球体腎炎であり、手術時点での透析歴は12～28年，平均24.6年であった（Table 1）。Table 2に示すように既往歴では腰椎以外の関節症の合併が多く、長期透析による全身の関節の変性、破壊性変化を反映していた。症例1では血管障害による全身の虚血性変化が認められた。これらの合併症は術前、術後ともJOAスコアの点数に影響をしていると思われる。症例5は腰椎手術の半年前に頸部脊柱管狭窄症に対して椎弓形成術を行った。他の6例も術前のMRIで脊柱管狭窄症を認め（Fig. 1, 2）、頸髄症の症状を示す例も6例中5例あった。

Table 3 : Surgical outcome of lumbar canal stenosis for long-term-hemodialyzed and non-dialyzed patients

＜長期透析患者＞						＜非透析患者＞					
症例	年齢	性別	JOA score 術前	術後	術後 入院日数	症例	年齢	性別	JOA score 術前	術後	術後 入院日数
1	61	M	8	21	22日	1	74	M	14	27	24日
2	65	M	4	16	33日	2	65	F	15	24	10日
3	56	M	7	19	32日	3	48	F	13	27	10日
4	48	M	8	22	18日	4	51	F	21	29	3日
5	66	M	12	22	39日	5	64	F	18	28	11日
6	55	M	22	25	17日	6	75	M	19	25	11日
7	69	F	15	20	19日						

＜腰椎症の術前の病状（Table 1）＞

罹患レベルは1椎間3例，2椎間3例，3椎間1例と半数以上が多椎間病変であった．症例1には罹患レベルにMeyerding分類でI度のすべり症を認めた．MRIでは黄色靱帯が高度に肥厚していた（Fig. 1, 2）．術前の症状では間欠性跛行と根症状は全例に認められ，根症状は4例が片側性，3例が両側性であった．症例1～5は下肢症状や筋力低下，感覚障害の部位が画像検査で圧迫を受けている神経根支配領域に明瞭に一致していたが，症例6，7は症状の部位や程度が短期間で変動し，感覚障害や筋力低下の障害神経根領域が不明瞭で主に馬尾症状を呈していると思われた．特に症例7は左大腿骨頭壊死を合併していたため，腰椎の変性による症状かどうかの判別が難しかった．このような症例には，歩行や立位負荷試験による神経学的所見の変化を観察して神経原性の症状かどうかを理学療法士と2重で評価をした上で手術を行った．

＜手術方法と術中所見＞

手術は腹臥位で行い，術後の肩関節痛を防止するために両上肢は挙上させずに体幹の側方に固定した体位で行った．皮膚切開は症状の強い側に正中より5mm側方で行い，1椎間病変であれば3～4cm程度，多椎間病変では1椎間増える毎に3cm程度延長した．片側の椎弓を露出し，laminotomyを行って脊柱管内に進入して，まず同側の除圧を行った．内側椎間関節切除は手術台を同側に回旋させてから行うことで下関節突起の切削を最小限にとどめて，上関節突起の内側を直視下で切削した

（Fig. 1, 2）．神経根の除圧は走行に沿って椎弓根の内側縁を回り込むところまで行った．対側の除圧の際は手術台を対側に回旋させた後，棘突起下をドーム状に切削して対側に進入した．対側も神経根の起始部から椎弓根の内側縁を回り込むところまで除圧を行った．術前の症状が片側性であっても，予防的に両側の神経根の除圧を行った．神経根や硬膜管の圧迫は肥厚した黄色靱帯が主な原因であり，特に上関節突起周辺で肥厚が高度であった．ヘルニア髓核摘出を行ったのは3例であったが，どの症例もヘルニアは非常に硬く，髓核も弾力性を失って脆いものであった．手術時間は165～380分（平均277分），出血量は100～500ml（平均243ml）であった．非透析例の手術時間は170～345分（平均216分），出血量は20～200ml（平均55ml）であったが，一椎間当たりの平均手術時間と出血量は，透析例が161分，142ml，非透析例が185分，47mlで出血量は透析例で多いものの，一椎間の処置に要する時間に差はなかった．摘出した黄色靱帯やヘルニア髓核には組織診断で全例透析アミロイドーシスに特徴的な $\beta 2$ ミクログロブリン（ $\beta 2$ MG）アミロイドの沈着が認められた．

＜手術結果（Table 3）＞

手術翌日より歩行を許可したが，温存した傍脊柱筋の筋力を維持する目的でコルセットは使用しなかった．7例とも独歩で退院でき，術後在院日数は17～39日（平均25.7日）であった．JOA scoreは術前が4～22点，平均10.9点であったが，術後は16～25点，平均20.7点に改善した．症例6，7のように根症状がやや不明瞭で馬尾症

Fig. 1: T2-weighted MR imaging of Case 2.

a, b: Preoperative lumbar MR imaging showing L4-5 canal stenosis with hypertrophied ligamentum flavum.

d: Cervical imaging showing odontoid mass and cervical canal stenosis with high intensity area in the cervical cord at the C5-6 level.

e, f: Postoperative lumbar imaging (one month after the operation).

c, g: Preoperative (c) and postoperative (g) CT scan. Medial facetectomy was performed after rotating the surgical table ipsilaterally in order to preserve the dorso-lateral portion of the ipsilateral facet.

状が強いものは、スコアの改善の程度が劣っていた。症例7はJOA scoreが術後1ヶ月で25点まで改善したが、術後3ヶ月に19点まで低下した。これはADLが改善した結果、大腿骨頭壊死の症状が増悪したためであり、後日他院で大腿骨頭置換術を受けた後は再び25点に上昇した。同じ時期に同じ術式を行った同年代の非透析患者6人の結果は、JOA scoreは術前13~21点、平均16.7点が術後24~29点、平均26.7点に改善し、術後在院日数は11.5日であった。

考 察

長期透析患者は透析アミロイドーシスによる脊椎変性疾患をしばしば合併する。その病態は関節や靱帯、椎間板への β 2MGアミロイド沈着とこれに誘起される2次性の炎症、線維化により組織の肥厚と正常構造の破壊が起こるものである[3, 5, 7]。透析を継続する限り

病状は進行性であり、長期透析患者数が年々増加傾向にあることから、脊柱管狭窄症を合併する患者数も増加していると思われる。しかし、透析患者の腰部脊柱管狭窄症の手術に関する報告は少ない。この原因として、患者の全身状態が悪いことと脊椎や支持組織の脆弱性により手術のリスクが高いため、手術が避けられる傾向があるためと考えられる。今回の7症例の中でも他院で透析を受けていた2例(症例3, 4)は他院の整形外科で保存的に経過観察されていたが、両者とも術前のJOA scoreが一桁であることが示すようにADLは高度に制限されていた。このような場合は長期透析患者であっても手術を行うべきであり、その際には全身状態を考慮した手術適応の決定と低侵襲の手術術式の選択、他科と連携した周術期管理を行うことが必要である。

長期透析患者の腰椎変性疾患の手術適応の決定する際には、頸部脊柱管狭窄症や全身の血管障害、関節症が高頻度に合併することを考慮する必要がある。透析アミロ

Fig. 2: T2-weighted MR imaging of Case 4

a, b, c: Preoperative lumbar imaging showing canal stenosis with hypertrophied synovial joints and ligamentum flavum.

d: Cervical imaging showing cervical canal stenosis with hypertrophy of the PLL and ligamentum flavum.

e, f, g: Postoperative lumbar imaging (one month after the operation).

b, f: L3-4, c, g: L4-5

イドーシスによる脊椎の変性は頸椎にも起こる。最も重篤な病態である破壊性脊椎関節症（Destructive spondyloarthropathy, 以下DSA）は頸椎に好発することが知られている。DSAは10年以上の透析期間、高齢の患者で発生頻度が増加し〔8〕、急速に脊椎の変形や不安定性が進行して神経症状を呈する場合がある。そのため長期透析患者であっても外科的治療を行われた報告が比較的多く、手術適応は増加傾向にある〔1, 6, 8〕。今回の7症例ではDSAを来している症例はなかったが、頸部脊柱管狭窄症は全例に認めた。程度の差はあったがほとんどが頸髄症の症状を認め、症例2のように頸髄内にT2強調画像で高信号を示す症例もあった。我々は、長期透析患者の脊椎変性疾患の手術適応はその症状が日常生活に支障を来している場合とし、症状と神経学的所見から頸椎と腰椎のどちらを手術すべきかを判断している。また、長期透析患者はアミロイドの沈着による下肢の血管障害や関節症を合併する頻度が高く、間欠

性跛行や腰痛、下肢痛を呈することがあるので注意が必要である。これらの鑑別には詳細な問診や身体所見、画像検査が必要なことは言うまでもないが、歩行負荷や立位負荷をかけた後に下肢の各々の筋力の変化や感覚障害を観察することが神経原性の要素を含んでいるかどうかの判断に有用であった。

長期透析患者の腰部脊柱管狭窄症の手術術式は高度の脊椎変性に対する確実な神経の除圧が行えて、かつ低侵襲であることが要求される。透析患者には骨の脆弱性と易感染性があるため、高度な脊椎の不安定性がなければ安易なインストゥルメンテーションの使用は控えるべきである。また、脊椎支持組織が脆弱であるため、術後に脊椎の不安定性を来さないためには脊椎支持組織をできる限り温存する必要がある。一方、透析患者の腰椎変性では肥厚した黄色靱帯により神経が圧迫されている場合が多く〔3, 5〕、両側の除圧が必要となる場合が多い。片側進入両側脊柱管開窓術はこのような意味で透析患者

の腰部脊柱管狭窄症に対して最適な術式である。本術式では、対側の神経除圧の際に脊柱管内からアプローチするため、棘上・棘間靱帯や対側の傍脊柱筋、椎間関節を温存することができる [4, 9]。術前の症状が片側性であっても予防的に両側の硬膜管及び神経根の除圧を行っているのは、病状が進行性であることと本術式が片側除圧とはほぼ同じ脊椎への侵襲で両側除圧ができるからである。術後は非透析患者と同様にコルセットなしで翌日より歩行させる方針としているが、これは温存した筋力の早期回復を促して早期に社会復帰させることが目的である。短期成績ではあるが術後に不安定性が増悪した症例は認めていない。

本報告では手術成績を術前後のJOA scoreと術後に要した入院期間で評価した。長期透析例は術前のJOA score 1桁が7例中4例と術前の状態が非常に悪いことが分かる。これらの患者でも手術によりスコアは平均9.8点の改善があり、非透析患者の10.0点と差がなかった。一方、スコアの改善率では透析例が平均52.6%、非透析例は平均81.6%と大きな差が生じた。この原因は、症例7の経過から分かるように下肢の関節症など腰椎症以外の症状がスコアに影響するからである。また、透析患者は筋肉の状態も悪く、通常よりも筋原性の症状がスコアに反映されやすい。そのため術後のスコアが低くなり、スコアの改善率が劣る結果となった。術後の在院日数もこの影響を受けている。長期透析患者では平均25.7日と非透析患者の平均11.5日の2倍以上の日数を要しているが、ほとんどの症例で術直後から症状やADLの改善は得られた。しかし、透析例ではADLが改善すると下肢の関節症の悪化や筋原性疼痛が出現する例が多く、非透析例に比べて理学療法に要する日数が通常より長くなる傾向があった。このように長期透析例では元々の筋力低下があり、全身の関節症の状態が悪いことから、術後にこれらへの配慮を行って管理することが必要となることを術前より考慮する必要がある。

長期透析患者の脊椎手術は周術期のイレウスや心・循環器系の合併症などにより高い周術期の死亡率が報告されているため [1, 2]、他科と連携して周術期管理を行う必要性が高い。我々の施設では、手術前日と当日の午前中に通常の半分の時間で透析を行うことにより、循環動態の変化は少なくしつつ、電解質の補正や術後の麻酔覚醒遅延の予防を行っている。透析患者は免疫力が低下した状態にあるため、術後の抗生物質は肝臓で主に代謝されるものを通常量の半量で1週間使用している。今回の7例で術後の感染や抗生剤投与による副作用は認め

なかった。透析患者では手術翌日の検査で貧血がなくても徐々に貧血が進行することがあり、特に手術後1週間以内に多いため注意が必要である。今回の7例では、術後に合併症を認めた症例はなかったが、マイクロサージェリーによる低侵襲手術とこれによる早期離床、周術期の厳重な全身管理を行えば、重篤な合併症のリスクも最小限にすることができると考えている。今後は我々脳神経外科医が手がけていくべき分野の一つと考えている。

本稿の要旨は第19回日本脊髄外科学会、2004年6月17日に発表した。

文 献

1. Abumi K, Ito M, Kaneda K: Surgical treatment of cervical destructive spondyloarthropathy (DSA). *Spine* 25: 2899-2905, 2000
2. Cuffe MJ, Hadley MN, Herrera GA, Morawetz RB: Dialysis-associated spondyloarthropathy. Report of 10 cases. *J Neurosurg* 80: 694-700, 1994
3. Ito M, Abumi K, Takeda N, Satoh S, Hasegawa K, Kaneda K: Pathologic features of spinal disorders in patients treated with long-term hemodialysis. *Spine* 23: 2127-2133, 1998
4. 岩月幸一, 吉峰俊樹, 加藤天美, 佐々木 学, 安田恵多良: 腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入拡大開窓及び両側椎間関節内側切除及び椎間孔開放術. *Spinal Surgery* 17: 125-130, 2003
5. Marcelli C, Perennou D, Cyteval C, Leray H, Lamarque JL, Mion C, Simon L: Amyloidosis-related cauda equina compression in long-term hemodialysis patients. Three case reports. *Spine* 21: 381-385, 1996
6. Naito M, Ogata K, Nakamoto M, Goya T, Sugioka Y: Destructive spondyloarthropathy during long-term haemodialysis. *J Bone Joint Surg Br* 74: 686-690, 1992
7. Ohashi K: Pathogenesis of beta2-microglobulin amyloidosis. *Pathol Int* 51: 1-10, 2001
8. Shiota E, Naito M, Tsuchiya K: Surgical therapy for dialysis-related spondyloarthropathy: review of 30 cases. *J Spinal Disord* 14: 165-171, 2001
9. Weiner BK, Walker M, Brower RS, McCulloch JA: Microdecompression for lumbar spinal canal stenosis. *Spine* 24: 2268-2272, 1999

Reviewer's comment：松村 明（筑波大学臨床医学系 脳神経外科）

全身状態などについて特別な配慮が必要な長期透析患者7例の腰椎症に対して、片側進入両側脊柱管開窓術を行った手術治療成績についてまとめ、その治療法・効果について考察を行った論文です。ふだんあまり透析患者の脊髄手術に接しない者にとって周術期の管理法についても具体的に詳細に記載されており、大変勉強になる論文であると思われます。

長期透析患者において低侵襲手術を行うことは合理的であり、systemic diseaseとしてのアミロイド沈着などを考慮して片側進入法により両側の神経根除圧手術を行うことも妥当だと思われます。今回は短期成績についてまとめられていますが、骨の脆弱性などの問題もあり、長期フォローアップの成績も追跡して発表していただきたいと思います。

他にも低侵襲手術で両側脊柱管開放術を行う方法がありますが、それぞれ術者の慣れた方法で行えば同等の成績が期待されますので、腎不全患者においても症状が強い場合には全身管理をきちんと行ったうえで、手術を実施することが肝要と考えます。

Reviewer's comment：水野 順一（愛知医科大学医学部 脳神経外科）

本論文は、10年以上の長期透析患者7人の腰椎症、腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除圧術の成績についてまとめられています。著者らの言うように透析患者に対する手術は合併症の多さゆえ敬遠される傾向があり、時として高度な神経症状が完成するまで放置されることが経験されます。著者らは低侵襲手術でこうした患者の神経症状を緩和しており、その有用性を証明しています。考察にて本手術法を積極的に行うことが推奨されており、小生も同感です。今後さらに軟部組織の変性のみでなく関節の変形を伴う側弯症やすべり症を合併する場合にいかに対処するか、さらなる検討を期待しています。