北太平洋中西部におけるヨシキリザメに対する調査用流し網の網目選択性

吉満友野,¹ 東海 正,^{1*} 米崎史郎,² 清田雅史²

(2016年9月17日受付, 2017年10月5日受理, 2017年12月28日J-STAGE 早期公開)

¹東京海洋大学, ²(国研)水産研究・教育機構国際水産資源研究所Selectivity of research driftnet for blue shark *Prionace glauca* in the Northwest PacificTOMOYA YOSHIMITSU,¹ TADASHI TOKAI,^{1*} SHIROH YONEZAKI² AND MASASHI KIYOTA²¹Tokyo University of Marine Science and Technology, Minato, Tokyo 108-8477, ²National Research Institute of Far Seas Fisheries, Yokohama, Kanagawa 236-8648, Japan

Blue shark *Prionace glauca* is a large shark species distributed in tropical to temperate oceans around the world. Since blue sharks often swim in the surface layer, they are caught by driftnet fisheries. Research driftnet surveys with a series of driftnets of 13 different mesh sizes of 22–157 mm were conducted in the Northwest Pacific Ocean during 1999–2013. From the data on precaudal length distribution of blue shark caught by each mesh size in these surveys, this study estimated the mesh selection curve of driftnets by using the SELECT method. AIC chose the log-normal selection curve model. Simultaneously, the precaudal length frequency distribution of the blue shark encountering the driftnets was also estimated. In this driftnet survey catch, the abundance of large-sized blue shark was underestimated because no driftnets of sufficiently large mesh size were used. For blue shark with the optimum precaudal length for a given mesh size, the girth at the posterior end of the mouth aperture was smaller than that at the mesh perimeter. Blue shark was most effectively retained by the entangling process in which the shark was snagged, rolled or entangled in the net after the snout entered the mesh.

キーワード：SELECT モデル, 網目選択性, 魚体周長, 流し網, ヨシキリザメ

日本で水揚げされるサメ類のうち, 7割以上はヨシキリザメ *Prionace glauca* であり, 塩釜漁港, 気仙沼漁港, 石巻漁港, 銚子漁港や和歌山県の勝浦漁港で多く水揚げされている。¹⁾ また, ヨシキリザメは延縄や流し網などで漁獲され, 冷凍することなく鮮魚として水揚げされることが多く,¹⁾ さらに加工品, 特に鰭を切り取って乾燥させたフカヒレは中華料理用の高級食材として利用されている。²⁾ ヨシキリザメの生息域は世界中の熱帯域から温帯域の広範囲に及び, 外洋性サメ類の中で最も資源豊度が高いと考えられている。³⁾ 各大洋の漁業管理機関ではヨシキリザメを含めた外洋性サメ類の資源評価や管理が求められており, 資源解析において基礎的な情報である体長組成を正確に把握することが不可欠である。^{4,5)} ヨシキリザメは主に表層域を遊泳し, 高次捕食者として小型浮魚類や軟体類を捕食している。^{6,7)} このことから, 資源調査で標本を採集するために, 表層域の生物

を漁獲することができる流し網が用いられることがある。^{6–11)} しかし, 流し網には網目選択性が存在することが知られている。^{12–14)} 流し網を用いた資源調査結果では, 選択性による体長組成の偏りを考慮する必要がある。

中野, 島崎¹⁵⁾は石田の方法¹²⁾を用いて, ヨシキリザメに対する流し網の選択性を推定した。石田の方法¹²⁾は, 選択性曲線を表すために特定の関数式を仮定することなく目分量で選択性曲線を引くので, 推定誤差の評価ができない等の問題点が指摘されている。¹⁶⁾ また複数の目合を用いた調査用流し網では, 通例一晩に一回の操業を行う。そして, 一晩ごとに定点を変えながら操業を繰り返していく。こうした繰り返しの操業の中では, 破網などによって一部の目合の流し網の使用反数が変化することがある。また, 流し網では, しばしば大量に漁獲されることがあり, 標本を抽出して体長を計測することになる。石田の方法¹²⁾では, 反数あたりの漁獲尾数を

CPUE として求め、これを基に選択性曲線を求めるが、目合別の使用反数や標本抽出率が変化した複数回の操業を単純に合算して扱うことはできない。近年では、この石田の方法¹²⁾に代えて、選択性曲線を関数式で表し、そのパラメータを最尤推定する方法が標準的に用いられており、その解析方法の一つに Fujimori and Tokai¹⁷⁾の方法がある。Harada *et al.*¹⁸⁾ や Yamashita *et al.*¹⁹⁾ は操業ごとに採集努力量が変化した場合の合算手法を示した。矢野²⁰⁾と佐藤^{21,22)}はこの方法を用いて調査用流し網を使用した資源調査のデータからマサバ *Scomber japonicus* やマイワシ *Sardinops melanostictus* に対する流し網の選択性曲線を推定した。また、推定した選択性曲線から合成選択性曲線²²⁻²⁴⁾を求めることで、調査に用いた目合の組み合わせが、資源調査にどの程度適合しているか検討することができる。²²⁾さらに、推定した選択性曲線において、相対効率が最大値である 1.0 になる最適体長と、相対効率が 0.5 以上になる体長の範囲を求め、そのときの魚体の各部周長を網目内周長と比較することで、流し網への掛かり方を考察することができる。^{20,21)}

本研究では、Fujimori and Tokai¹⁷⁾の方法を用いて、ヨシキリザメに対する流し網の選択性曲線パラメータを推定した。そして、ブートストラップ法を用いて、選択性曲線パラメータの推定誤差とともに流し網に遭遇したヨシキリザメの体長組成の推定を試みた。さらに、本調査で用いた目合の組み合わせが資源調査に適しているか検討するため、合成選択性曲線²²⁻²⁴⁾を求めた。また、ヨシキリザメの流し網への掛かり方を考察した。

材料と方法

流し網による調査方法 1999 年から 2012 年 4 月から 8 月に（国研）水産研究・教育機構 国際水産資源研究所（1999–2010 年、水産総合研究センター遠洋水

産研究所）が、また 2013 年 6 月から 8 月に同機構東北区水産研究所が、青森県産業技術センター所属の開運丸（206 t）を用船して実施した北太平洋中西部のアカイカ調査用流し網の操業データを用いた（Fig. 1）。この調査で使用された一連の調査用流し網は、年によって異なる目合の組み合わせで構成されていた（Table 1）。標準的な目合と使用反数の組み合わせは 48 mm（3 反）、55 mm（3 反）、63 mm（3 反）、72 mm（3 反）、82 mm（3 反）、93 mm（3 反）、106 mm（3 反）、121 mm（3 反）、138 mm（3 反）、157 mm（3 反）であった。目合間の公比は、22–48 mm 目合ではほぼ 1.30 であり、48–157

Table 1 Measurement of mesh size and mesh size combinations

Nominal mesh size (mm)	Number of panels			Stretched inner mesh length (mm)	
	1999, 2000, 2009	2001–2008	2010–2013	mean	(SEM)
22		2		22.02	(0.067)
29		1		27.58	(0.068)
37		1	2	36.13	(0.062)
48	3	3	3	45.52	(0.094)
55	3	3	3	52.89	(0.065)
63	3	3	3	60.63	(0.067)
72	3	3	3	69.42	(0.114)
82	3	3	3	79.21	(0.052)
93	3	3	3	90.37	(0.058)
106	3	3	3	104.30	(0.066)
121	3	3	3	117.79	(0.076)
138	3	3	3	135.28	(0.091)
157	3	3	3	152.43	(0.094)
115	20	16	18	111.71	(0.064)

Drift net of 115 mm mesh size was commercially used for catching salmon.

Fifty meshes were measured for each mesh size.

SEM, Standard error of mean.

Fig. 1 Locations of research driftnet operations.

mm 目合ではほぼ 1.14 であった。また、一連の流し網の中で両端は網形状が変形しやすいことが知られていることから、これら目合の流し網形状で変形が生じないように 115 mm 目合の商業用網が両端に配置された。この 115 mm 目合の流し網による漁獲で得られたデータは解析には用いなかった。流し網の網地は、緑色のナイロンモノフィラメントの網糸を用いて二重蛙又結節で編まれており、一反の長さは約 50 m であった。

2014 年 1 月 20 日に、株式会社日東製網函館工場に保管されていた使用前の流し網を用いて、目合別に流し網一反上で任意に選んだ 50 カ所の網目について、その目合内径をデジタルノギスで測定した (Table 1)。

漁獲したヨシキリザメは目合ごとに計数し、全数あるいは漁獲物が多い場合は無作為に抽出した標本について尾鰭前長を測定した。それぞれの階級である程度の漁獲尾数が含まれるように、40 mm の階級幅で尾鰭前長組成を作成した。選択性曲線を推定するために、この目合別の尾鰭前長組成を用いた。

選択性曲線の推定 15 年間の合計 301 回の操業データから解析に用いるデータを抜き出した。操業回によっては、目合の組み合わせや使用反数や標本抽出率は必ずしも同じではなかった。Harada *et al.*¹⁸⁾ は、複数の操業回間で目合別の努力量 (使用反数と標本抽出率) の比が等しい場合に、それら操業回のデータは合算して選択性の解析に供することができることを示した。そこで、まずヨシキリザメが採集された目合について使用反数がいずれの目合も 3 反であり、かつ採集されたヨシキリザメの全数が計測された 89 操業回分を合算した。このうち、調査期間を通じて共通に用いられた 10 種類 (48, 55, 63, 72, 82, 93, 106, 121, 138, 157 mm) 目合について、2 つ以上の目合で漁獲があった尾鰭前長階級を解析に使用した。この結果、320 mm 以上 360 mm 未満から 1,400 mm 以上 1,440 mm 未満の階級までの 28 の尾鰭前長階級のデータを用いた。

選択性曲線のパラメータ推定に Fujimori and Tokai¹⁷⁾ の方法を用いた。目合 m_i ($i=1, 2, \dots, M$, 本研究では目合の数 $M=10$) の流し網による、 j 番目の尾鰭前長階級 l_j ($j=1, 2, \dots, N$, 本研究では 28 階級なので、 $N=28$) におけるヨシキリザメの漁獲尾数を n_{ij} とする。目合 m_i には、目合を測定した値の平均値を用いた (Table 1)。漁獲尾数 n_{ij} を、相対漁獲強度 p_i 、遭遇尾数 λ_j 、選択性の相対効率 S_{ij} を含んだモデルで表すと次の式になる。

$$n_{ij} = p_i \lambda_j S_{ij} \quad (1)$$

相対漁獲強度 p_i は、漁獲努力量 (本研究では使用反数) を x_i 、漁具能率を q_i とすると

$$p_i = q_i x_i / \sum_{i=1}^M q_i x_i \text{ と表せる } \left(\sum_{i=1}^M p_i = 1 \right)。$$

なお、本研究では q_i は目合に関わらず一定と仮定する。したがって、 p_i は次式で求められる。

$$p_i = x_i / \sum_{i=1}^M x_i \quad (2)$$

流し網の選択性において、同じ選択率を示す目合 m_i と尾鰭前長 l_j の組み合わせは幾何学的相似が成り立つものとする Baranov²⁵⁾ の仮定を置く。このとき 2 つの変数 m_i と l_j の代わりに、目合相対尾鰭前長 $R_{ij} (= l_j / m_i)$ を変数として選択性 $s(R_{ij})$ を表し、これを選択性曲線マスターカーブと呼ぶこととする。^{17,26)} 流し網を含む刺網の選択性は、ある大きさの個体で漁獲される確率が最大となる釣鐘型の曲線を用いて表される。^{13,17,27,28)} そこで本研究では、左右対称形として正規分布曲線関数 (normal distribution)、左右非対称形の関数として対数正規分布曲線関数 (log-normal distribution) の 2 種類の関数形を用いる。正規分布曲線関数、対数正規分布曲線関数はそれぞれ以下のとおりである。

正規分布曲線関数：

$$s(R_{ij}) = \exp \left(- \frac{(R_{ij} - R_0)^2}{2\sigma^2} \right) \quad (3)$$

対数正規分布曲線関数：

$$s(R_{ij}) = \exp \left(- \frac{(\ln R_{ij} - \ln R_0)^2}{2\sigma^2} \right) \quad (4)$$

ここで、 R_0 は選択性曲線の最大値を与える目合相対尾鰭前長であり、 σ は釣り鐘状の曲線の幅を決定するパラメータである。次式の対数尤度関数を最大にすることで関数 $s(R)$ のパラメータを推定する。

$$\ln L = \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^M \left(n_{ij} \ln \left(p_i s(R_{ij}) / \sum_{i=1}^M p_i s(R_{ij}) \right) \right) \quad (5)$$

上述した 2 種類の関数について、それぞれパラメータを最尤推定し、AIC²⁹⁾ によりモデルを選択した。AIC は、(5) 式の最大対数尤度 MLL とそれぞれのパラメータ数 π を用いて、次式で求められる。

$$\text{AIC} = -2\text{MLL} + 2\pi \quad (6)$$

得られたマスターカーブから、佐藤ら²²⁾ と同様に、合成選択性曲線を推定した。ただし、佐藤ら²²⁾ が扱った流し網調査では、標本抽出が行われていたとともに、一反の網の長さが目合によって異なったため、標本抽出率と網の長さを努力量の違いとして考慮していた。これに対して、本研究が扱うデータでは、標本抽出は行われておらず、かつ一反の網の長さは全て同じ約 50 m であったので、(7) 式のように使用反数の違いだけを考慮して、相対採集強度 f を尾鰭前長別に求めた。

$$f(l_j) = \sum_{i=1}^M x_i s(R_{ij}) \quad (7)$$

本研究が取り扱う流し網を用いた資源調査で得られた標本のうち、目合 48–157 mm で採集された目合別尾鰭前長組成 n_{ij} は、選択性の効果による偏りを持つことと

なる。そこで、これらの目合の流し網に遭遇した尾鰭前長階級 l_j における遭遇尾数の相対値 A_j を (8) 式で求めた。尾鰭前長階級 l_j の目合別漁獲尾数の合計

$$A_j = \frac{\sum_{i=1}^M n_{ij}}{\max_{1 \leq j \leq N} \left(\sum_{i=1}^M n_{ij}/f(l_j) \right)} \quad (8)$$

これらの推定に際しては、標本データからランダムに 1000 回のリサンプリングしたブートストラップ法^{30,31)}を用いて、選択性曲線のパラメータと同時に (8) 式における遭遇尾数の相対値 A_j の推定を行い、それぞれパラメータの推定誤差を求めた。

尾鰭前長と魚体各部の周長の計測 流し網を含む刺網で紡錘形の魚が漁獲される場合、「刺し」と「鰓掛かり」、「絡み」の掛かり方が考えられる。^{13,27)} 特に「刺し」と「鰓掛かり」は、漁獲した流し網の網目内周長に対する体各部の周長が関係するとされ、体長に対する鰓蓋後端での胴周長や最大胴周長などの関係式と推定した選択性曲線の結果を用いることで、網目に魚体がどの部位まで入って保持されているか検討されている。^{20,21)} そこで、2013 年の調査で得られたヨシキリザメ 56 個体について、口裂後端での周長 G_m 、胸鰭基部前端での胴周長 G_p 、最大胴周長 G_{max} 、第一背鰭基部前端の胴周長 G_d を計測し (Fig. 2)、尾鰭前長に対するそれぞれの周長の関係式を求めた。また、相対効率が最大値の 50% 以上になる尾鰭前長の範囲を 50% 選択尾鰭前長範囲 (50% relative retention range)³²⁾ とし、目合別に求めた。なお、各部周長の計測には Yokota and Tokai³³⁾ の周長測定器を用いた。また本研究では、網目内径を 2 倍にした値を網目内周長として扱った。

結 果

推定された選択性曲線 対数正規分布曲線関数を用いた選択性曲線のモデルは、正規分布曲線関数を用いたモ

Fig. 2 Measurement of blue shark body. l , precaucal length; G_m , girth (mm) at the posterior end of the mouth aperture; G_p , girth (mm) at the anterior end of the base of the pectoral fin; G_{max} , maximum girth (mm); G_d , girth (mm) at the anterior end of the base of the first dorsal fin.

デルよりも AIC が小さかった。そこで、選択性曲線の最適モデルとして対数正規分布曲線関数を採用した (Table 2)。目合相対尾鰭前長 (以後、尾鰭前長を PCL と略する) に対する標本尾数割合の推定値を観測値とともに、PCL 階級別に図示した (Fig. 3)。標本数が多い 480–1,240 mm の PCL 階級では、目合相対 PCL に対する観測値の変化を推定値はうまく表している (Fig. 3)。

Table 2 Curve parameters and AIC values

	Normal	Log-normal
Curve parameters		
R_0 (SE)	5.03 (0.37)	5.83 (0.09)
σ (SE)	3.43 (0.35)	0.31 (0.02)
AIC	2865.8	2739.0

SE, Standard error.

Fig. 3 Observed catch proportion ϕ_{ij} (open diamonds) and catch proportion $\phi(l_{ij})$ estimated from the best fit model (closed circles and lines) plotted versus relative length (= precaucal length / mesh size).

Fig. 4 Estimated master curve of driftnet mesh selection for blue shark.

最適となったモデルにおける選択性曲線マスターカーブを Fig. 4 に図示した。このパラメータのうち最適相対 PCL の推定値は 5.83 であった (Table 2)。これは、ある目合に対して、その 5.83 倍の PCL を持つヨシキリザメが最も効率よく採集されたことを意味する (Fig. 4)。

この選択性曲線マスターカーブ (Table 2, Fig. 4) において、目合相対尾鰭前長 R に目合の値を代入して尾鰭前長 l に変換することで、目合別選択性曲線を求めることができる。そこで、本研究で用いた調査用流し網の目合について目合別選択性曲線を求めた (Fig. 5)。また、(7)式のとおり、目合別に漁獲努力量と相対効率を乗じて、これらを積算して合成選択性曲線を求めた (Fig. 5)。Table 1 に示された 3 つの時期 (1999 と 2000, 2009 年 ; 2001–2008 年 ; 2010–2013 年) で、調査に用いられた目合の組み合わせとそれぞれの反数が異なった。このため合成選択性曲線はやや異なる形状となった。しかし、いずれの年でも、合成選択性曲線は PCL500 mm 付近のときに相対採集強度が最大となった。2001–2008 年では小さな目合である 22, 29 mm 目合が含まれたことで、PCL150 mm 以下の相対採集強度が他の年よりも大きくなった。選択性曲線の解析に用いた目合別の PCL 組成とともに選択性曲線を図示した (Fig. 6)。目合が大きな流し網ほど大型のヨシキリザメを漁獲する傾向があった。目合 72 mm 以上では、漁獲尾数が 40 個体以上と十分多く、PCL 組成のモードが選択性曲線のピークに近い。また、その両側の PCL では選択

性曲線の効率減少に応じて漁獲尾数も減少している。

選択性曲線マスターカーブの相対効率が最大値の 50 % 以上になる目合相対 PCL の範囲である 50 % 選択相対 PCL 範囲は 4.05 から 8.40 となった。したがって、本研究で用いられた最大目合である 157 mm 目合における 50 % 選択 PCL 範囲の上限値は PCL 1,280 mm と推定された。

流し網に遭遇したヨシキリザメの PCL 組成 調査用流し網で漁獲したヨシキリザメの PCL 組成と推定した遭遇尾数の相対値を PCL 階級別に示した (Fig. 7)。調査用流し網で漁獲した PCL 組成では、PCL 940 mm 以上では漁獲尾数が少なく、魚体が大きくなるにつれて漁獲尾数も減少していく。これに対して、推定した遭遇個体の PCL 組成では、PCL 860 mm から 940 mm にか

Fig. 5 Selection curves of driftnet with each mesh size and pooled relative catching intensity.

Fig. 6 Precaudal length frequency distributions of the blue shark caught by driftnets with 48, 55, 63, 72, 82, 93, 106, 121, 138 and 154 mm mesh sizes and the selection curves.

Fig. 7 Precaudal length frequency distribution of the blue shark caught in all operations of research driftnets in this study, and the estimated distribution of the shark encountering the research driftnets. Error bars indicate standard errors.

Fig. 8 Relationships between precaudal length and each girth: open circles, G_m ; open squares, G_p ; cross marks, G_{max} ; and open diamonds, G_d .

Table 3 Regression lines between precaudal length and girth at each body position

Regression equation	Coefficient of determination
$G_m = 0.250l + 40.3$	0.74
$G_p = 0.420l - 11.0$	0.90
$G_{max} = 0.469l - 24.9$	0.84
$G_d = 0.441l - 20.1$	0.85

l , precaudal length (mm).

G_m , girth (mm) at the posterior end of the mouth aperture.

G_p , girth (mm) at the anterior end of the base of the pectoral fin.

G_{max} , maximum girth (mm).

G_d , girth (mm) at the anterior end of the base of the first dorsal fin.

て減少し、それ以上でほぼ一定に見える。

最適 PCL あるいは 50% 選択 PCL 範囲における各部周長と網目内周 PCL と各部周長を計測したヨシキリザメ全個体の PCL の範囲は 427–1,234 mm であった。PCL に対する口裂後端での周長 G_m 、胸鰭基部前端での胴周長 G_p 、最大胴周長 G_{max} 、第一背鰭基部前端での胴周長 G_d 、それぞれの回帰直線を求めた (Fig. 8, Table 3)。これらの回帰直線とともに、目合 82–157 mm における最適 PCL および 50% 選択 PCL 範囲を、目合別に網目内周長と同等の胴周長の位置に示した (Fig. 9)。いずれの目合でも、最適 PCL における胸鰭基部前端の胴周長 G_p 、最大胴周長 G_{max} 、第一背鰭基部前端の胴周長 G_d が網目内周長よりも大きく、口裂後端の周長 G_m だけが網目内周長よりも小さかった (Fig. 9)。50% 選択 PCL 範囲の上限値では、最大胴周長や第一背鰭基部前端の胴周ははじめ最小の周長である口裂後端部周長でも網目内周長より大きかった。また 50% 選択 PCL 範囲の下限値では、最大胴周長でも網目内周長より小さかった (Fig. 9)。

考 察

既往研究との比較 中野, 島崎¹⁵⁾は、本研究とは別

Fig. 9 Comparison between mesh perimeter and each girth. The solid circles represent optimum precaudal length, and the horizontal lines indicate the 50% relative retention range for the six mesh sizes from 82 to 157 mm.

Fig. 10 Comparison in selection curve of mesh sizes 82 and 121 mm between this study and Nakano and Shimazaki.¹⁵⁾ Solid diamonds represent catch relative to the best catch by mesh size for each precaudal length.

の流し網調査で漁獲されたヨシキリザメの目合別 PCL 組成を用いて、PCL400–790 mm の小型群と 500–990 mm の大型群それぞれに対して石田の方法¹²⁾を用いて選択性曲線を推定した。中野, 島崎¹⁵⁾のデータから 82 mm と 121 mm の目合について石田の方法¹²⁾に基づく相対効率のデータと選択性曲線を、本研究で推定した選択性曲線の結果とともに図示した (Fig. 10)。なお、中野, 島崎¹⁵⁾は目合内径の計測結果を示していないので、ここでは呼称目合を用いた。中野, 島崎¹⁵⁾の結果は本研究とは異なる操業データを用いてはいるものの、本研究の最適 PCL は両方でほぼ同様の結果となった

(Fig. 10)。選択性曲線の幅は本研究のほうが広がった。これは、石田の方法では目分量で選択性曲線を引いているので、選択性曲線の外側のデータを反映しなかったためだと考えられる。中野、島崎¹⁵⁾が推定した選択性曲線の最適 PCL は妥当であるものの、選択性曲線の幅を過小評価していたと考えられる。

漁獲尾数と遭遇尾数の相対値の比較 PCL 940 mm 以上の PCL 組成を見ると、漁獲尾数はすべての組成にわたって少なく、魚体が大きくなるにつれて減少していた (Fig. 7)。遭遇尾数の相対値では、PCL 860 mm から 940 mm にかけて減少し、それ以上ではほぼ一定に見える。これらのことは、本調査で漁獲したヨシキリザメの PCL 組成から、選択性を補正することなく資源の状況を判断すると、PCL 940 mm 以上の個体における資源量を過小評価する可能性を示唆している。

流し網によるヨシキリザメの保持機構 最適 PCL における胸鰭基部前端的胴周長 G_p と最大胴周長 G_{max} 、第一背鰭基部前端的胴周長 G_d のいずれも網目内周長よりも大きく、そして口裂後端の周長 G_m だけが網目内周長よりも小さかった (Fig. 9)。このことから、ヨシキリザメが最も効率よく流し網に漁獲されるのは、吻端から口裂後端部までの頭部が網目内に入ったときであると考えられる。

50% 選択 PCL 範囲の上限値では、最小となる周長である口裂後端部の周長でさえ網目内周長よりも大きかった (Fig. 9)。これは、吻端から必ずしも頭部全体が網目内に入らなくても流し網に掛ったことを意味している。実際に、漁獲されたヨシキリザメの頭部に網糸による傷が残っている個体が多かった (Fig. 11)。ヨシキリザメの体表は楯鱗に覆われている所謂サメ肌であり、特に尾鰭から頭部へ方向で体表面の摩擦が大きく、網糸が体表に掛かりやすい。したがって、頭部が口裂後端部まで網目内に入らなくても吻部が網目に入った後に、網糸が体表面に掛かり、漁獲される可能性がある。さらに、この範囲の下限値では最大胴周長でさえ網目内周長よりも小さかった (Fig. 9)。これは、最大胴部が網目

内を抜けられるほど小型の個体でも流し網に羅網することを意味する。すなわち、ヨシキリザメは大きな胸鰭を持つため、胸鰭が網目を通過する際の妨げとなり、網糸が掛かり、その後、逃げ出そうと暴れることで体の各部に羅網していったものと考えられる。実際に、流し網で水揚げされるヨシキリザメには体の様々なところに網糸が絡んでいることも多い。このように、ヨシキリザメは刺網で典型的な掛かり方である「刺し」や「鰓掛かり」よりもむしろ、吻部における「刺し」とともに、上述したような摩擦が大きな体表面に網糸が掛かることによる、体の各部の「絡み」で漁獲されたものと考えられる。中野、島崎¹⁵⁾もヨシキリザメが「絡み」によって流し網に漁獲されることが多いことを報告している。他のサメ類でも、このように流し網や刺網に絡まって漁獲されることが確認されている。^{34,35)}

本研究で推定した選択性曲線は、50% 選択相対 PCL 範囲がかなり広がった (Fig. 4)。体型が紡錘形であるマサバやマイワシの多くの個体は、「刺し」や「鰓掛かり」で流し網に掛かると考えられており、^{20,21)} 選択性曲線マスターカーブで 50% 選択相対 PCL 範囲は、マサバで 3.41–5.10 であり、²⁰⁾ マイワシで 4.00–5.17 であった。²¹⁾ これに対して、本研究で求めたヨシキリザメでは 50% 選択相対 PCL 範囲は 4.04–8.42 であった (Fig. 4)。このように、マサバやマイワシに比べると、ヨシキリザメの 50% 選択相対 PCL 範囲は 6 以上の高い値にまで広がっていることが分かる。これは、マサバやマイワシと異なり、ヨシキリザメでは上述したように体の一部に網糸が掛った後に「絡み」で漁獲された個体も多かったことによると考えられる (Fig. 9)。

ヨシキリザメ資源調査に向けた調査用流し網の目合の組み合わせ 本研究の調査で用いられた標準的な目合の組み合わせの中で、最小の目合 48 mm の流し網によるヨシキリザメの最適 PCL は 265 mm であった (Fig. 6)。ヨシキリザメは胎生であり、産み出されときの PCL は 300–430 mm とされる。⁹⁾ 本研究で用いられた調査用流し網では、さらに小さな目合 22, 29, 37 mm の流し網も組み合わせられる場合もあった (Table 1)。したがって、これらの調査用流し網の目合の組み合わせならば、産まれてすぐからの十分に小さな個体も網に遭遇さえすれば採集できたものと考えられた。またどの年でも、推定された合成選択性曲線によれば PCL が 685 mm までのヨシキリザメは比較的高い相対採集効率で漁獲できるものの、それ以上の PCL の個体については相対採集効率が急減する (Fig. 5)。調査に用いた目合のなかで最大の目合となる 157 mm では、PCL 1,280 mm で相対効率が 50% 以下となり、本研究で用いた一連の調査用流し網では PCL 1,280 mm 以上のヨシキリザメに対してはあまり採集効率が高くなかったことになる

Fig. 11 The snout of a blue shark caught by driftnet wedged into a mesh.

(Fig. 5)。実際に本調査で用いた目合の組み合わせでは、PCL 1,280 mm 以上のヨシキリザメの採集個体が少なく、流し網に遭遇した個体数の推定誤差も大きくなった (Fig. 7)。ヨシキリザメは PCL 1,400–1,600 mm で成熟し、成長すると 2.9 m に達するとされる。⁹⁾ また本調査と同様の時期に北太平洋中西部で行われた 118–250 mm 目合を用いた流し網での調査やえ縄の調査では、PCL 1,280 mm 以上のヨシキリザメが採集され、中には 2 m を超す個体も存在したとされる。^{9,36)} 従って成熟した大型のヨシキリザメを定量的に流し網で採集しようとするならば、157 mm よりも大きな目合の流し網を用いる必要がある。本研究で得られた選択性曲線マスターカーブでは、こうした大型個体の採集に際して、外挿とはなるものの、採集を必要とする PCL に対して適した目合を示すことができるので、今後、こうしたヨシキリザメの採集に適した目合の組み合わせを検討していくことが可能である。

本研究では、推定した流し網の選択性曲線によって漁獲物の PCL 組成における偏りを補正することで、流し網に遭遇したヨシキリザメの PCL 組成、つまり資源の PCL 組成を推定することができた。実際に、McKinnell and Seki¹⁰⁾ はアカイカ流し網の商業網 (目合 115 mm) で漁獲されたヨシキリザメを計測して、その平均値が全長 926 mm (PCL 687 mm) としている。一方、本研究の結果から 115 mm 目合 (内径 111.7 mm) の選択性曲線を求めると、その最適 PCL は 651 mm となり、非常に近い値を示した。つまり、商業網で得られたヨシキリザメの標本は、網目選択性の効果によって最適 PCL 付近の個体を多く漁獲していた可能性もある。今後は、漁具の選択性を考慮した資源解析³⁷⁾ やサメ類に対する刺網の混獲削減³⁸⁾ 漁業管理³⁵⁾ が検討されていくことが期待される。

謝 辞

本研究で解析に用いた資料が収集された北太平洋西部域におけるアカイカ流し網調査に参画いただきました (国研) 水産研究・教育機構東北区水産研究所 酒井光夫博士 (現所属 一般社団法人漁業情報サービスセンター) と加藤慶樹博士 (現所属 同機構開発調査センター)、若林敏江博士 (現所属 同機構水産大学校)、ならびに青森県産業技術センター開運丸の乗組員に御礼申し上げます。なお、本研究の一部は水産庁の国際資源調査事業と JSPS 科研費新学術領域研究 25121505 の助成を受けたものである。

文 献

- 1) Matsunaga H, Nakano H, Ishibashi Y, Nakayama K. Estimation of the amount of shark landing by species in the main fishing ports of Japan. *Nippon Suisan Gakkaishi* 2003; doi: 10.2331/suisan.69.178 (in Japanese with English abstract).
- 2) 藤原 健. ふかひれ加工品, 「全国水産加工品総覧」(福田 裕, 山澤正勝, 岡崎恵美子監修) 光琳, 東京. 2005; 233–236.
- 3) 甲斐幹彦. ヨシキリザメ, 平成27年度国際漁業資源の現況. 国立研究開発法人水産研究・教育機構, 2016 (http://kokushi.fra.go.jp/H27/H27_37.pdf).
- 4) Rice J, Harley S, Kai M. Stock assessment of blue shark in the North Pacific Ocean using stock synthesis. Science committee tenth regular session, Majuro, Marshall Islands, 2014; WCPFC-SC10-2014/SA-WP-08.
- 5) DiNardo G, Kohin S. ISC shark working group and information papers on blue shark. Scientific committee eleventh regular session, Pohnpei, Federated States of Micronesia, 2015; WCPFC-SC11-2015/SA-WP-09.
- 6) Kubodera T, Watanabe H, Ichii T. Feeding habits of the blue shark, *Prionace glauca*, and salmon shark, *Lamna ditropis*, in the transition region of the Western North Pacific. *Rev. Fish. Biol. Fish.* 2007; **17**: 111–124.
- 7) Cailliet GM, Bedford DW. The biology of three pelagic sharks from California waters, and their emerging fisheries: a review. *CalCOFL. Rep.* 1983; **24**: 57–69.
- 8) 中野秀樹. 北太平洋に分布するヨシキリザメの年齢と繁殖および回遊に関する生態学的研究. 遠洋水産研究所研究報告 1994; **31**: 141–219.
- 9) Nakano H, Seki MP. Synopsis of biological data on the blue shark, *Prionace glauca* Linnaeus. *Bull. Fish. Res. Agen.* 2003; **6**: 18–55.
- 10) McKinnell S, Seki MP. Shark bycatch in the Japanese high seas squid driftnet fishery in the North Pacific Ocean. *Fish. Res.* 1998; **39**: 127–138.
- 11) Megalofonou P, Yannopoulos C, Damalas D, Metrio GD, Deflorio M, Serna JM, Macias D. Incidental catch and estimated discards of pelagic sharks from the swordfish and tuna fisheries in the Mediterranean Sea. *Fish. Bull.* 2005; **103**: 620–634.
- 12) 石田昭夫. 刺網の網目選択性曲線について. 北海道区水産研究所研究報告 1962; **25**: 20–25.
- 13) Hamley JM. Review of gillnet selectivity. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 1975; **32**: 1943–1969.
- 14) 大関芳冲, 北川大二, 河合智康. 漁場外の分布量を含めたサンマ来遊資源量推定方法. 中央水産研究所研究報告 1998; **12**: 53–70.
- 15) 中野秀樹, 島崎健二. ヨシキリザメ (*Prionace glauca* L.) に対する流し網の網目選択性. 北海道大学水産科学研究彙報 1989; **40**: 22–29.
- 16) 東海 正. 石田の方法と北原の方法による釣鐘型選択性曲線の決定, 「漁具の選択特性の評価と資源管理」(東海 正, 北原 武編) 恒星社厚生閣, 東京. 2001; 40–50.
- 17) Fujimori Y, Tokai T. Estimation of gillnet selectivity curve by maximum likelihood method. *Fish. Sci.* 2001; **67**: 644–654.
- 18) Harada M, Tokai T, Kimura M, Hu F, Shimizu T. Size selectivity of escape holes on conger tube traps for inshore hagfish *Eptatretus burgeri* and white-spotted conger *Conger myriaster* in Tokyo Bay. *Fish. Sci.* 2007; **73**: 477–488.
- 19) Yamashita H, Shiode D, Tokai T. Longline hook selectivity for red tilefish *Branchiostegus japonicus* in the East China Sea. *Fish. Sci.* 2009; **75**: 863–874.
- 20) Yano A, Tokai T, Kawabata A. Selectivity of experimental drift net for chub mackerel *Scomber japonicus*. *Nippon*

- Suisan Gakkaishi* 2012; doi: 10.2331/suisan.78.681 (in Japanese with English abstract).
- 21) Sato M, Tokai T, Kawaba A. Mesh selectivity of experimental drift net for Japanese sardine. *Nippon Suisan Gakkaishi* 2015; doi: 10.2331/suisan.81.290 (in Japanese with English abstract).
- 22) Sato M, Tokai T, Mori Y, Nakame Y. Appropriate mesh size combination of research drift net series for chub mackerel resources off Hokkaido, Pacific. *Nippon Suisan Gakkaishi* 2016; doi: 10.2331/suisan.15-00061 (in Japanese with English abstract).
- 23) 島崎健二, 山本昭一, 目黒敏美. 表層性魚類に対する非選択的調査用流刺網. 北海道大学水産学部研究彙報 1984; **35**: 17-27.
- 24) Kurkilahti M, Rask M. A comparative study of the usefulness and catchability of multimesh gill nets and gill net series in sampling of perch (*Perca fluviatilis* L.) and roach (*Rutilus rutilus* L.). *Fish. Res.* 1996; **27**: 243-260.
- 25) Baranov FI. The capture of fish by gillnets. *Mater. Poznoniyu Russ. Rybolov.* 1975; **3**: 56-99 (in Russian, partially translated into English by W.E. Ricker).
- 26) Jonsson T, Setzer M, Pope J G, Sandström A. Addressing catch mechanisms in gillnets improves modeling of selectivity and estimates of mortality rates: a case study using survey data on an endangered stock of Arctic char. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 2013; **70**: 1477-1487.
- 27) Pope JA, Margetts AR, Hamley JM, Akyuz EF. Manual of methods for fish stock assessmnt. Part III. Selectivity of fishing gear. *FAO Fish. Tech. Pap.* 1975; **41**: 1-65.
- 28) Millar RB, Fryer RJ. Estimating the size selection curves of towed gears, traps, nets, and hooks. *Rev. Fish Biol. Fish.* 1999; **9**: 89-116.
- 29) Akaike H. A new look at the statistical model identification. *IEEE Trans, Autom. Contr.* 1974; **19**: 716-723.
- 30) Efron B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *Ann. Statist.* 1979; **7**: 1-26.
- 31) 吉原健一. Excelによるブートストラップ法を用いたデータ解析, 培風館, 東京. 2009.
- 32) Park HH, Millar RB, Bae BS, An HC, Chun YY, Yang JH, Yoon SC. Size selectivity of Korean flounder (*Glyptocephalus stelleri*) by gillnets and trammel nets using an extension of SELECT for experiments with differing mesh sizes. *Fish. Res.* 2011; **107**: 196-200.
- 33) Yokota K, Tokai T. Performance evaluations of a developed girth-measurement device. *Fish. Engineer.* 2006; **43**: 161-166.
- 34) Carlson JK, Cortes E. Gillnet selectivity of small coastal sharks off the southeastern United States. *Fish. Res.* 2003; **60**: 405-414.
- 35) McAuley RB, Simpfendorfer CA, Wright IW. Gillnet mesh selectivity of the sandbar shark (*Carcharhinus plumbeus*): implications for fisheries management. *ICES J. Mar. Sci.* 2007; **64**: 1702-1709.
- 36) Yokota K, Kiyota M, Minami H. Shark catch in a pelagic longline fishery: Comparison of circle and tuna hooks. *Fish. Res.* 2006; **81**: 337-341.
- 37) DeAlteris J, Riedel R. Effect of size selection within and between fishing gear types on the yield and spawning stock biomass per recruit and yield per unit effort for a cohort of an idealized groundfish. *J. Northw. Atl. Fish. Sci.* 1996; **19**: 73-82.
- 38) Thorpe T, Frierson D. Bycatch mitigation assessment for sharks caught in coastal anchored gillnets. *Fish. Res.* 2009; **98**: 102-112.